B- CARCINOME ÉPIDERMOÏDE CUTANÉ

I- Maladie localisée :

RCC 5FU + CISPLATINE J1=J21 : [1]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2 L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl et 2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	45min avant cisplatine
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse IVL 30min avant chimiothérapie	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/M2	Dans SS 0,9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours (j1j2j3j4j5)
J2					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	45min avant cisplatine
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/M2	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 4h ou SG 5% 1L+4gNacl et 2gKcl en 4h

[1] : JP Pignon, J Bourhis, C Domenge, and L Designe. Chemotherapy added to locoregional treatment for head and neck squamous-cell carcinoma: three meta-analyses of updated individual data. Lancet :2000

II- Maladie avancée/ métastatique :

5FU + CISPLATINE J1=J28 : [2]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2 L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl et 2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	45min avant cisplatine
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/ M2	Dans SS 0,9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours (j1j2j3j4j5)
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	45min avant cisplatine
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/ M2	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 4h ou SG 5% 1L+4gNacl et 2gKcl en 4h

[2] : T Khansur 1, A Kennedy. Cisplatin and 5-fluorouracil for advanced locoregional and metastatic squamous cell carcinoma of the skin. Cancer. 1991 Apr 15;67(8):2030-2.