A - LE CANCER COLORECTAL :

I-Stade Localisé

A. Cancer du Côlon (Traitement Adjuvant)

CAPECITABINE (J1=J21) [1]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Chimiothérapie	Capecitabine	2500.0 mg/ M2	Orale	2x/jour : Matin et soir 30 min après le repas, pdt 14J

[1]. Twelves C, Wong A, Nowacki MP, et al. Capecitabine as adjuvant treatment for stage III colon cancer. N Engl J Med 2005; 352:2696–2704. (X-ACT trial)

FOLFOX (J1=J15) [2]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'acide folinique puis rinçage SG
3	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 100 cc de SG5% en bolus
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse	Ds SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

[2]. André T, Boni C, Mounedji-Boudiaf L, et al. Oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin as adjuvant treatment for colon cancer. N Engl J Med 2004; 350:2343–2351. (MOSAIC trial)

XELOX (J1=J21) [3]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 mins avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 mins avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	130.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Capecitabine	2000.0 mg/M2	Orale	2x/jour : Matin et soir 30 mins après le repas, pdt 14J

[3]. Schmoll HJ, Cartwright T, Tabernero J, et al. Phase III trial of capecitabine plus oxaliplatin as adjuvant therapy for stage III colon cancer: a planned safety analysis in 1,864 patients. J Clin Oncol. 2007;25(1):102-109. (NO16968 trial)

FOLFOX + ATÉZOLIZUMAB (J1=J15) [4]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'acide folinique puis rinçage SG
3	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 100 cc de SG5% en bolus
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse	Ds SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable
6	Immunothérapie	Atézolizumab	840 mg	intraveineuse	Dans 250 CC de SS 0,9%

XELOX + ATÉZOLIZUMAB (J1=J21) [4]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Chimiothérapie	Oxaliplatine	130.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% puis rinçage SG
3	Chimiothérapie	Capecitabine	2000.0 mg/M2	Orale	2x/jour : Matin et soir 30 min après le repas, pdt 14J
4	Immunothérapie	Atézolizumab	1200 mg	intraveineuse	Dans 250 CC de SS 0.9%

[4]. Sinicrope, F. A., et al. (2023). Randomized trial of standard chemotherapy alone or combined with atezolizumab as adjuvant therapy for patients with stage III colon cancer and deficient DNA mismatch repair (Alliance A021502). Journal of Clinical Oncology, 41(16_suppl), LBA2. (ATOMIC trial)

B. Cancer du Rectum (Traitement Néo-adjuvant)

1. Protocoles de Radiochimiothérapie (RCC) Concomitante

RCC CAPECITABINE [5]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Chimiothérapie	Capecitabine	1650.0 mg/M2	Orale	2x/jour : Matin et soir 30 min après le repas, 5 jours sur 7, pendant toute la durée de la radiothérapie

[5]. Hofheinz, R. D., et al. (2012). "Chemoradiotherapy with capecitabine versus fluorouracil for locally advanced rectal cancer: a randomised, non-inferiority, phase 3 trial." The Lancet Oncology 13(6): 579-588.

RCC LV5FU2 [6]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimio-thérapie
2	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimio-thérapie
3	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% puis rinçage
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 100 cc de SG5% en bolus
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffu-seur portable

[6]. Gérard, J. P., et al. (2006). "Preoperative radiotherapy with or without concurrent fluorouracil and leucovorin in T3-4 rectal cancers: results of FFCD 9203." Journal of Clinical Oncology 24(28): 4620-4625.

RCC FOLFOX [7]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 mins avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 mins avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'acide folinique puis rinçage SG
3	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 100 cc de SG5% en bolus
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

[7]. Rödel C, et al. Oxaliplatin added to fluorouracil-based preoperative chemoradiotherapy and postoperative chemo-therapy of locally advanced rectal cancer (the German CAO/ARO/AIO-04 study): final results of the multicentre, open-la-bel, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2015;16(8):979-989.

2. Schémas de Thérapie Néo-adjuvante Totale (TNT)

a. Schéma type RAPIDO : Radiothérapie courte suivie de Chimiothérapie

Étape 1 : Radiothérapie courte (5 Gy x 5 fractions).

Étape 2 : Chimiothérapie de consolidation. Les protocoles utilisés sont le XELOX ou le FOLFIRINOX.

le XELOX (Cycle de 21 jours) [8]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 Mg	Intraveineuse	Ivl 30 Mins Avant Chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	8.0 Mg	Intraveineuse	Ivl 30 Mins Avant Chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	130.0 Mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 Cc De Sg 5% Puis Rinçage Sg
4	Chimiothérapie	Capecitabine	2000.0 Mg/M2	Orale	2X/Jour : Matin Et Soir 30 Mins Après Le Repas, Pdt 14J

FOLFIRINOX (Cycle de 15 jours) [8]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 mins avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 mins avant chimiothérapie
3	Prémédication	Atropine	1.0 mg	Sous-cutanée	Sous-cutanée durant la perfusion d'Irinotécan
4	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SG 5% sur 2h
5	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SG 5% en Y de l'Irinotécan sur 2h puis rinçage SG

5	Chimiothérapie	Irinotecan	180.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SG 5% en Y de l'Acide folinique sur 90 min puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 100 cc SG 5% en bolus
7	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans SG 5% en perfusion continue de 46 h sur diffuseur portable

[8]. Van der Valk, M. J. M., et al. (2021). "Short-course radiotherapy followed by chemotherapy before total mesorectal excision (TME) versus preoperative chemoradiotherapy, TME, and optional adjuvant chemotherapy in locally advanced rectal cancer (RAPIDO): a randomised, open-label, phase 3 trial." The Lancet Oncology 22(1): 29-40.

b. Schéma type PRODIGE 23 : Chimiothérapie suivie de Radiochimiothérapie

Étape 1 : Chimiothérapie d'induction avec le protocole FOLFIRINOX.

FOLFIRINOX (J1=J15)

Protocole FOLFIRINOX (utilisé en Étape 1 - Cycle de 15 jours) [9]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 mins avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 mins avant chimiothérapie
3	Prémédication	Atropine	1.0 mg	Sous-cutanée	Sous-cutanée durant la perfusion d'Irinotécan
4	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SG 5% sur 2h
5	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SG 5% en Y de l'Irinotécan sur 2h puis rinçage SG

5	Chimiothérapie	Irinotecan	180.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SG 5% en Y de l'Acide folinique sur 90 min puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 100 cc SG 5% en bolus
7	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans SG 5% en perfusion continue de 46 h sur diffuseur portable

Étape 2 : Radiochimiothérapie concomitante (voir protocoles RCC ci-dessus, typiquement avec Capecitabine).

[9]. Conroy, T., et al. (2021). "Neoadjuvant chemotherapy with FOLFIRINOX and preoperative chemoradiotherapy for patients with locally advanced rectal cancer (UNICANCER-PRODIGE 23): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial." The Lancet Oncology 22(5): 702-715.

II. STADE AVANCÉ OU MÉTASTATIQUE

FOLFOX (J1=J15) [10]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'acide folinique puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 100 cc de SG5% en bolus
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

[10]. de Gramont A, et al. Leucovorin and fluorouracil with or without oxaliplatin as first-line treatment in advanced colorectal cancer. J Clin Oncol. 2000;18(16):2938-2947.

FOLFIRI (J1=J15) [11]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 mins avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 mins avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SG 5% en Y de l'Irinotécan puis rinçage SG

4	Chimiothérapie	Irinotecan	180.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SG 5% en Y de l'Acide folinique puis rinçage SG
5	Prémédication	Atropine	1.0 mg	Sous-cutanée	Sous-cutanée durant la perfusion d'Irinotécan
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 100 cc SG 5% en bolus
7	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/ M2	intraveineuse	Dans SG 5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

[11]. Douillard JY, Cunningham D, Roth AD, et al. Irinotecan combined with fluorouracil compared with fluorouracil alone as first-line treatment for metastatic colorectal cancer: a multicentre randomised trial. Lancet 2000; 355:1041–1047.

XELOX (J1=J21) [12]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 mins avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 mins avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	130.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Capecitabine	2000.0 mg/M2	Orale	2x/jour : Matin et soir 30 mins après le repas, pdt 14J

[12]. Cassidy J, et al. Randomized phase III study of capecitabine plus oxaliplatin (XELOX) versus fluorouracil/folinic acid (FU/FA) as first-line therapy for metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol. 2008;26(12):2006-2012.

CAPECITABINE (J1=J21) [13]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Chimiothérapie	Capecitabine	2500.0 mg/M2	Orale	2x/jour : Matin et soir 30 min après le repas, pdt 14J

[13]. Van Cutsem E, et al. Oral capecitabine compared with intravenous fluorouracil plus leucovorin in patients with metastatic colorectal cancer: results of a large phase III study. J Clin Oncol 2001; 19(21):4097-106.

TRIFLURIDINE/TIPIRACIL (LONSURF) (J1=J28) [14]

Note : Utilisé en lignes de traitement ultérieures pour les patients réfractaires.

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Chimiothérapie	Trifluridine/ Tipiracil	35.0 Mg/M2	Orale	2X/Jour : J1 À J5 Et J8 À J12. Cycle De 28 Jours.

[14]. Mayer RJ, Van Cutsem E, Falcone A, et al. Randomized trial of TAS-102 for refractory metastatic colorectal cancer. N Engl J Med. 2015;372(20):1909-1919. (RECOURSE trial)

FOLFOX + BEVACIZUMAB (J1=J15) [15]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Bevacizumab	5.0 mg/KG	Intraveineuse	Dans 100 cc de SS 0,9%
4	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% en Y de l'acide folinique puis rinçage SG

5	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 100 cc de SG5% en bolus
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse	dans SG 5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

[15]. Saltz LB, et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as first-line therapy in metastatic colorectal cancer: a randomized phase III study. J Clin Oncol 2008; 26:2013–2019. (NO16966 trial)

FOLFIRI + BEVACIZUMAB (J1=J15) [16]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Bevacizumab	5.0 mg/KG	Intraveineuse	Dans 100 cc de SS 0,9%
4	Chimiothérapie	Irinotecan	180.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% en Y de l'Acide folinique puis rinçage SG
4	Prémédication	Atropine	1.0 mg	Sous-cutanée	Sous-cutanée durant la perfusion d'Irinotécan
4	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% en Y de l'Irinotécan puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 100 cc de SG 5% en bolus
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse	dans SG 5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

[16]. Hurwitz H, et al. Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med. 2004;350(23):2335-2342. (AVF2107g trial)

XELOX + BEVACIZUMAB (J1=J21) [15]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Bevacizumab	7.5 mg/KG	Intraveineuse	Dans 100 cc de SS 0,9%
4	Chimiothérapie	Oxaliplatine	130.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Capecitabine	2000.0 mg/M2	Orale	2x/jour : Matin et soir 30 min après le repas pdt 14J

[15]. Saltz LB, et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as first-line therapy in metastatic colorectal cancer: a randomized phase III study. J Clin Oncol 2008; 26:2013–2019. (NO16966 trial)

FOLFOX + CETUXIMAB (J1=J15) - Pour patients KRAS/NRAS/BRAF non mutés [16]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Antihistaminiques H1	10 mg	Orale	1 cp 1H avant cetuximab
2	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Thérapie ciblée	Cetuximab	500.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 500cc de SS 0,9% 2h puis repos 1h
5	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% en Y de l'acide folinique puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG

6	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg	Intraveineuse	Dans 100 cc de SG5% en bolus
7	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

FOLFIRI + CETUXIMAB (J1=J15) - Pour patients KRAS/NRAS/BRAF non mutés [16]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Antihistaminiques H1	10 mg	Orale	1cp 1heure avant cetuximab
2	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Thérapie ciblée	Cetuximab	500.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0,9% en 2h puis repos 1h
5	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% en Y de l'Irinotécan puis rinçage SG
5	Prémédication	Atropine	1.0 mg	Sous-cutanée	Sous-cutanée durant la perfusion d'Irinotécan
5	Chimiothérapie	Irinotecan	180.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SG 5% en Y de l'Acide folinique puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 cc de SG 5% en bolus
7	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

[16]. Van Cutsem E, et al. Cetuximab and chemotherapy as initial treatment for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med. 2009;360(14):1408-1417. (CRYSTAL trial) (pour les deux protocoles ci-dessus)

FOLFOX + ENCORAFENIB + CETUXIMAB (J1=J15) - Pour mutation BRAF V600E [17]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Antihistaminiques H1	10 mg	Orale	1 cp 1heure avant cetuximab
2	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Thérapie ciblée	Cetuximab	500.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 500cc de SS 0,9% 2h puis repos 1h
5	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% en Y de l'acide folinique puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg	Intraveineuse	Dans 100 cc de SG5% en bolus
7	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable
8	Thérapie ciblée	Encorafenib	300.0 mg	Orale	4 gélules de 75mg en une prise par jour, en continu

FOLFOX + ENCORAFENIB + PANITUMUMAB (J1=J15) - Pour mutation BRAF V600E[17]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Panitumumab	6.0 mg/KG	Intraveineuse	Dans 100 cc de SS 0,9% en 60 min
4	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% en Y de l'acide folinique puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg	Intraveineuse	Dans 100 cc de SG5% en bolus
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable
7	Thérapie ciblée	Encorafenib	300.0 mg	Orale	4 gélules de 75mg en une prise par jour, en continu

[17]. Grothey, A., et al. (2023). Encorafenib Plus Cetuximab With or Without Chemotherapy for BRAF V600E-Mutant Metastatic Colorectal Cancer: The Phage 3 BREAKWATER Study. ESMO Congress 2023. (pour les deux protocoles ci-dessus)

TRIFLURIDINE/TIPIRACIL (LONSURF) + BEVACIZUMAB (J1=J28) [18]

Note : Utilisé en lignes de traitement ultérieures pour les patients réfractaires.

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Bevacizumab	5.0 mg/KG	Intraveineuse	J1 et J15. Dans 100 cc de SS 0,9%.
2	Chimiothérapie	Trifluridine/ Tipiracil	35.0 mg/M2	Orale	2x/jour : J1 à J5 et J8 à J12. Cycle de 28 jours.

[18]. Prager GW, Taieb J, Fakih M, et al. Trifluridine-Tipiracil and Bevacizumab in Refractory Metastatic Colorectal Cancer. N Engl J Med. 2023;388(18):1657-1667. (SUNLIGHT trial)

CETUXIMAB + ENCORAFENIB (J1=J15) - Pour mutation BRAF V600E [19]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Prémédication	Antihistaminiques H1	10 mg	Orale	1 cp 1 heure avant cetuximab
2	Prémédication	Méthylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Cetuximab	500.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 500cc de SS 0,9% 2h puis repos 1h
4	Thérapie ciblée	Encorafenib	300.0 mg	Orale	4 gélules de 75mg en une prise par jour, en continu

[19]. Kopetz, S., et al. (2019). Encorafenib, Binimetinib, and Cetuximab in BRAF V600E–Mutated Colorectal Cancer. New England Journal of Medicine 381(17): 1632-1643. (BEACON CRC trial)

PANITUMUMAB + ENCORAFENIB (J1=J15) - Pour mutation BRAF V600E[20]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Panitumumab	6.0 mg/KG	Intraveineuse	Dans 100 cc de SS 0,9% en 60 min
2	Thérapie ciblée	Encorafenib	300.0 mg	Orale	4 gélules de 75mg en une prise par jour, en continu

[20]. Kopetz, S., et al. (2019). Encorafenib, Binimetinib, and Cetuximab in BRAF V600E–Mutated Colorectal Cancer. New England Journal of Medicine 381(17): 1632-1643. (BEACON CRC trial, le panitumumab est une alternative validée au cetuximab).

REGORAFENIB (J1=J28) [21]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	REGORAFENIB	160.0 mg	Orale	1x/jour, pendant 21 jours, suivi de 7 jours de repos

[21]. Grothey A, Van Cutsem E, Sobrero A, et al. Regorafenib monotherapy for previously treated metastatic colorectal cancer (CORRECT): an international, multicentre, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2013;381(9863):303-312.

Principalement pour les patients avec instabilité microsatellitaire (MSI-H/dMMR)

PEMBROLIZUMAB[22]

Type	Produit/Protocole	Dose	Voie	Observation
Immunothérapie	Pembrolizumab	200.0 mg	Intraveineuse	Toutes les 3 semaines (J1=J21)
ou				
Immunothérapie	Pembrolizumab	400.0 mg	Intraveineuse	Toutes les 6 semaines (J1=J42)

[22]. André T, Shiu KK, Kim TW, et al. Pembrolizumab in Microsatellite-Instability-High Advanced Colorectal Cancer. N Engl J Med. 2020;383(23):2207-2218. (KEYNOTE-177)

NIVOLUMAB + IPILIMUMAB[23]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Nivolumab	3.0 mg/KG	Intraveineuse	Toutes les 3 semaines
2	Immunothérapie	Ipilimumab	1.0 mg/KG	Intraveineuse	Toutes les 3 semaines, pour 4 doses

[23]. Overman MJ, Lonardi S, Wong KYM, et al. Durable Clinical Benefit With Nivolumab Plus Ipilimumab in DNA Mismatch Repair-Deficient/Microsatellite Instability-High Metastatic Colorectal Cancer. J Clin Oncol. 2018;36(8):773-779. (CheckMate 142)