B- CANCER DE L'ESTOMAC

I- Stade Localisé

LV5FU RCC J1=J15 (1)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	METHYLPREDNISOLONE	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	ONDANSETRON	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	ACIDE FOLIQUE	Intraveineuse	400.0 mg/ M2	Dans 250 cc de SG 5% puis rinçage
4	Chimiothérapie	FLUOROURACIL	Intraveineuse	400.0 mg/ M2	Dans 100 cc de SG5% en bolus
5	Chimiothérapie	FLUOROURACIL	Intraveineuse	2400.0 mg/M2	Dans SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

Dahan L, Atlan D, Bouché O, Mitry E, Ries P, Artru P, et al. Postoperative chemoradiotherapy after surgical resection of gastric adenocarcinoma: can LV5FU2 reduce the toxic effects of the MacDonald regimen? A report on 23 patients. Gastroenterol Clin Biol 2005; 29:11–15.

Capecitabine RCC (2)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J2					
1	Chimiothérapie	CAPECITABINE	Orale	1650.0 mg/ M2	2x/jour : Matin et soir 30min après le repas, 5 jours sur 7, pendant toute la durée de la radiothérapie

*2- Jansen EPM, Boot H, Saunders MP, Crosby TDL, Dubbelman R, Bartelink H, et al. A Phase I–II Study of Postoperative Capecitabine-Based Chemoradiotherapy in Gastric Cancer. International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics 2007; 69:1424–1428.*

XELOX J1 = J21 ESTOMAC (3)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	130.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Capecitabine	Orale	2000.0 mg/M2	2x/jour : Matin et soir 30min après le repas, pdt 14J

(3) Park YH, Lee J-L, Ryoo B-Y, Ryu M-H, Yang SH, Kim BS, et al. Capecitabine in combination with Oxaliplatin (XELOX) as a first-line therapy for advanced gastric cancer. Cancer Chemother Pharmacol 2008; 61:623–629

LV5FU2 J1=J15 ESTOMAC (4)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	400.0 mg/ M2	dans 250 cc de SG 5% puis rinçage
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	400.0 mg/ M2	dans 100 cc de SG5% en bolus
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	2400.0 mg/M2	Ds SG5% en perfusion continue de 48h sur diffuseur portable

(4) Bouché O, Raoul JL, Bonnetain F, Giovannini M, Etienne PL, Lledo G, et al. Randomized multicenter phase II trial of a biweekly regimen of fluorouracil and leucovorin (LV5FU2), LV5FU2 plus cisplatin, or LV5FU2 plus irinotecan in patients with previously untreated metastatic gastric cancer: a Federation Francophone de Cancerologie Digestive Group Study--FFCD 9803. J Clin Oncol 2004; 22:4319–4328

FLOT 24H J1= J15 ESTOMAC (5)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 250 cc en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	85.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'acide folinique puis rinçage SG
4	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	cp
4	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	200.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	50.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 h puis rinçage j1
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	2600.0 mg/M2	dans 500 cc SS de J1 en perf continue
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	100.0 ml	0.9% 100 ml en 15 min

(5) Al-Batran S-E, Homann N, Pauligk C, Goetze TO, Meiler J, Kasper S, et al. Perioperative chemotherapy with fluorouracil plus leucovorin, oxaliplatin, and docetaxel versus fluorouracil or capecitabine plus cisplatin and epirubicin for locally advanced, resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4): a randomised, phase 2/3 trial. Lancet 2019; 393:1948–1957.

FLOT 48H J1 = J15 ESTOMAC (5)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 250 cc en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	85.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'acide folinique puis rinçage SG
5	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	cp
6	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	200.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
7	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	50.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 h puis rinçage j1
8	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	2600.0 mg/ M2	dans 500 cc SS de J1 en perf continue
8	Rinçage	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	100.0 ml	0.9% 100 cc en 15 min

(5) Al-Batran S-E, Homann N, Pauligk C, Goetze TO, Meiler J, Kasper S, et al. Perioperative chemotherapy with fluorouracil plus leucovorin, oxaliplatin, and docetaxel versus fluorouracil or capecitabine plus cisplatin and epirubicin for locally advanced, resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4): a randomised, phase 2/3 trial. Lancet 2019; 393:1948–1957.

TFOX 24H J1= J15 ESTOMAC

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 250 cc en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	85.0 mg/ M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'acide folinique puis rinçage SG
4	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	cp
4	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	400.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	50.0 mg/ M2	dans 500 cc SS en 1 h puis rinçage j1
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	2400.0 mg/M2	dans 500 cc SS de J1 en perf continue
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	100.0 ml	0.9% 100 ml en 15 min

Zaanan A, Bouché O, de la Fouchardière C, et al. TFOX versus FOLFOX in first-line treatment of patients with advanced HER2-negative gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (PRODIGE 51- FFCD-GASTFOX): an open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2025;26(6):732-744. doi:10.1016/S1470-2045(25)00130-5

5FU-CDDP J1=J28 ESTOMAC (6)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2 L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl et 2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	45min avant cisplatine
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/M2	Dans SS 0,9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours
J2					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	45min avant cisplatine
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 4h ou SG 5% 1L+4gNacl et 2gKcl en 4h

(6) Ychou M, Pignon JP, Lasser P, Conroy T, Bouché O, Boige V, et al. Phase III preliminary results of preoperative fluorouracil (F) and cisplatin (P) versus surgery alone in adenocarcinoma of stomach and lower esophagus (ASLE): FNLCC 94012-FFCD 9703 trial. JCO 2006; 24:4026–4026

II- Stade avancé et métastatique

FOLFOX J1 = J15 ESTOMAC (7)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	METHYLPREDNISOLONE	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	ONDANSETRON	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	OXALIPLATINE	Intraveineuse	85.0 mg/ M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de lacide folinique puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	ACIDE FOLIQUE	Intraveineuse	400.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	FLUOROURACIL	Intraveineuse	400.0 mg/M2	dans 100 cc de SG5% en bolus
6	Chimiothérapie	FLUOROURACIL	Intraveineuse	2400.0 mg/M2	Ds SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

(7) Al-Batran S-E, Hartmann JT, Probst S, Schmalenberg H, Hollerbach S, Hofheinz R, et al. Phase III trial in metastatic gastroesophageal adenocarcinoma with fluorouracil, leucovorin plus either oxaliplatin or cisplatin: a study of the Arbeits-gemeinschaft Internistische Onkologie. J Clin Oncol 2008; 26:1435–1442.

FOLFIRI J1 = J15 ESTOMAC (8)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	400.0 mg/M2	Dans 250 cc SG 5% en Y de l'Irinotécan puis rinçage SG
3	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	180.0 mg/M2	Dans 250 cc SG 5% en Y de l'Acide folinique puis rinçage SG
3	Pré-médication	Atropine	Sous-cutanée	1.0 mg	Sous-cutanée durant la perfusion d'Irinotécan
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	400.0 mg/M2	Dans 100 cc SG 5% en bolus
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	2400.0 mg/M2	Ds SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

(8) Bouché O, Raoul JL, Bonnetain F, Giovannini M, Etienne PL, Lledo G, et al. Randomized multicenter phase II trial of a biweekly regimen of fluorouracil and leucovorin (LV5FU2), LV5FU2 plus cisplatin, or LV5FU2 plus irinotecan in patients with previously untreated metastatic gastric cancer: a Federation Francophone de Cancerologie Digestive Group Study--FFCD 9803. J Clin Oncol 2004; 22:4319–4328.

DOCETAXEL J1 =J21 ESTOMAC (9)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	75mg/ M2	Dans 500 cc SS en 1H puis rinçage SG

(9) Ford HE, Marshall A, Bridgewater JA, Janowitz T, Coxon FY et al. Docetaxel versus active symptom control for refractory oesophagogastric adenocarcinoma (COUGAR02): an open-label, phase 3 randomised controlled trial. Lancet Oncol 2014;15:78- 86.

Paclitaxel j1 J8 J15 J1 = J21 ESTOMAC (10)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 250 cc en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Lansoprazole	Intraveineuse	40.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/M2	ds 250 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Rinçage	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 100 cc en 10 min
J8					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 250 cc en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Lansoprazole	Intraveineuse	40.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/M2	ds 250 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Rinçage	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 100 cc en 10 min
J15					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 250 cc en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Lansoprazole	Intraveineuse	40.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/M2	ds 250 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Rinçage	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 100 cc en 10 min

(10) Ilson DH, Wadleigh RG, Leichman LP, Kelsen DP. Paclitaxel given by a weekly 1-h infusion in advanced esophageal cancer. Ann Oncol 2007; 18:898–902.

Irinotecan J1 =J21 ESTOMAC (11)

Ordre	Type prescription	Produit / Prescription	Voie	Dosage
J1				
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg
3	Pré-médication	Atropine	Sous-cutanée	1.0 mg
4	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	240.0 mg/M2

(11) Thuss-Patience PC, Kretzschmar A, Bichev D, Deist T, Hinke A, Breithaupt K, et al. Survival advantage for irinotecan versus best supportive care as second-line chemotherapy in gastric cancer--a randomised phase III study of the Arbeits-gemeinschaft Internistische Onkologie (AIO). Eur J Cancer 2011; 47:2306–2314.

Ramucirumab Paclitaxel J1 =J28 ESTOMAC (12)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 250 cc en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Lansoprazole	Intraveineuse	40.0 mg	IVL
5	Thérapie ciblée	Ramucirumab	intraveineuse	8 mg/ kg	100 ml SS 0.9% TA et BU avant ramucirumab, TA après ramucirumab
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/M2	dans 250 cc SS en 1 H puis rinçage

7	Rinçage	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 100 cc en 10 min
J8					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 250 cc en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Lansoprazole	Intraveineuse	40.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/M2	ds 250 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Rinçage	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 100 cc en 10 min
J15					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 250 cc en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Lansoprazole	Intraveineuse	40.0 mg	IVL
5	Thérapie ciblée	Ramucirumab	intraveineuse	8 mg/ kg	100 ml SS 0.9% TA et BU avant ramucirumab, TA après ramucirumab
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/M2	ds 250 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 100 cc en 10 min

(12) Wilke H, Muro K, Van Cutsem E, et al. Ramucirumab plus paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (RAINBOW): a doubleblind, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2014;15:1224-1235

FOLFOX trastuzumab J1 =J14 ESTOMAC (13)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylpredniso-lone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	85.0 mg/ M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de lacide folinique puis rinçage SG
3	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	400.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	400.0 mg/M2	dans 100 cc de SG5% en bolus
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	2400.0 mg/M2	Ds SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable
7	Thérapie ciblée	Trastuzumab	intraveineuse	8mg/kg	ss 9% 250CC en 1H30 1ère cure puis en 30mn 8mg/ kg (c1) 6mg/kg autres cures

(13) Soularue É, Cohen R, Tournigand C, Zaanan A, Louvet C, Bachet JB, Hentic O, Samalin E, Chibaudel B, de Gramont A, André T. Efficacy and safety of trastuzumab in combination with oxaliplatin and fluorouracil-based chemotherapy for patients with HER2-positive metastatic gastric and gastro-oesophageal junction adenocarcinoma patients: a retrospective study. Bull Cancer 2015;102:324-31

5FU CDDP trastuzumab J1 =J21 ESTOMAC (14)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2 L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl et 2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	45min avant cisplatine
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/ M2	Dans SS 0,9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours (j1j2j3j4j5)
3	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Intraveineuse	8mg/ kg	ss 9% 250CC en 1H30 1ère cure puis en 30mn 8mg/kg (c1) 6mg/kg autres cures
J2					
1	Pré-médication	Aprepitant	Pré-médication	80.0 mg	45min avant cisplatine
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Pré-médication	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Pré-médication	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	Chimiothérapie	100.0 mg/ M2	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Post-hydratation	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 4h ou SG 5% 1L+4gNacl et 2gKcl en 4h

(14) Bang YJ, Van Cutsem E, Feyereislova A, et al. Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2- positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet 2010;376:687- 697

Capecitabine-CDDP-Trastuzumab IV J1 = J21 ESTOMAC (15)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2 L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl et 2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	cp
5	Chimiothérapie	Capecitabine	Orale	2000.0 mg/M2	2x/jour : Matin et soir 30min après le repas, pdt 14J
6	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Intraveineuse	8mg/kg	ss 9% 250CC en 1H30 1ère cure puis en 30mn 8mg/kg (c1) 6mg/kg autres cures
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	cp

4	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	ds 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 4h ou SG 5% 1L+4gNacl et 2gKcl en 4h

(15) Bang Y-J, Van Cutsem E, Feyereislova A, Chung HC, Shen L, Sawaki A, et al. Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet 2010; 376:687–697.

Pembrolizumab J1=J21 ESTOMAC (16)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg	Dans 200cc de SS 0,9%

(16) Wainberg ZA, Jalal S, Muro K, Yoon HH, Garrido M, Golan T, et al. KEYNOTE-059 Update: Efficacy and safety of pembrolizumab alone or in combination with chemotherapy in patients with advanced gastric or gastroesophageal (G/GEJ) cancer. Annals of Oncology 2017; 28:v616–v617.

FOLFOX-nivolumab J1 = J15 (17)

Ordre	Type prescription	Produit / Prescription	Voie	Dosage
J1				
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	85.0 mg/M2
3	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	400.0 mg/M2
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	400.0 mg/M2

5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	2400.0 mg/M2
6	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	240.0 mg

(17) Janjigian YY, Shitara K, Moehler M, Garrido M, Salman P, Shen L et al. First-line nivolumab plus chemotherapy versus chemotherapy alone for advanced gastric, gastro-oesophageal junction, and oesophageal adenocarcinoma (CheckMate 649): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet 2021;398(10294):27-40.

XELOX-nivolumab J1 = 21 (17)

Ordre	Type prescription	Produit / Prescription	Voie	Dosage
J1				
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	130.0 mg/M2
4	Chimiothérapie	Capecitabine	Orale	2000.0 mg/M2
5	Immunothéapie	Nivolumab	intraveineuse	360 mg

(17) Janjigian YY, Shitara K, Moehler M, Garrido M, Salman P, Shen L et al. First-line nivolumab plus chemotherapy versus chemotherapy alone for advanced gastric, gastro-oesophageal junction, and oesophageal adenocarcinoma (CheckMate 649): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet 2021;398(10294):27-40

XELOX PEMBROLIZUMAB J1 = J21 ESTOMAC (18)

Ordre	Type prescription	Produit / Prescription	Voie	Dosage
J1				
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0
E				
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg

3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	130.0 mg
4	Chimiothérapie	Capecitabine	Orale	2000.0 mg/M2
5	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg

(18) Rha SY, Oh DY, Yanez P, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for HER2-negative advanced gastric cancer (KEYNOTE-859): a multicentre, randomised, doubleblind, phase 3 trial. Lancet Oncol 2023;24:1181- 1195

FOLFOX-Pembrolizumab J1 = J15 (18)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	85.0 mg/ M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de lacide folinique puis rinçage SG
3	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	400.0 mg/ M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG dans 100 cc de SG5% en bolus
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	400.0 mg/ M2	dans 100 cc de SG5% en bolus
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	2400.0 mg/M2	Ds SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable
6	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	400 mg toutes les 6 semaines	Dans 200cc de SS 0,9%

(18) Rha SY, Oh DY, Yanez P, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for HER2-negative advanced gastric cancer (KEYNOTE-859): a multicentre, randomised, doubleblind, phase 3 trial. Lancet Oncol 2023;24:1181- 1195