C. LE CANCER DE L'ŒSOPHAGE

I- Stade Localisé

PACLITAXEL + CARBOPLATINE RCC J1=J8 (1)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Clartec 1cp 4h avant Paclitaxel
4	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Omeprazole 20mg 1 cp le jour de la chimio
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	50.0 mg/ M2	En 1h puis rinçage
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 2.0	AUC 2 ds 250 cc SG en 30 min puis rinçage

(1) Xia Y, Li Y, Chen Y, Liu Q, Zhang J, Deng J, et al. A phase II trial of concurrent chemoradiotherapy with weekly paclitaxel and carboplatin in advanced oesophageal carcinoma. Int J Clin Oncol 2018; 23:458–465.

5FU + CISPLATINE J1=J28 RCC (2)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2 L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl et 2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 cp 45 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/M2	Dans SS 0,9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours
J2					
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	45min avant cisplatine
5	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/ M2	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
6	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 4h ou SG 5% 1L+4gNacl et 2gKcl en 4h

(2) Steber C, Hughes RT, McTyre ER, Soike M, Farris M, Levine BJ, et al. Cisplatin/5-Fluorouracil (5-FU) Versus Carboplatin/ Paclitaxel Chemoradiotherapy as Definitive or Pre-Operative Treatment of Esophageal Cancer. Cureus 2021.

FOLFOX RCC J1=J15 (3) (4)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	85.0 mg/ M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'acide folinique puis rinçage SG

3	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	400.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	400.0 mg/M2	dans 100 cc de SG5% en bolus
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	2400.0 mg/M2	Dans SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

(3) Conroy T, Galais M-P, Raoul J-L, Bouché O, Gourgou-Bourgade S, Douillard J-Y, et al. Definitive chemoradiotherapy with FOLFOX versus fluorouracil and cisplatin in patients with oesophageal cancer (PRODIGE5/ACCORD17): final results of a randomised, phase 2/3 trial. The Lancet Oncology 2014; 15:305–314.

(4) Messager M, Mirabel X, Tresch E, Paumier A, Vendrely V, Dahan L, et al. Preoperative chemoradiation with paclitaxel-carboplatin or with fluorouracil-oxaliplatin—folinic acid (FOLFOX) for resectable esophageal and junctional cancer: the PROTECT-1402, randomized phase 2 trial. BMC Cancer 2016; 16:318.

5FU + CISPLATINE J1=J28 (5) (6)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2 L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl et 2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	45min avant cisplatine
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/M2	Dans SS 0,9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours

J2					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	45min avant cisplatine
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 4h ou SG 5% 1L+4gNacl et 2gKcl en 4h

(5) Ychou M, Boige V, Pignon J-P, Conroy T, Bouché O, Lebreton G, et al. Perioperative Chemotherapy Compared With Surgery Alone for Resectable Gastroesophageal Adenocarcinoma: An FNCLCC and FFCD Multicenter Phase III Trial. JCO 2011; 29:1715–1721.

(6) Bleiberg H, Conroy T, Paillot B, Lacave AJ, Blijham G, Jacob JH, et al. Randomised phase II study of cisplatin and 5-fluorouracil (5-FU) versus cisplatin alone in advanced squamous cell oesophageal cancer. European Journal of Cancer 1997; 33:1216–1220.

CAPECITABINE + CISPLATINE J1 = J21 (7)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2 L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl et 2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	cp

5	Chimiothérapie	Capecitabine	Orale	2000.0 mg/M2	2x/jour : Matin et soir 30min après le repas, pdt 14J
J2					
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	cp
5	Chimiothérapie	Capecitabine	Orale	2000.0 mg/M2	2x/jour : Matin et soir 30min après le repas, pdt 14J
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/M2	dans 500 cc SS 0,9% sur 1h
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 4h ou SG 5% 1L+4gNacl et 2gKcl en 4h

(7) Lordick F, Kang Y-K, Chung H-C, Salman P, Oh SC, Bodoky G, et al. Capecitabine and cisplatin with or without cetuximab for patients with previously untreated advanced gastric cancer (EXPAND): a randomised, open-label phase 3 trial. The Lancet Oncology 2013; 14:490–499.

FLOT J1=J15 (8)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 250 cc en 30 min
2	Pré-médication	Methylpredniso-lone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	cp
4	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	85.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'acide folinique puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	200.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	50.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 h puis rinçage j1
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	2600.0 mg/M2	dans 500 cc SS de J1 en perf continue
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	100.0 ml	0.9% 100 ml en 15 min

(8) Al-Batran S-E, Homann N, Pauligk C, Goetze TO, Meiler J, Kasper S, et al. Perioperative chemotherapy with fluorouracil plus leucovorin, oxaliplatin, and docetaxel versus fluorouracil or capecitabine plus cisplatin and epirubicin for locally advanced, resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4): a randomised, phase 2/3 trial. The Lancet 2019; 393:1948–1957.

FOLFOX J1=J15 ŒSOPHAGE (9) (10)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	85.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'acide folinique puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	400.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	400.0 mg/M2	dans 100 cc de SG5% en bolus
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	2400.0 mg/M2	Ds SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

(9) Al-Batran S-E, Hartmann JT, Probst S, et al. Phase III trial in metastatic gastroesophageal adenocarcinoma with fluorouracil, leucovorin plus either oxaliplatin or cisplatin: a study of the Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie. J Clin Oncol 2008;26:1435-1442.

(10) Kim GM, Jeung HC, Rha SY, et al. A randomized phase II trial of S-1-oxaliplatin versus capecitabine oxaliplatin in advanced gastric cancer. Eur J Cancer 2012;48:518-526.

XELOX J1=J21 (9)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	130.0 mg/ M2	dans 250 cc de SG 5% puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Capecitabine	Orale	2000.0 mg/M2	2x/jour : Matin et soir 30min après le repas, pdt 14J

(9) Al-Batran S-E, Hartmann JT, Probst S, et al. Phase III trial in metastatic gastroesophageal adenocarcinoma with fluorouracil, leucovorin plus either oxaliplatin or cisplatin: a study of the Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie. J Clin Oncol 2008;26:1435-1442.

Nivolumab J1= J14 (10)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Immunothérapie	NIVOLUMAB	Intraveineuse	240.0 mg	Sur 30 minutes toutes les 2 semaines pendant 16 semaines, puis 480mg 30 minutes toutes les 4 semaines pour une durée totale d'un an

(10) Kelly RJ, Ajani JA, Kuzdzal J, et al. Adjuvant nivolumab in resected esophageal or gastroesophageal junction cancer. N Engl J Med 2021;384:1191-1203.

II - Stade avancé et métastatique

FOLFIRI J1=J15 (11)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	400.0 mg/M2	Dans 250 cc SG 5% en Y de l'Irinotécan puis rinçage SG
3	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	180.0 mg/M2	Dans 250 cc SG 5% en Y de l'Acide folinique puis rinçage SG
3	Pré-médication	Atropine	Sous-cutanée	1.0 mg	Sous-cutanée durant la perfusion d'Irinotécan
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	400.0 mg/M2	Dans 100 cc SG 5% en bolus
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	2400.0 mg/M2	Ds SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

(11) Kim J-W, Lee K-W, Kim K-P, Lee JH, Hong YS, Kim J-E, et al. Efficacy and Safety of FOLFIRI Regimen in Elderly Versus Nonelderly Patients with Metastatic Colorectal or Gastric Cancer. The Oncologist 2017; 22:293–303.

DOCETAXEL J1 = J21 (12)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	75mg/ M2	Dans 500 cc SS en 1H puis rinçage SG

(12) Ford HE, Marshall A, Bridgewater JA, Janowitz T, Coxon FY et al. Docetaxel versus active symptom control for refractory oesophagogastric adenocarcinoma (COUGAR02): an open-label, phase 3 randomised controlled trial. Lancet Oncol 2014;15:78- 86.

TCF J1 à J5 J1 = J21 (13)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1500.0 ml	SS 0.9% 2 L en 6H
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	cp
5	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	dans 500 cc SS en 1 h puis rinçage j1
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	dans 250 cc SS en 30 min j1
7	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	3750.0 mg/M2	dans 500 cc SS sur 5j en perf continue

(13) V. M. Moiseyenko et al., Final results of a randomized controlled phase III trial (TAX 325) comparing docetaxel (T) combined with cisplatin (C) and 5-fluorouracil (F) to CF in patients (pts) with metastatic gastric adenocarcinoma (MGC). JCO 23, 4002-4002(2005).

PACLITAXEL J1,J8,J15 J1=J21 (14)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 250 cc en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Lansoprazole	Intraveineuse	40.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/M2	ds 250 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Rinçage	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 100 cc en 10 min
J8					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 250 cc en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Lansoprazole	Intraveineuse	40.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/M2	ds 250 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Rinçage	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 100 cc en 10 min
J15					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 250 cc en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Lansoprazole	Intraveineuse	40.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/M2	ds 250 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Rinçage	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 100 cc en 10 min

(14) Shirakawa T, Kato K, Nagashima K, Nishikawa A, Sawada R, Takahashi N, et al. A retrospective study of docetaxel or paclitaxel in patients with advanced or recurrent esophageal squamous cell carcinoma who previously received fluoropyrimidine- and platinum-based chemotherapy. Cancer Chemother Pharmacol 2014; 74:1207–1215.

IRINOTECAN J1=J21 (15)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Atropine	Sous-cutanée	1.0 mg	
4	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	240.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% en 1h30

(15) Hironaka S, Ueda S, Yasui H, et al. Randomized, open-label, phase III study comparing irinotecan with paclitaxel in patients with advanced gastric cancer without severe peritoneal metastasis after failure of prior combination chemotherapy using fluoropyrimidine plus platinum: WJOG 4007 trial. J Clin Oncol 2013;31:4438-4444.

5FU + CISPLATINE J1=J28 (16)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2 L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl et 2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	45min avant cisplatine
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/M2	Dans SS 0,9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours
J2					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	45min avant cisplatine
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 4h ou SG 5% 1L+4gNacl et 2gKcl en 4h

(16) Al-Batran SE, Hartmann JT, Probst S, et al. Phase III trial in metastatic gastroesophageal adenocarcinoma with fluorouracil, leucovorin plus either oxaliplatin or cisplatin: a study of the Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie. J Clin Oncol. 2008;26(9):1435-1442. doi:10.1200/JCO.2007.13.9378

CAPECITABINE + CISPLATINE avec TRASTUZUMAB J1= J21 (17)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2 L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl et 2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1cp 30min avant chimiothérapie

5	Chimiothérapie	Capecitabine	Orale	2000.0 mg/M2	2x/jour : Matin et soir 30min après le repas, pdt 14J
6	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Intraveineuse	8mg/kg	ss 9% 250CC en 1H30 1ère cure puis en 30mn 8mg/kg (c1) 6mg/kg autres cures
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	cp
4	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	ds 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 4h ou SG 5% 1L+4gNacl et 2gKcl en 4h

(17) Bang Y-J, Van Cutsem E, Feyereislova A, Chung HC, Shen L, Sawaki A, et al. Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label, randomised controlled trial. The Lancet 2010; 376:687–697.

5FU + CISPLATINE avec TRASTUZUMAB J1=J21 (18)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2 L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	cp

5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/M2	Dans SS 0,9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours
6	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Intraveineuse	8.0 mg/ KG	ss 9% 250CC en 1H30 1ère cure puis en 30mn
J2					
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	cp
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 4h ou SG 5% 1L+4gNacl et 2gKcl

(18) Bang Y-J, Van Cutsem E, Feyereislova A, Chung HC, Shen L, Sawaki A, et al. Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label, randomised controlled trial. The Lancet 2010; 376:687–697.

PEMBROLIZUMAB J1=J21 (19) (20)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg	Dans 200cc de SS 0,9%

(19) Kojima T, Shah MA, Muro K, Francois E, Adenis A, Hsu C-H, et al. Randomized Phase III KEYNOTE-181 Study of Pembrolizumab Versus Chemotherapy in Advanced Esophageal Cancer. JCO 2020; 38:4138–4148.

(20) Sun J-M, Shen L, Shah MA, Enzinger P, Adenis A, Doi T, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus chemotherapy alone for first-line treatment of advanced oesophageal cancer (KEYNOTE-590): a randomised, placebo-controlled, phase 3 study. The Lancet 2021; 398:759–771.

5FU + CISPLATINE PEMBROLIZUMAB J1 = J21 (20)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2 L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl et 2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	45min avant cisplatine
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/ M2	Dans SS 0,9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours
6	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg	Dans 200cc de SS 0,9%
J2					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	45min avant cisplatine
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/ M2	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 4h ou SG 5% 1L+4gNacl et 2gKcl en 4h

(20) Sun JM, Shen L, Shah MA, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus chemotherapy alone for first-line treatment of advanced oesophageal cancer (KEYNOTE-590): a randomised, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet 2021;398:759-771.

FOLFOX Nivolumab J1 = J15 (21)

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	85.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de lacide folinique puis rinçage SG
3	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	400.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	400.0 mg/M2	dans 100 cc de SG5% en bolus
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	2400.0 mg/M2	Ds SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable
6	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	240.0 mg	Dans 200cc de SS 0,9%

(21) Janjigian YY, Shitara K, Moehler M, et al. First-line nivolumab plus chemotherapy versus chemotherapy alone for advanced gastric, gastro-oesophageal junction, and oesophageal adenocarcinoma (CheckMate 649): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet 2021;398:27-40