D-LE CANCER DU CANAL ANAL

I- Stade localisé :

RCC 5FU + CISPLATINE J1=J28 [1]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2 L ou SG 5% 2L en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	45min avant cisplatine
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/m²	Dans SS 0,9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours (j1j2j3j4j5)
J2					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	45min avant cisplatine
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/m²	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L ou SG 5% 1L en 4h

[1] James RD, Glynne-Jones R, Meadows HM, Cunningham D, Myint AS, Saunders : MP, et al. Mitomycin or cisplatin chemoradiation with or without maintenance chemotherapy for treatment of squamous-cell carcinoma of the anus (ACT II): arandomised, phase 3, open-label, 2 × 2 factorial trial. Lancet Oncol 2013; 14:516–524.

RCC CAPECITABINE + CISPLATINE J1=J28 [2]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Chimiothérapie	Capecitabine	Orale	1650.0 mg/m²	2x/j matin et soir 30 min après le repas, 5 jours sur 7, pendant toute la durée de la radiothérapie
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2 L ou SG 5% 2L en 6h
J2					
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	45min avant cisplatine
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/ m²	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage
6	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L ou SG 5% 1Len 4h

[2] Glynne-Jones R, Meadows H, Wan S, Gollins S, Leslie M, Levine E, et al. EXTRA--a multicenter phase II study of chemo-radiation using a 5 day per week oral regimen of capecitabine and intravenous mitomycin C in anal cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008; 72:119–126.

II- Stade avancé et métastatique:

5FU + CISPLATINE J1=J28. [3]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2 L ou SG 5% 2L en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	45min avant cisplatine
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/m²	Dans SS 0,9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours (j1j2j3j4j5)
J2					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	45min avant cisplatine
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/m²	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L ou SG 5% 1Len 4h

[3] Jaiyesimi IA, Pazdur R. Cisplatin and 5-fluorouracil as salvage therapy for recurrent metastatic squamous cell carcinoma of the anal canal. Am J Clin Oncol 1993; 16:536–540.

CARBOPLATINE + PACLITAXEL J1=J28. [4]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10mg	1cp 4h avant Paclitaxel
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80mg/ m²	500 ml SG 5% ou SS 0.9%
5	Chimiothérapie	Carbolatine	Intraveineuse	AUC5	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage
J8 ET J15					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10mg	1cp 4h avant Paclitaxel
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80mg/ m²	500 ml SG 5% ou SS 0.9%

[4] Rao, S. et al. International Rare Cancers Initiative Multicenter randomized Phase II trial of cisplatin and fluorouracil versus carboplatin and paclitaxel in advanced anal cancer: InterAAct. J Clin Onc 38(22):2510-2518