F- LES TUMEURS STROMALES GASTRO INTESTINALES (GIST)

I- Dans la maladie localisée :

Imatinib 400 mg. [1] [2] [3]

Ordre	Prescription J1	Dose	Voie	Type	Observation
1	Imatinib	400.0mg	Orale	Thérapie ciblée	1cp per os par jour, avec un grand verre d'eau au cours d'un repas pendant 30 jours en continu

[1] Corless CL, Ballman KV, Antonescu CR, Kolesnikova V, Maki RG, Pisters PWT, et al. Pathologic and molecular features correlate with long-term outcome after adjuvant therapy of resected primary GI stromal tumor: the ACOSOG Z9001 trial. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 20 mai 2014;32(15):1563-70.

[2] Joensuu H, Eriksson M, Sundby Hall K, Reichardt A, Hartmann JT, Pink D, et al. Adjuvant Imatinib for High-Risk GI Stromal Tumor: Analysis of a Randomized Trial. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 20 janv 2016;34(3):244-50.

[3] Casali PG, Blay JY, Abecassis N, Bajpai J, Bauer S, Biagini R, et al. Gastrointestinal stromal tumours: ESMO-EURACAN-GENTURIS Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol. janv 2022;33(1):20-33.

II - Dans la maladie localement avancée :

Imatinib 400 mg. [1] [2] [3]

Ordre	Prescription J1	Dose	Voie	Type	Observation
1	Imatinib	400.0mg	Orale	Thérapie ciblée	1cp per os par jour, avec un grand verre d'eau au cours d'un repas pendant 30 jours en continu

[1] Corless CL, Ballman KV, Antonescu CR, Kolesnikova V, Maki RG, Pisters PWT, et al. Pathologic and molecular features correlate with long-term outcome after adjuvant therapy of resected primary GI stromal tumor: the ACOSOG Z9001 trial. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 20 mai 2014;32(15):1563-70.

[2] Joensuu H, Eriksson M, Sundby Hall K, Reichardt A, Hartmann JT, Pink D, et al. Adjuvant Imatinib for High-Risk GI Stromal Tumor: Analysis of a Randomized Trial. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 20 janv 2016;34(3):244-50.

[3] Casali PG, Blay JY, Abecassis N, Bajpai J, Bauer S, Biagini R, et al. Gastrointestinal stromal tumours: ESMO-EURACAN-GENTURIS Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol. janv 2022;33(1):20-33.

Imatinib 800 mg. [3]

Ordre	Prescription J1	Dose	Voie	Type	Observation
1	Imatinib	800.0mg	Orale	Thérapie ciblée	2cp de 400mg , per os par jour, avec un grand verre d'eau au cours d'un repas pendant 30 jours en continu

[3] Casali PG, Blay JY, Abecassis N, Bajpai J, Bauer S, Biagini R, et al. Gastrointestinal stromal tumours: ESMO-EU-RACAN-GENTURIS Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol. janv 2022;33(1):20-33.

III- Dans la maladie métastatique :

Imatinib 400 mg. [1] [2] [3]

Ordre	Prescription J1	Dose	Voie	Type	Observation
1	Imatinib	400.0mg	Orale	Thérapie ciblée	1cp per os par jour, avec un grand verre d'eau au cours d'un repas pendant 30 jours en continu

[1] Corless CL, Ballman KV, Antonescu CR, Kolesnikova V, Maki RG, Pisters PWT, et al. Pathologic and molecular features correlate with long-term outcome after adjuvant therapy of resected primary GI stromal tumor: the ACOSOG Z9001 trial. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 20 mai 2014;32(15):1563-70.

[2] Joensuu H, Eriksson M, Sundby Hall K, Reichardt A, Hartmann JT, Pink D, et al. Adjuvant Imatinib for High-Risk GI Stromal Tumor: Analysis of a Randomized Trial. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 20 janv 2016;34(3):244-50.

[3] Casali PG, Blay JY, Abecassis N, Bajpai J, Bauer S, Biagini R, et al. Gastrointestinal stromal tumours: ESMO-EU-RACAN-GENTURIS Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol. janv 2022;33(1):20-33.

Imatinib 800 mg. [3]

Ordre	Prescription J1	Dose	Voie	Type	Observation
1	Imatinib	800.0mg	Orale	Thérapie ciblée	2cp de 400mg , per os par jour, avec un grand verre d'eau au cours d'un repas pendant 30 jours en continu

[3] Casali PG, Blay JY, Abecassis N, Bajpai J, Bauer S, Biagini R, et al. Gastrointestinal stromal tumours: ESMO-EU-RACAN-GENTURIS Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol. janv 2022;33(1):20-33.

Sunitinib 50mg. [4]

Ordre	Prescription J1	Dose	Voie	Type	Observation
1	Sunitinib	50.0 mg	Orale	Thérapie ciblée	1cp par jour, voie orale, 1 h avant repas ou 2h après repas, 4 semaines sur 6

[4] Demetri GD, van Oosterom AT, Garrett CR, Blackstein ME, Shah MH, Verweij J, et al. Efficacy and safety of sunitinib in patients with advanced gastrointestinal stromal tumour after failure of imatinib: a randomised controlled trial. Lancet Lond Engl. 14 oct 2006;368(9544):1329-38.

Sunitinib 37,5 mg. [5]

Ordre	Prescription J1	Dose	Voie	Type	Observation
1	Sunitinib	37.5 mg	Orale	Thérapie ciblée	1 cp par jour 1 h avant repas ou 2h après repas x 28j en continu

[5] George S, Blay JY, Casali PG, Le Cesne A, Stephenson P, Deprimo SE, et al. Clinical evaluation of continuous daily dosing of sunitinib malate in patients with advanced gastrointestinal stromal tumour after imatinib failure. Eur J Cancer Oxf Engl 1990. juill 2009;45(11):1959-68.

REGORAFENIB 160mg. [6]

Ordre	Prescription J1	Dose	Voie	Type	Observation
1	REGORAFENIB	160.0 mg	Orale	Thérapie ciblée	40mg: 4 cp par jour en continu 1 h avant repas ou 2h après repas x 21j, toutes les 4semaines

[6] Demetri GD, Reichardt P, Kang YK, Blay JY, Rutkowski P, Gelderblom H, et al. Efficacy and safety of regorafenib for advanced gastrointestinal stromal tumours after failure of imatinib and sunitinib (GRID): an international, multicentre, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Lond Engl. 26 janv 2013;381(9863):295-302.