G- LE CANCER DU PANCRÉAS

I- Dans la maladie localisée

RCC avec Capecitabine J1=J22. [1]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Chimiothérapie	Capecitabine	1650.0 mg/M2	Orale	2x/jour : Matin et soir 30 min après le repas, pendant 14 jours

[1] Katz MHG, Shi Q, Ahmad SA, Herman JM, Marsh RDW, Collisson E, et al. Preoperative Modified FOLFIRINOX Treatment Followed by Capecitabine-Based Chemoradiation for Borderline Resectable Pancreatic Cancer: Alliance for Clinical Trials in Oncology Trial A021101. JAMA Surg 2016; 151:e161137.

-

mFOLFIRINOX J1=J15. [2–4]

J1

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0.9 % en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	VO
5	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 500 cc de SG en 2 H
6	Chimiothérapie	Acide Folinique	400.0 mg/ M2	Intraveineuse	(ou L-Folinique 200 mg/ M2) Dans 100 ml de SS en bolus puis rinçage par 100 ml de SG
7	Chimiothérapie	Irinotecan	150.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 500 cc de SG 5% en 1 H

8	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans SG 5% en perfusion continue de 46 h sur diffuseur portable
9	Soins de support	Filgrastim	30 UI	Sous-cutanée	1 inj par jour pdt 5 jours de J7 à J11

[2] Conroy T, Hammel P, Hebbar M, Ben Abdelghani M, Wei AC, Raoul J-L, et al. FOLFIRINOX or Gemcitabine as Adjuvant Therapy for Pancreatic Cancer. N Engl J Med 2018; 379:2395–2406.

[3] Conroy T, Castan F, Lopez A, Turpin A, Ben Abdelghani M, Wei AC, et al. Five-Year Outcomes of FOLFIRINOX vs Gemcitabine as Adjuvant Therapy for Pancreatic Cancer: A Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol 2022; 8:1571.

[4] Katz MHG, Shi Q, Meyers J, Herman JM, Chuong M, Wolpin BM, et al. Efficacy of Preoperative mFOLFIRINOX vs mFOLFIRINOX Plus Hypofractionated Radiotherapy for Borderline Resectable Adenocarcinoma of the Pancreas: The A021501 Phase 2 Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol 2022; 8:1263.

FOLFIRINOX J1=J15. [5]

J1

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
4	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale
5	Chimiothérapie	Irinotecan	180.0 mg/M2	Intraveineuse
6	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/M2	Intraveineuse
7	Chimiothérapie	Acide Folinique	400.0 mg/M2	Intraveineuse
8	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/M2	Intraveineuse
9	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse
10	Soins de support	Filgrastim	30 UI	Intraveineuse

[5] Ghaneh P, Palmer D, Cicconi S, Jackson R, Halloran CM, Rawcliffe C, et al. Immediate surgery compared with short-course neoadjuvant gemcitabine plus capecitabine, FOLFIRINOX, or chemoradiotherapy in patients with borderline resectable pancreatic cancer (ESPAC5): a four-arm, multicentre, randomised, phase 2 trial. The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2023; 8:157–168.

Gemcitabine-Capecitabine J1=J28. [6,7]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie
J1				
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse
5	Chimiothérapie	Capecitabine	1660.0 mg/M2	Orale
6	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	100.0 ml	Intraveineuse
J8				
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	100.0 ml	Intraveineuse
J14				
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	100.0 ml	Intraveineuse

[6] Ghaneh P, Palmer D, Cicconi S, Jackson R, Halloran CM, Rawcliffe C, et al. Immediate surgery compared with short-course neoadjuvant gemcitabine plus capecitabine, FOLFIRINOX, or chemoradiotherapy in patients with borderline resectable pancreatic cancer (ESPAC5): a four-arm, multicentre, randomised, phase 2 trial. The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2023; 8:157–168.

[7] Neoptolemos JP, Palmer DH, Ghaneh P, Psarelli EE, Valle JW, Halloran CM, et al. Comparison of adjuvant gemcitabine and capecitabine with gemcitabine monotherapy in patients with resected pancreatic cancer (ESPAC-4): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. The Lancet 2017; 389:1011–1024.

GEMOX = Gemcitabine-Oxaliplatine J1=J15. [8–9]

J1				
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Dose**	**Voie**
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse
5	Chimiothérapie	Oxaliplatine	100.0 mg/M2	Intraveineuse

[8] Poplin E, Feng Y, Berlin J, Rothenberg ML, Hochster H, Mitchell E, et al. Phase III, Randomized Study of Gemcitabine and Oxaliplatin Versus Gemcitabine (fixed-dose rate infusion) Compared With Gemcitabine (30-minute infusion) in Patients With Pancreatic Carcinoma E6201: A Trial of the Eastern Cooperative Oncology Group. JCO 2009; 27:3778–3785.

[9] Kim EJ, Ben-Josef E, Herman JM, Bekaii-Saab T, Dawson LA, Griffith KA, et al. A multi-institutional phase 2 study of neoadjuvant gemcitabine and oxaliplatin with radiation therapy in patients with pancreatic cancer. Cancer 2013; 119:2692–2700.

GN = Gemcitabine-Nab-Paclitaxel J1, J8, J15 J1=J28. [10]

Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Dose**	**Voie**
J1				
1	Pré-médication	Anti-Histaminique H1	10.0 mg	Orale
2	Pré-médication	Omeprazole	40.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
4	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse

5	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
6	Chimiothérapie	Nab-Pacltaxel	125.0 mg/ M2	Intraveineuse
6	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/ M2	Intraveineuse
J8				
1	Pré-médication	Anti-Histaminique H1	10.0 mg	Orale
2	Pré-médication	Omeprazole	40.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
4	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
5	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
6	Chimiothérapie	Nab-Pacltaxel	125.0 mg/ M2	Intraveineuse
7	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/ M2	Intraveineuse
J15				
1	Pré-médication	Anti-Histaminique H1	10.0 mg	Orale
2	Pré-médication	Omeprazole	40.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
4	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
5	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
6	Chimiothérapie	Nab-Pacltaxel	125.0 mg/ M2	Intraveineuse
7	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/ M2	Intraveineuse

[10] Tempero M, O'Reilly E, Van Cutsem E, Berlin J, Philip P, Goldstein D, et al. LBA-1 Phase 3 APACT trial of adjuvant nab-paclitaxel plus gemcitabine (nab-P + Gem) vs gemcitabine (Gem) alone in patients with resected pancreatic cancer (PC): Updated 5-year overall survival. Annals of Oncology 2021; 32:S226.

Gemcitabine J1, J8, J14 J1=J28. [11]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0.9 % en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% ou SS 0.9 % en 30 min
6	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	100.0 ml	Intraveineuse	Rinçage
J8					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0.9 % en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% ou SS 0.9 % en 30 min
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	100.0 ml	Intraveineuse	Rinçage
J14					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0.9 % en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% ou SS 0.9 % en 30 min
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	100.0 ml	Intraveineuse	Rinçage

[11] Oettle H, Neuhaus P, Hochhaus A, Hartmann JT, Gellert K, Ridwelski K, et al. Adjuvant Chemotherapy With Gemcitabine and Long-term Outcomes Among Patients With Resected Pancreatic Cancer: The CONKO-001 Randomized Trial. JAMA 2013; 310:1473.

II - Dans la maladie localement avancée ou métastatique

FOLFIRINOX J1=J15. [12–15]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
4	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale
5	Chimiothérapie	Irinotecan	180.0 mg/M2	Intraveineuse
6	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/M2	Intraveineuse
7	Chimiothérapie	Acide Folinique	400.0 mg/M2	Intraveineuse
8	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/M2	Intraveineuse
9	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse
10	Soins de support	Filgrastim	30 UI	Intraveineuse

[12] Suker M, Beumer BR, Sadot E, Marthey L, Faris JE, Mellon EA, et al. FOLFIRINOX for locally advanced pancreatic cancer: a systematic review and patient-level meta-analysis. The Lancet Oncology 2016; 17:801–810.

[13] Seufferlein T, Hammel P, Delpero JR, Macarulla T, Pfeiffer P, Prager GW, et al. Optimizing the management of locally advanced pancreatic cancer with a focus on induction chemotherapy: Expert opinion based on a review of current evidence. Cancer Treatment Reviews 2019; 77:1–10.

[14] Conroy T, Desseigne F, Ychou M, Bouché O, Guimbaud R, Bécouarn Y, et al. FOLFIRINOX versus Gemcitabine for Metastatic Pancreatic Cancer. N Engl J Med 2011; 364:1817–1825.

[15] Chan KKW, Guo H, Cheng S, Beca JM, Redmond-Misner R, Isaranuwatchai W, et al. Real-world outcomes of FOLFIRINOX vs gemcitabine and nab-paclitaxel in advanced pancreatic cancer: A population-based propensity score-weighted analysis. Cancer Medicine 2020; 9:160–169.

Gemcitabine J1, J8, J14 J1=J28. [14-15]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie
J1				
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse
6	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	100.0 ml	Intraveineuse
J8				
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	100.0 ml	Intraveineuse
J14				
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	100.0 ml	Intraveineuse

[14] Conroy T, Desseigne F, Ychou M, Bouché O, Guimbaud R, Bécouarn Y, et al. FOLFIRINOX versus Gemcitabine for Metastatic Pancreatic Cancer. N Engl J Med 2011; 364:1817–1825.

[15] Chan KKW, Guo H, Cheng S, Beca JM, Redmond-Misner R, Isaranuwatchai W, et al. Real-world outcomes of FOLFIRINOX vs gemcitabine and nab-paclitaxel in advanced pancreatic cancer: A population-based propensity score-weighted analysis. Cancer Medicine 2020; 9:160–169.

GN = Gemcitabine-Nab-Paclitaxel J1, J8, J15 J1=J28. [17–18]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie
J1				
1	Pré-médication	Anti-Histaminique H1	10.0 mg	Orale
2	Pré-médication	Omeprazole	40.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
4	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
5	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
6	Chimiothérapie	Nab-Pacltaxel	125.0 mg/M2	Intraveineuse
6	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse
J8				
1	Pré-médication	Anti-Histaminique H1	10.0 mg	Orale
2	Pré-médication	Omeprazole	40.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
4	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
5	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
6	Chimiothérapie	Nab-Pacltaxel	125.0 mg/M2	Intraveineuse
7	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse
J15				
1	Pré-médication	Anti-Histaminique H1	10.0 mg	Orale
2	Pré-médication	Omeprazole	40.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
4	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
5	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
6	Chimiothérapie	Nab-Pacltaxel	125.0 mg/M2	Intraveineuse
7	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse

[17] Seufferlein T, Hammel P, Delpero JR, Macarulla T, Pfeiffer P, Prager GW, et al. Optimizing the management of locally advanced pancreatic cancer with a focus on induction chemotherapy: Expert opinion based on a review of current evidence. Cancer Treatment Reviews 2019; 77:1–10.

[18] Von Hoff DD, Ervin T, Arena FP, Chiorean EG, Infante J, Moore M, et al. Increased Survival in Pancreatic Cancer with nab-Paclitaxel plus Gemcitabine. N Engl J Med 2013; 369:1691–1703.

GEMOX = Gemcitabine-Oxaliplatine J1=J15. [19–20]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie
J1				
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse
5	Chimiothérapie	Oxaliplatine	100.0 mg/M2	Intraveineuse

[19] Demols A, Peeters M, Polus M, Marechal R, Gay F, Monsaert E, et al. Gemcitabine and oxaliplatin (GEMOX) in gemcitabine refractory advanced pancreatic adenocarcinoma: a phase II study. Br J Cancer 2006; 94:481–485.

[20] Louvet C, Labianca R, Hammel P, Lledo G, Zampino MG, André T, et al. Gemcitabine in Combination With Oxaliplatin Compared With Gemcitabine Alone in Locally Advanced or Metastatic Pancreatic Cancer: Results of a GERCOR and GISCAD Phase III Trial. JCO 2005; 23:3509–3516.

FOLFIRI J1=J15. [21–23]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie
J1				
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
3	Chimiothérapie	Acide Folinique	400.0 mg/M2	Intraveineuse
4	Chimiothérapie	Irinotecan	180.0 mg/M2	Intraveineuse
5	Pré-médication	Atropine	1.0 mg	Sous-cutan

6	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/M2	Intraveineuse
7	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse

[21] Moretto R, Raimondo L, De Stefano A, Cella CA, Matano E, De Placido S, et al. FOLFIRI in patients with locally advanced or metastatic pancreatic or biliary tract carcinoma: a monoinstitutional experience. Anti-Cancer Drugs 2013; 24:980–985.

[22] Neuzillet C. FOLFIRI regimen in metastatic pancreatic adenocarcinoma resistant to gemcitabine and platinum-salts. WJG 2012; 18:4533.

[23] Zaniboni A, Aitini E, Barni S, Ferrari D, Cascinu S, Catalano V, et al. FOLFIRI as second-line chemotherapy for advanced pancreatic cancer: a GISCAD multicenter phase II study. Cancer Chemother Pharmacol 2012; 69:1641–1645.

Nanoliposomal-Irinotecan-5FULV J1=J15. [24]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie
J1				
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
3	Chimiothérapie	Acide Folinique	400.0 mg/M2	Intraveineuse
4	Chimiothérapie	Nanoliposomal Irinotecan	80.0 mg/M2	Intraveineuse
5	Pré-médication	Atropine	1.0 mg	Sous-cutan
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/M2	Intraveineuse
7	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse

[24] Wang-Gillam A, Li C-P, Bodoky G, Dean A, Shan Y-S, Jameson G, et al. Nanoliposomal irinotecan with fluorouracil and folinic acid in metastatic pancreatic cancer after previous gemcitabine-based therapy (NAPOLI-1): a global, randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet 2016; 387:545–557.

mFOLFOX6 J1=J15. [25–27]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie
J1				
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/M2	Intraveineuse
4	Chimiothérapie	Acide Folinique	400.0 mg/M2	Intraveineuse
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse

[25] Gill S, Ko Y-J, Cripps C, Beaudoin A, Dhesy-Thind S, Zulfiqar M, et al. PANCREOX: A Randomized Phase III Study of Fluorouracil/Leucovorin With or Without Oxaliplatin for Second-Line Advanced Pancreatic Cancer in Patients Who Have Received Gemcitabine-Based Chemotherapy. JCO 2016; 34:3914–3920.

[26] Yoo C, Hwang JY, Kim J-E, Kim TW, Lee JS, Park DH, et al. A randomised phase II study of modified FOLFIRI.3 vs modified FOLFOX as second-line therapy in patients with gemcitabine-refractory advanced pancreatic cancer. Br J Cancer 2009; 101:1658–1663.

[27] Oettle H, Riess H, Stieler JM, Heil G, Schwaner I, Seraphin J, et al. Second-Line Oxaliplatin, Folinic Acid, and Fluorouracil Versus Folinic Acid and Fluorouracil Alone for Gemcitabine-Refractory Pancreatic Cancer: Outcomes From the CONKO-003 Trial. JCO 2014; 32:2423–2429.

LV5FU2 J1=J15. [28]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie
J1				
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse
3	Chimiothérapie	Acide Folinique	400.0 mg/M2	Intraveineuse
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/M2	Intraveineuse
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/M2	Intraveineuse

[28] Gill S, Ko Y-J, Cripps C, Beaudoin A, Dhesy-Thind S, Zulfiqar M, et al. PANCREOX: A Randomized Phase III Study of Fluorouracil/Leucovorin With or Without Oxaliplatin for Second-Line Advanced Pancreatic Cancer in Patients Who Have Received Gemcitabine-Based Chemotherapy. JCO 2016; 34:3914–3920.

Capecitabine J1=J22. [29]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie
J1				
1	Chimiothérapie	Capecitabine	2550.0 mg/M2	Orale

[29] Cartwright TH, Cohn A, Varkey JA, Chen Y-M, Szatrowski TP, Cox JV, et al. Phase II Study of Oral Capecitabine in Patients With Advanced or Metastatic Pancreatic Cancer. JCO 2002; 20:160–164.

Olaparib en continu [30,31]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie
1	Thérapie Ciblée	Olaparib	300.0 mg	Orale

[30] Golan T, Hammel P, Reni M, Van Cutsem E, Macarulla T, Hall MJ, et al. Maintenance Olaparib for Germline BRCA -Mutated Metastatic Pancreatic Cancer. N Engl J Med 2019; 381:317–327.

[31] Kaufman B, Shapira-Frommer R, Schmutzler RK, Audeh MW, Friedlander M, Balmaña J, et al. Olaparib Monotherapy in Patients With Advanced Cancer and a Germline BRCA1/2 Mutation. JCO 2015; 33:244–250.

Pembrolizumab J1=J22 [32]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	200.0 mg	Intraveineuse

[32] Maio M, Ascierto PA, Manzyuk L, Motola-Kuba D, Penel N, Cassier PA, et al. Pembrolizumab in microsatellite instability high or mismatch repair deficient cancers: updated analysis from the phase II KEYNOTE-158 study. Annals of Oncology 2022; 33:929–938.