I- CANCER DES VOIES BILIAIRES

I- Stade localisé:

Capecitabine. [1]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Chimiothérapie	Capecitabine	Orale	2500.0 mg/M2	2x/jour : Matin et soir 30min après le repas, pdt 14J

[1] Primrose JN, Fox R, Palmer DH, Prasad R, Mirza D, Anthoney DA, et al. Adjuvant capecitabine for biliary tract cancer: The BILCAP randomized study. JCO 2017; 35:4006–4006.

II- Stade Localement avancé et métastatique :

Gem-Cisplatine J1 J8 J1=J21.[2]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	IV	1500.0 ml	0.9% 2L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	IV	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	IV	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1000.0 mg/M2	Dans 250 cc SS ou SG en 30 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	IV	25.0 mg/M2	Dans 500 cc SS en 1 H
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	IV	1000.0 ml	0.9% 1L sur 3h

Ordre	Type prescription	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	IV	1500.0 ml	0.9% 2L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	IV	120.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	IV	8.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1000.0 mg/M2	Dans 250 cc SS ou SG en 30 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	IV	25.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	IV	1000.0 ml	0.9% 1L sur 3h

[2] Valle J, Wasan H, Palmer DH, Cunningham D, Anthoney A, Maraveyas A, et al. Cisplatin plus gemcitabine versus gemcitabine for biliary tract cancer. N Engl J Med 2010; 362:1273–1281.

Gemcitabine-Oxaliplatine J1=J15 Gemox. [3]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	IV	2000.0 ml	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	IV	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	IV	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1000.0 mg/M2	Dans 250 cc SS ou SG en 30 min puis rinçage
5	Chimiothérapie	Oxaliplatine	IV	100.0 mg/ M2	Dans 250 cc SG en 2H puis rinçage
6	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	IV	1000.0 ml	0.9% 1L sur 3h

[3] André T, Tournigand C, Rosmorduc O, Provent S, Maindrault-Goebel F, Avenin D, et al. Gemcitabine combined with oxaliplatin (GEMOX) in advanced biliary tract adenocarcinoma: a GERCOR study. Ann Oncol 2004; 15:1339–1343.

FOLFOX J1=J15. [4]

Ordre	Type prescription	Produit / Protocole	Voie	Dose
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	IV	250.0 ml
2	Pré-médication	Methylprednisolone	IV	120.0 mg
3	Pré-médication	Ondansetron	IV	8.0 mg
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	IV	400.0 mg
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	IV	2400.0 mg/M2
6	Chimiothérapie	Acide Folique	IV	400.0 mg/M2
7	Chimiothérapie	Oxaliplatine	IV	85.0 mg/M2
8	Rinçage	Chlorure De Sodium	IV	1000.0 ml

[4] Lamarca A, Palmer DH, Wasan HS, Ross PJ, Ma YT, Arora A, et al. Second-line. FOLFOX chemotherapy versus active symptom control for advanced biliary tract cancer (ABC-06): a phase 3, open-label, randomised, controlled trial. The Lancet Oncology 2021; 22:690–701.

FOLFIRI J1=J15. [5]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	IV	2000.0 ml	0.9% 2L sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	IV	120.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	IV	8.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Irinotecan	IV	180.0 mg/M2	Dans 250 cc SG 5% en Y de l'Acide folinique puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Acide Folique	IV	400.0 mg/M2	Dans 250 cc SG 5% en Y de l'Irinotécan puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Atropine	IV	1.0 mg	Sous-cutanée durant la perfusion d'Irinotécan
7	Chimiothérapie	Fluorouracil	IV	400.0 mg/M2	Dans 100 cc SG 5% en bolus
8	Chimiothérapie	Fluorouracil	IV	2400.0 mg/M2	Dans SG 5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

[5] Choi IS, Kim KH, Lee JH, Suh KJ, Kim J-W, Park JH, et al. A randomised phase II study of oxaliplatin/5-FU (mFOLFOX) versus irinotecan/5-FU (mFOLFIRI) chemotherapy in locally advanced or metastatic biliary tract cancer refractory to first-line gemcitabine/cisplatin chemotherapy. Eur J Cancer 2021; 154:288–295.

XELOX J1=J21 [6]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	130.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Capecitabine	Orale	2000.0 mg/M2	2x/jour : Matin et soir 30min après le repas, pdt 14J

[6] O Nehls 1, H Oettle, J T Hartmann, R-D Hofheinz, H G Hass, M S Horger, U Koppenhöfer, A Hochhaus, J Stieler, J Trojan, M Gregor, B Klump. Capecitabine plus oxaliplatin as first-line treatment in patients with advanced biliary system adenocarcinoma: a prospective multicentre phase II trial. Br J Cancer. 2008 Jan 29;98(2):309-15. doi: 10.1038/sj.bjc.6604178. Epub 2008 Jan 8.

LV5FU2 J1=J15. [7]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	IV	2000.0 ml	0.9% 2L sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	IV	120.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	IV	8.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Acide Folique	IV	400.0 mg/M2	dans 250 cc de SG 5% puis rinçage
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	IV	400.0 mg/M2	dans 100 cc de SG5% en bolus
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	IV	2400.0 mg/M2	Ds SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

[7] Schinzari G, Rossi E, Mambella G, Strippoli A, Cangiano R, Mutignani M, et al. First-line Treatment of Advanced Biliary Ducts Carcinoma: A Randomized Phase II Study Evaluating 5-FU/LV Plus Oxaliplatin (Folfox 4) Versus 5-FU/LV (de Gramont Regimen). Anticancer Res 2017; 37:5193–5197.

Pembrolizumab J1=J21. [8]

Ordre	Type prescription	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	IV	200.0 mg	Dans 200 cc de SS 0,9%

[8] Marabelle A, Le DT, Ascierto PA, Di Giacomo AM, De Jesus-Acosta A, Delord J- P, et al. Efficacy of Pembrolizumab in Patients With Noncolorectal High Microsatellite Instability/Mismatch Repair-Deficient Cancer: Results From the Phase II KEYNOTE-158 Study. J Clin Oncol 2020; 38:1–10.