A- LES CANCERS EPITHÉLIAUX DE L'OVAIRE :

I- Stades localisés :

Paclitaxel Carboplatine J1=J21 [1]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	20mg 1 cp le jour de la chimio
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1cp 4h avant Paclitaxel
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	Dans 500 ml SG 5% ou SS 0.9% en 3h
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage

[1] Guidelines National comprehensive cancer network.NCCN clinical practice guidelines in oncology, ovarian cancer including fallopian tube cancer and primary peritoneal cancer. Version 1.2021

II - Stades avancés :

Paclitaxel Carboplatine J1=J21 [2]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	20mg 1 cp le jour de la chimio
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1cp 4h avant Paclitaxel
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0mg	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/ M2	Dans 500 ml SG 5% ou SS 0.9% en 3h
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage

[2] du Bois A, Lück H-J, Meier W, Adams H-P, Möbus V, Costa S, et al. A randomized clinical trial of cisplatin/paclitaxel versus carboplatin/paclitaxel as first-line treatment of ovarian cancer. J Natl Cancer Inst 2003; 95:1320–1329.

Paclitaxel J1,J8, J15 Carboplatine J1, J1=J21 [3]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1cp 4h avant Paclitaxel
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	20mg 1 cp le jour de la chimio
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ m2	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage
J8					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1cp 4h avant Paclitaxel
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	20mg 1 cp le jour de la chimio
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h
J15					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1cp 4h avant Paclitaxel
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	20mg 1 cp le jour de la chimio
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h

[3] Katsumata N, Yasuda M, Takahashi F, Isonishi S, Jobo T, Aoki D, et al. Dose-dense paclitaxel once a week in combination with carboplatin every 3 weeks for advanced ovarian cancer: a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet 2009; 374:1331–1338.

Paclitaxel J1,J8,J15 Carboplatine J1,J8,J15 J1=J21 [4]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1cp 4h avant Paclitaxel
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	20mg 1 cp le jour de la chimio
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	20.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ m2	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 2.0	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage
J8					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1cp 4h avant Paclitaxel
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	20mg 1 cp le jour de la chimio
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 2.0	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage
J15					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1cp 4h avant Paclitaxel
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	20mg 1 cp le jour de la chimio
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ m2	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h

5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 2.0	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage

[4] Chan JK, Brady MF, Penson RT, et al. Weekly vs. every-3-week paclitaxel and carboplatin for ovarian cancer. N Engl J Med 2016;374:738-48. DOI: 10.1056/NEJMoa1505067

Docetaxel-Carboplatine J1=J21 [5]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Clartec 1cp 4h avant Paclitaxel
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Omeprazole 20mg 1 cp le jour de la chimio
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Thérapie ciblée	Bevacizumab	Intraveineuse	7.5 mg/KG	100 ml SG 5% TA et BU avant Bevacizumab, TA après Bevacizumab
5	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	75.0 mg/M2	500 ml SS 0.9% sur 1 heure
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage

[5] Vasey PA, Jayson GC, Gordon A, Gabra H, Coleman R, Atkinson R, Parkin D, Paul J, Hay A, Kaye SB; Scottish Gynaecological Cancer Trials Group. Phase III randomized trial of docetaxel-carboplatin versus paclitaxel-carboplatin as first-line chemotherapy for ovarian carcinoma. J Natl Cancer Inst. 2004 Nov 17;96(22):1682-91. doi: 10.1093/jnci/djh323. PMID: 15547181.

Doxorubicine Liposomal Pegylee - Carboplatine J1=J28 [6]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5.0 (max 790mg)	Intraveineuse	AUC 5 500 ml SG 5%
5	Chimiothérapie	Doxorubicine Liposomale Pegylee	30.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 250 ml SG 5% en 1h

[6] Pujade-Lauraine E, Wagner U, Aavall-Lundqvist E, et al. Pegylated liposomal doxorubicin and carboplatin compared with paclitaxel and carboplatin for patients with platinum-sensitive ovarian cancer in late relapse. J Clin Oncol 2010;28:3323- 3329.

Gemcitabine-Carboplatine J1 J8 J1=J21 [7]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 4.0	Intraveineuse	AUC 4 100 ml SG 5%
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SS 0.9% en 30 min
5	Rinçage	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	
J8					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie

2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SS 0.9% en 30 min
5	Rinçage	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	

[7] Gordon AN, Teneriello M, Janicek MF, Hines J, Lim PC, Chen MD, et al. Phase III trial of induction gemcitabine or paclitaxel plus carboplatin followed by paclitaxel consolidation in ovarian cancer. Gynecol Oncol 2011; 123:479–485.

Doxorubicine Liposomal Pegylee Carboplatine J1=J28 [8]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5.0 (max 790mg)	Intraveineuse	AUC 5 500 ml SG 5%
5	Chimiothérapie	Doxorubicine Liposomale Pegylee	30.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 250 ml SG 5% en 1h
6	Rinçage	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	

[8] Pignata S, Scambia G, Ferrandina G, et al. Carboplatin plus paclitaxel versus carboplatin plus pegylated liposomal doxorubicin as first-line treatment for patients with ovarian cancer: the MITO-2 randomized phase III trial. J Clin Oncol. 2011;29(27):3628-3635.

Gemcitabine J1 J8 J15 J1=J21 [9]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SS 0.9% en 30 min
J8					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SS 0.9% en 30 min
J15					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SS 0.9% en 30 min

[9] Friedlander M, Millward MJ, Bell D, Bugat R, Harnett P, Moreno JA, et al. A phase II study of gemcitabine in platinum pre-treated patients with advanced epithelial ovarian cancer. Annals of Oncology 1998; 9:1343–1345.

Paclitaxel J1 J8 J15 J1=J21 [10]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	20.0 mg	Orale	20mg 1 cp le jour de la chimio
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	10.0 mg	Orale	1cp 4h avant Paclitaxel
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Paclitaxel	80.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h
J8					
1	Pré-médication	Omeprazole	20.0 mg	Orale	20mg 1 cp le jour de la chimio
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	10.0 mg	Orale	1cp 4h avant Paclitaxel
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Paclitaxel	80.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h
J15					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	10.0 mg	Orale	1cp 4h avant Paclitaxel
1	Pré-médication	Omeprazole	20.0 mg	Orale	20mg 1 cp le jour de la chimio
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Paclitaxel	80.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h

[10] Gynecologic Oncology Group, Markman M, Blessing J, Rubin SC, Connor J, Hanjani P, et al. Phase II trial of weekly paclitaxel (80 mg/m2) in platinum and paclitaxel-resistant ovarian and primary peritoneal cancers: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol 2006; 101:436–440.

Doxorubicine J1 =J21 [11]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Doxorubicine	60.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SG 5% en 15 min

[11] Bolis G, D'Incalci M, Gramellini F, Mangioni C. Adriamycin in ovarian cancer patients resistant to cyclophosphamide. Eur J Cancer (1965) 1978; 14:1401–1402.

Topotecan J1 à J5 J1=J21 [12]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Topotecan	1.5 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SG 5% ou SS0.9% en 30min
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	ONDANSETRON	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie

3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Topotecan	1.5 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SG 5% ou SS 0.9% en 30 min
J3					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Topotecan	1.5 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SG 5% ou SS 0.9% en 30 min
J4					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Topotecan	1.5 mg/ M2		Dans 100 ml SG 5% ou SS 0.9% en 30 min
J5					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Topotecan	1.5 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SG 5% ou SS 0.9% en 30 min

[12] Sehouli J, Stengel D, Harter P, Kurzeder C, Belau A, Bogenrieder T, et al. Topotecan Weekly Versus Conventional 5-Day Schedule in Patients With Platinum-Resistant Ovarian Cancer: A Randomized Multicenter Phase II Trial of the North-Eastern German Society of Gynecological Oncology Ovarian Cancer Study Group. JCO 2011; 29:242–248.

Doxorubicine Liposomal J1=J28 [13]

Ordre	Type	Produit / protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Doxorubicine Liposomale Pegylee	40.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 ml SG 5% en 1h

[13] Gordon AN, Tonda M, Sun S, Rackoff W, Doxil Study 30-49 Investigators. Long-term survival advantage for women treated with pegylated liposomal doxorubicin compared with topotecan in a phase 3 randomized study of recurrent and refractory epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol 2004; 95:1–8.

Carboplatine J1=J21 [14]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5.0 (max 790mg)	Intraveineuse	AUC 5 500 ml SG 5%

[14] ICON2: randomised trial of single agent carboplatin against three drug combination of CAP (cyclophosphamide, doxorubicin, and cisplatin) in women with ovarian cancer. ICON Collaborators. International Collaborative Ovarian Neoplasm Study. Lancet 1998;352(9140):1571-6

Docetaxel J1=21 [15]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	20.0 mg	Orale	Omeprazole 20mg 1 cp le jour de la chimio
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	10.0 mg	Orale	Clartec 1cp 4h avant Paclitaxel
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Docetaxel	100.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h

[15] Rose PG, Blessing JA, Ball HG, et al. A phase II study of docetaxel in paclitaxel-resistant ovarian and peritoneal carcinoma: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol 2003;88:130-135.

Etoposide oral en continu [16]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Chimiothérapie	Etoposide	50 mg	Orale	1cp/j en continu

[16] Rose PG, Blessing JA, Mayer AR, Homesley HD. Prolonged oral etoposide as second-line therapy for platinum-resistant and platinum-sensitive ovarian carcinoma: a Gynecologic Oncology Group study. J Clin Oncol 1998;16:405-410

Cyclophosphamide Oral [17]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	50 mg	Orale	1cp/j pendant 28 jours

[17] Watanabe Y, Etoh T, Koike E et al. Feasibility study of oral cyclophosphamide salvage therapy for the treatment of heavily pre-treated patients with recurrent epithelial ovarian cancer. Int J Clin Oncol 2010; 16 (5): 468-471.

Paclitaxel Carboplatine Bevacizumab J1=J21 [18,19]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	10.0 mg	Orale	Clartec 1cp 4h avant Paclitaxel
1	Pré-médication	Omeprazole	20.0 mg	Orale	Omeprazole 20mg 1 cp le jour de la chimio
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Thérapie ciblée	Bevacizumab	7.5 mg/ KG	Intraveineuse	100 ml SG 5% TA et BU avant Bevacizumab, TA après Bevacizumab
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	175.0 mg/M2	Intraveineuse	500 ml SG 5% ou SS 0.9%
6	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5.0	Intraveineuse	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage

[18] Burger RA, Brady MF, Bookman MA, Fleming GF, Monk BJ, Huang H, et al. Incorporation of bevacizumab in the primary treatment of ovarian cancer. N Engl J Med 2011; 365:2473–2483.

[19] Perren TJ, Swart AM, Pfisterer J, Ledermann JA, Pujade-Lauraine E, Kristensen G, et al. A phase 3 trial of bevacizumab in ovarian cancer. N Engl J Med 2011; 365:2484–2496.

Paclitaxel J1, J8, J15 Carboplatine J1 Bevacizumab J1 J1=J21 [20]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	20.0 mg	Orale	Omeprazole 20mg 1 cp le jour de la chimio
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	10.0 mg	Orale	Clartec 1cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Bevacizumab	7.5 mg/ kg	Intraveineuse	100 ml SS 0.9 % TA et BU avant Bevacizumab, TA après Bevacizumab
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	80.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h
7	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC5	Intraveineuse	100 ml SG 5% puis rinçage
J8					
1	Pré-médication	Omeprazole	20.0 mg	Orale	Omeprazole 20mg 1 cp le jour de la chimio
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	10.0 mg	Orale	Clartec 1cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	80.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h
J15					
1	Pré-médication	Omeprazole	20.0 mg	Orale	Omeprazole 20mg 1 cp le jour de la chimio
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	10.0 mg	Orale	Clartec 1cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	80.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h

[20] Gonzalez-Martin A, Gladieff L, Tholander B, Stroyakovsky D, Gore M, Scambia G, et al. Efficacy and safety results from OCTAVIA, a single-arm phase II study evaluating front-line bevacizumab, carboplatin and weekly paclitaxel for ovarian cancer. European Journal of Cancer 2013; 49:3831–3838.

Docetaxel-Carboplatine-bevacizumab [21]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	10.0 mg	Orale	Clartec 1cp 4h avant Paclitaxel
2	Pré-médication	Omeprazole	20.0 mg	Orale	Omeprazole 20mg 1 cp le jour de la chimio
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Bevacizumab	7.5 mg/KG	Intraveineuse	100 ml SG 5% TA et BU avant Bevacizumab, TA après Bevacizumab
6	Chimiothérapie	Docetaxel	75.0 mg/M2	Intraveineuse	500 ml SS 0.9% sur 1 heure
7	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5.0	Intraveineuse	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage

[21] Vasey PA, Jayson GC, Gordon A, Gabra H, Coleman R, Atkinson R, Parkin D, Paul J, Hay A, Kaye SB; Scottish Gynaecological Cancer Trials Group. Phase III randomized trial of docetaxel-carboplatin versus paclitaxel-carboplatin as first-line chemotherapy for ovarian carcinoma. J Natl Cancer Inst. 2004 Nov 17;96(22):1682-91. doi: 10.1093/jnci/djh323. PMID: 15547181.

Gemcitabine-Carboplatine-Bevacizumab J1 J8 J1= J21 [22]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylpredniso-lone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Bevacizumab	7.5 mg/kg	Intraveineuse	100 ml SS 0.9 % TA et BU avant Bevacizumab, TA après Bevacizumab
4	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 4.0	Intraveineuse	AUC 4 100 ml SG 5%
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 100 ml SS 0.9% en 30 min
J8					
1	Pré-médication	Methylpredniso-lone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 100 ml SS 0.9% en 30 min

[22] Aghajanian C, Blank SV, Goff BA, Judson PL, Teneriello MG, Husain A, et al. OCEANS: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase III trial of chemotherapy with or without bevacizumab in patients with platinum-sensitive recurrent epithelial ovarian, primary peritoneal, or fallopian tube cancer. J Clin Oncol 2012; 30:2039–2045.

Paclitaxel Bevacizumab J1 J8 J1=J21 [23]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	20.0 mg	Orale	20mg 1 cp le jour de la chimio
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	10.0 mg	Orale	1cp 4h avant Paclitaxel
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Thérapie ciblée	Bevacizumab	7.5 mg/ kg	Intraveineuse	100 ml SS 0.9 % TA et BU avant Bevacizumab, TA après Bevacizumab
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	80.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h
J8					
1	Pré-médication	Omeprazole	20.0 mg	Orale	20mg 1 cp le jour de la chimio
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	10.0 mg	Orale	1cp 4h avant Paclitaxel
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	80.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h

[23] Pujade-Lauraine E, Hilpert F, Weber B, et al. Bevacizumab combined with chemotherapy for platinum-resistant recurrent ovarian cancer: The AURELIA open-label randomized phase III trial. J Clin Oncol 2014;32:1302-1308.

Topotecan Bevacizumab J1=J21 [24]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Thérapie ciblée	Bevacizumab	7.5 mg/ KG	Intraveineuse	100 ml SS 9%, BU avant Bevacizumab. Tension artérielle avant et après Bevacizumab
5	Chimiothérapie	Topotecan	1.5 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SG 5% ou SS0.9% en 30min
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Topotecan	1.5 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SG 5% ou SS 0.9% en 30 min
J3					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Topotecan	1.5 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SG 5% ou SS 0.9% en 30 min

J4					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Topotecan	1.5 mg/ M2		Dans 100 ml SG 5% ou SS 0.9% en 30 min
J5					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Topotecan	1.5 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SG 5% ou SS 0.9% en 30 min

[24] Pujade-Lauraine E, Hilpert F, Weber B, Reuss A, Poveda A, Kristensen G, et al. Bevacizumab combined with chemotherapy for platinum-resistant recurrent ovarian cancer: The AURELIA open-label randomized phase III trial. J Clin Oncol 2014; 32:1302–1308

Doxorubicine Liposomal Pegylee - Carboplatine - Bevacizumab J1=J28 [25]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie

4	Thérapie ciblée	Bevacizumab	7.5 mg/ KG	Intraveineuse	100 ml SS 9%, BU avant Bevacizumab. Tension artérielle avant et après Bevacizumab
5	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5.0 (max 790mg)	Intraveineuse	AUC 5 500 ml SG 5%
6	6	Doxorubicine Lipo-somale Pegylee	30.0 mg/ m2	Intraveineuse	Dans 250 ml SG 5% en 1h
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	

[25] Pfisterer J, Dean AP, Baumann K, et al. Carboplatin/pegylated liposomal doxorubicin/bevacizumab (CD-BEV) vs. carboplatin/gemcitabine/bevacizumab (CG- BEV) in patients with recurrent ovarian cancer. A prospective randomized phase III ENGOT/GCIG-Intergroup study (AGO Study Group, AGO-Austria, ANZGOG, GINECO, SGCTG). Presented at: 2018 ESMO Congress; October 19-23, 2018; Munich, Germany. Abstract 933O.

Cyclophosphamide Bevacizumab J1 J14 J1 = J28 [26]

Ordre	Type	Produit/ protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Thérapie ciblée	Bevacizumab	7.5 mg/ kg	Intraveineuse	100 ml SS 9%, BU avant Bevacizumab. Tension artérielle avant et après Bevacizumab
2	Chimiothé-rapie	Cyclophospha-mide	50 mg	Orale	1cp/j pendant 28 jours
J14					
1	Thérapie ciblée	Bevacizumab	7.5 mg/ kg	Intraveineuse	100 ml SS 9%, BU avant Bevacizu-mab. Tension artérielle avant et après Bevacizumab

[26] Barber EL, Zsiros E, Lurain JR, et al. The combination of intravenous bevacizumab and metronomic oral cyclophos-phamide is an effective regimen for platinum-resistant recurrent ovarian cancer. J Gynecol Oncol 2013;24:258-264.

III - Traitement en maintenance :

Bevacizumab J1= J21 [27]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Bevacizumab	15 mg/ kg	Intraveineuse	100 ml SS 9%, BU avant Bevacizumab. Tension artérielle avant et après Bevacizumab

[27] Cannistra SA, Matulonis UA, Penson RT, et al. Phase II study of bevacizumab in patients with platinum-resistant ovarian cancer or peritoneal serous cancer. J Clin Oncol 2007;25:5180-5186.

Olaparib – Bevacizumab J1 = J21 [28]

Ordre	Type	Produit/ protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Bevacizumab	15 mg/ kg	Intraveineuse	100 ml SS 9%, BU avant Bevacizumab. Tension artérielle avant et après Bevacizumab
2	Thérapie ciblée	Olaparib	300 mg	Orale	1cp x 2/j en continu

[28] I Ray-Coquard , A Leary , S Pignata et al, Olaparib plus bevacizumab as first-line maintenance in ovarian cancer. N Engl J Med 2019;381:2416-2428.

Niraparib – Bevacizumab J1 = J21 [29]

Ordre	Type	Produit/ protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Bevacizumab	15 mg/ kg	Intraveineuse	100 ml SS 9%, BU avant Bevacizumab. Tension artérielle avant et après Bevacizumab
2	Chimiothérapie	Niraparib	300 mg	Orale	1cp /j en continu

[29] Hardesty MM, Krivak TC, Wright GS, et al. OVARIO phase II trial of combination niraparib plus bevacizumab maintenance therapy in advanced ovarian cancer following first-line platinum-based chemotherapy with bevacizumab. Gynecol Oncol 2022;166:219-229

Olaparib en maintenance [30]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Olaparib	300 mg	Orale	1cp x 2/j en continu

[30] Moore K, Colombo N, Scambia G, et al. Maintenance olaparib in patients with newly diagnosed advanced ovarian cancer. N Eng J Med 2018 ;379:2495-2505

Niraparib en maintenance [31]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Niraparib	300 mg	Orale	1cp /j en continu

[31] González-Martín A, Pothuri B, Vergote I, Graybill W, Lorusso D, McCormick CC, Freyer G, Backes F, Heitz F, Redondo A, Moore RG, Vulsteke C, O'Cearbhaill RE, Malinowska IA, Shtessel L, Compton N, Mirza MR, Monk BJ. Progression-free survival and safety at 3.5years of follow-up: results from the randomised phase 3 PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012 trial of niraparib maintenance treatment in patients with newly diagnosed ovarian cancer. Eur J Cancer. 2023 Aug;189:112908. doi: 10.1016/j.ejca.2023.04.024. Epub 2023 May 3. PMID: 37263896.

Rucaparib en maintenance [32]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Rucaparib	600 mg	Orale	1cpx2 /j en continu

[32] Ledermann JA, Oza AM, Lorusso D, Aghajanian C, Oaknin A, Dean A, Colombo N, Weberpals JI, Clamp AR, Scambia G, Leary A, Holloway RW, Gancedo MA, Fong PC, Goh JC, O'Malley DM, Armstrong DK, Banerjee S, García-Donas J, Swisher EM, Cameron T, Maloney L, Goble S, Coleman RL. Rucaparib for patients with platinum-sensitive, recurrent ovarian carcinoma (ARIEL3): post-progression outcomes and updated safety results from a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2020 May;21(5):710-722. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30061-9. PMID: 32359490; PMCID: PMC8210534.