B - LES TUMEURS RARES DE L'OVAIRE :

I- Les carcinosarcomes :

CARBOPLATINE – IFOSFAMIDE J1 à J3, J1=J21 :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L en 6 heures
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	10.0 mg	Orale	1cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	10.0MG	Intraveineuse	IVL
6	Pré-médication	Mesna	1800.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 100cc SS en 15min
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	1800.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 1L SS en 4h
8	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5.0	Intraveineuse	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	SS0.9% en 3 heures
J2					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	10.0MG	Intraveineuse	IVL
5	Pré-médication	Mesna	1800.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 100cc SS en 15min
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1800.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 1L SS en 4h

7	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	SS0.9% en 3 heures
J3					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	10.0MG	Intraveineuse	IVL
5	Pré-médication	Mesna	1800.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 100cc SS en 15min
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1800.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 1L SS en 4h
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	SS0.9% en 3 heures
9	Soins de support	Filgrastim	30.0 UNITE	Sous-cutanée	Neupogen ou Gran: 1 injection ss-cutanée par jour de j5 à j10

Dandamudi RK, Aslam S, Walji N, El-Modir A, Fernando I. Chemotherapy for Uterine Carcinosarcoma with Carboplatin, Ifosfamide and Mesna. Anticancer Res. 2015 Sep;35(9):4841-7. PMID: 26254376.

PACLITAXEL – IFOSFAMIDE J1 à J3, J1=J21 :

Ordre	Type	Produit/Protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L en 6 heures
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	10.0 mg	Orale	1cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie

4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	10.0MG	Intraveineuse	IVL
6	Pré-médication	Mesna	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 100cc SS en 15min
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 1L SS en 4h
8	Chimiothérapie	Paclitaxel	175.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 500 ml SG 5% ou SS 0.9% en 3h
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	SS0.9% en 3 heures
J2					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	10.0MG	Intraveineuse	IVL
5	Pré-médication	Mesna	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 100cc SS en 15min
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 1L SS en 4h
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	SS0.9% en 3 heures
J3					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	10.0MG	Intraveineuse	IVL
5	Pré-médication	Mesna	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 100cc SS en 15min
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 1L SS en 4h

7	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	SS0.9% en 3 heures
9	Soins de support	Filgrastim	30.0 UNITE	Sous-cutanée	Neupogen ou Gran: 1 injection ss-cutanée par jour de j5 à j10

Powell MA, Filiaci VL, Hensley ML, Huang HQ, Moore KN, Tewari KS, Copeland LJ, Secord AA, Mutch DG, Santin A, Warshal DP, Spirtos NM, DiSilvestro PA, Ioffe OB, Miller DS. Randomized Phase III Trial of Paclitaxel and Carboplatin Versus Paclitaxel and Ifosfamide in Patients With Carcinosarcoma of the Uterus or Ovary: An NRG Oncology Trial. J Clin Oncol. 2022 Mar 20;40(9):968-977. doi: 10.1200/JCO.21.02050. Epub 2022 Jan 10. PMID: 35007153; PMCID: PMC8937015.

CISPLATINE – IFOSFAMIDE J1 à J3, J1=J21 :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L en 6 heures
2	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Vinblastine	0.11 mg/KG	Intraveineuse	Dans 100 cc SS en 10 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Pré-médication	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
8	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 1 heure
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L en 3 heures
J2					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimothérapie

6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Chimiothérapie	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
8	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 60 min
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J3					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimothérapie
5	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
6	Chimiothérapie	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
7	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 60 min
8	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J4					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimothérapie
5	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
6	Chimiothérapie	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
7	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 60 min

8	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J5					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
6	Pré-médication	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
7	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 30 min
8	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
9	Soins de support	Filgrastim	30.0 UNITE	Sous-cutanée	Neupogen ou Gran: 1 injection ss-cutanée par jour de j5 à j10

Sutton G, Brunetto VL, Kilgore L, Soper JT, McGehee R, Olt G, Lentz SS, Sorosky J, Hsiu JG. A phase III trial of ifosfamide with or without cisplatin in carcinosarcoma of the uterus: A Gynecologic Oncology Group Study. Gynecol Oncol. 2000 Nov;79(2):147-53. doi: 10.1006/gyno.2000.6001. PMID: 11063636

II - LES CARCINOMES À CELLULES CLAIRES :

IRINOTECAN – Cisplatine J1,J8,J15 J1=J21 :

J1

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L en 6 heures
2	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Prémédication	Methylpredniso-lone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Atropine	1.0 mg	Sous-cutanée	Sous-cutanée durant la perfusion d'Irinotécan
6	Chimiothérapie	Irinotecan	60.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% puis rinçage SG
7	Chimiothérapie	Cisplatine	60.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 1 heure
8	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L en 3 heures

J8

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Prémédication	Methylpredniso-lone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Atropine	1.0 mg	Sous-cutanée	Sous-cutanée durant la perfusion d'Irinotécan
4	Chimiothérapie	Irinotecan	180.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% puis rinçage SG

J15					
Ordre	**Type**	**Produit/protocole**	**Dose**	**Voie**	**Observation**
1	Prémédication	Methylpredniso-lone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimio-thérapie
2	Prémédication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimio-thérapie
3	Prémédication	Atropine	1.0 mg	Sous-cutanée	Sous-cutanée durant la perfusion d'Irinotécan
4	Chimiothérapie	Irinotecan	180.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc de SG 5% puis rinçage SG

Sugiyama T, Okamoto A, Enomoto T, Hamano T, Aotani E, Terao Y, Suzuki N, Mikami M, Yaegashi N, Kato K, Yoshikawa H, Yokoyama Y, Tanabe H, Nishino K, Nomura H, Kim JW, Kim BG, Pignata S, Alexandre J, Green J, Isonishi S, Terauchi F, Fujiwara K, Aoki D. Randomized Phase III Trial of Irinotecan Plus Cisplatin Compared With Paclitaxel Plus Carboplatin As First-Line Chemotherapy for Ovarian Clear Cell Carcinoma: JGOG3017/GCIG Trial. J Clin Oncol. 2016 Aug 20;34(24):2881-7. doi: 10.1200/JCO.2016.66.9010. Epub 2016 Jul 11. PMID: 27400948.

III - LES CARCINOMES MUCINEUX :

FLUOROUACILE – LEUCOVORIN – OXALIPLATINE (FOLFOX4) J1=J15

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% en Y de lacide folinique puis rinçage SG
3	Chimiothérapie	Acide Folique	200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 100 cc de SG5% en bolus
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	600.0 mg/M2	Intraveineuse	Ds SG5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

Conteduca V, Gurioli G, Rossi L, Scarpi E, Lolli C, Schepisi G, Farolfi A, De Lisi D, Gallà V, Burgio SL, Menna C, Amadori A, Losi L, Amadori D, Costi MP, De Giorgi U. Oxaliplatin plus leucovorin and 5-fluorouracil (FOLFOX-4) as a salvage chemotherapy in heavily-pretreated platinum-resistant ovarian cancer. BMC Cancer. 2018 Dec 19;18(1):1267. doi: 10.1186/s12885-018-5180-1. PMID: 30567527; PMCID: PMC6300035.

Kurnit KC, Sinno AK, Fellman BM, Varghese A, Stone R, Sood AK, Gershenson DM, Schmeler KM, Malpica A, Fader AN, Frumovitz M. Effects of Gastrointestinal-Type Chemotherapy in Women With Ovarian Mucinous Carcinoma. Obstet Gynecol. 2019 Dec;134(6):1253-1259. doi: 10.1097/AOG.0000000000003579. PMID: 31764736; PMCID: PMC7100606

XELOX J1=J21

J1					
Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Prémédication	Methylpredniso-lone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie

3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	130.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Capecitabine	2000.0 mg/M2	Orale	2x/jour : Matin et soir 30 min après le repas, pdt 14J

Gore M, Hackshaw A, Brady WE, Penson RT, Zaino R, McCluggage WG, Ganesan R, Wilkinson N, Perren T, Montes A, Summers J, Lord R, Dark G, Rustin G, Mackean M, Reed N, Kehoe S, Frumovitz M, Christensen H, Feeney A, Ledermann J, Gershenson DM. An international, phase III randomized trial in patients with mucinous epithelial ovarian cancer (mEOC/GOG 0241) with long-term follow-up: and experience of conducting a clinical trial in a rare gynecological tumor. Gynecol Oncol. 2019 Jun;153(3):541-548. doi: 10.1016/j.ygyno.2019.03.256. Epub 2019 Apr 18. PMID: 31005287; PMCID: PMC6559214.

McCluggage WG, Ganesan R, Wilkinson N, Perren T, Montes A, Summers J, Lord R, Dark G, Rustin G, Mackean M, Reed N, Kehoe S, Frumovitz M, Christensen H, Feeney A, Ledermann J, Gershenson DM. An international, phase III randomized trial in patients with mucinous epithelial ovarian cancer (mEOC/GOG 0241) with long-term follow-up: and experience of conducting a clinical trial in a rare gynecological tumor. Gynecol Oncol. 2019 Jun;153(3):541-548. doi: 10.1016/j.ygyno.2019.03.256. Epub 2019 Apr 18. PMID: 31005287; PMCID: PMC6559214.

CAPECITABINE – OXALIPLATINE – BEVACIZUMAB J1=J21 :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	130.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 250 cc de SG 5% puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Capecitabine	825 mg/M2	Orale	2x/jour : Matin et soir 30min après le repas, pdt 14J
5	Thérapie ciblée	Bevacizumab	7.5 mg/KG	Intraveineuse	100 ml SS 9%, BU avant Bevacizumab. Tension artérielle avant et après Bevacizumab

Martin Eric Gore et al. Multicentre trial of carboplatin/paclitaxel versus oxaliplatin/capecitabine, each with/without bevacizumab, as first line chemotherapy for patients with mucinous epithelial ovarian cancer (mEOC).. JCO 33, 5528-5528(2015). DOI:10.1200/jco.2015.33.15_suppl.5528

IV- LES TUMEURS GERMINALES ET LES TUMEURS STROMALES ET DES CORDONS SEXUELS :

Bleomycine Etoposide Cisplatine (BEP) J1=J21 :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Bleomycine	30.0 mg	Intraveineuse	dans 100 cc SS en bolus
6	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ m2	Intraveineuse	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ m2	Intraveineuse	dans 100 cc SS en 30 min puis rinçage

7	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ m2	Intraveineuse	dans 100 cc SS en 30 min puis rinçage
7	Rinçage	Chlorure de sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J4					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Chimiothérapie	CISPLATINE	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 100 cc SS en 30 min puis rinçage
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h

2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ m2	Intraveineuse	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J8					
1	Chimiothérapie	Bleomycine	30.0 mg	Intraveineuse	dans 100 cc SS en bolus
J15					
1	Chimiothérapie	Bleomycine	30.0 mg	Intraveineuse	dans 100 cc SS en bolus

Homesley HD, Bundy BN, Hurteau JA, Roth LM. Bleomycin, etoposide, and cisplatin combination therapy of ovarian granulosa cell tumors and other stromal malignancies: A Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol. 1999 Feb;72(2):131-7. doi: 10.1006/gyno.1998.5304. PMID: 10021290

ETOPOSIDE – CARBOPLATINE J1=J21 :

Ordre	Type	Produit/Protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 1000 cc SS en 1 H puis rinçage

4	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC5	Intraveineuse	AUC 5 Dans 250 cc SG en 30 min puis rinçage
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 1000 cc SS en 1 H puis rinçage
J3					
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 1000 cc SS en 1 H puis rinçage

Eiermann, W., Achterrath, W., Lenaz, L. et al. Carboplatin/etoposide as first-line chemotherapy in advanced ovarian carcinoma: a pilot study. Cancer Chemother. Pharmacol. 27, 389–393 (1991). https://doi.org/10.1007/BF00688863

ETOPOSIDE-CISPLATINE J1=J21 :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000ml	Intraveineuse	0.9% 500 ml sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	25mg/ m2	Intraveineuse	Dans 1000 cc SS + 2gKCl en 1H puis rinçage

5	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 1000 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000ml	Intraveineuse	0.9% 500 ml sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	25mg/ m2	Intraveineuse	Dans 1000 cc SS + 2gKCl en 1H puis rinçage
5	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 1000 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000ml	Intraveineuse	0.9% 500 ml sur 6H
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	25mg/ m2	Intraveineuse	Dans 1000 cc SS + 2gKCl en 1H puis rinçage
5	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 1000 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h

An intensive regimen of cisplatin and etoposide appears to be 'highly effective' in treating patients with ovarian cancer who relapse after platinum-based combination therapy, according to a new study (Br J Cancer 2002; 86: 19–25).

ETOPOSIDE – IFOSFAMIDE – CISPLATINE (VIP) J1=J21 :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	75.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Pré-médication	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
8	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/M2	Intravei-neuse	dans 250 cc SS en 1h
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J2					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	75.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Chimiothérapie	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8

8	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 60 min
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J3					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	75.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Chimiothérapie	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
8	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 60 min
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J4					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	75.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Chimiothérapie	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8

8	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 60 min
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J5					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	75.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Pré-médication	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
8	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 1h
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
10	Soins de support	Filgrastim	30.0 UNITE	Sous-cutanée	1 injection par jour de J5 à J9

Lund B, Hansen OP, Hansen HH, Hansen M. Combination therapy with carboplatin/cisplatin/ifosfamide/etoposide in ovarian cancer. Semin Oncol. 1992 Feb;19(1 Suppl 1):26-9. PMID: 1411618

CISPLATINE – ADRIAMYCINE – VÉPÉSIDE – CYCLOPHOSPHAMIDE (PAVEP) J1=J21 :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Vepezide	75.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Doxorubicine	40.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
7	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	300.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
8	Chimiothérapie	Cisplatine	80.0 mg/ M2	Intravei-neuse	dans 250 cc SS en 1h
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J2					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Vepezide	75.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	300.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h

J3					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Vepezide	75.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	300.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
8	Soins de support	Filgrastim	30.0 UNITE	Sous-cutanée	Neupogen ou Gran: 1 injection ss-cutanée par jour de j5 à j10

Blanc-Durand F, Lefeuvre-Plesse C, Ray-Coquard I, Chaltiel D, Floquet A, Meriaux É, Berton D, Bello-Roufai D, Guillemet C, Dupre PF, Faller É, Alexandre J, Hardy-Bressard AC, Collard O, Fabbro M, Provansal M, Kalbacher E, Genestie C, Pautier P. Dose-intensive regimen treatment for small-cell carcinoma of the ovary of hypercalcemic type (SCCOHT). Gynecol Oncol. 2020 Oct;159(1):129-135. doi: 10.1016/j.ygyno.2020.07.019. Epub 2020 Jul 25. PMID: 32723678.

VINBLASTINE – IFOSFAMIDE – CISPLATINE VeIP J1 à J5, J1=J21 :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L en 6 heures
2	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie

5	Chimiothérapie	Vinblastine	0.11 mg/ KG	Intraveineuse	Dans 100 cc SS en 10 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Pré-médication	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
8	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 1 heure
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L en 3 heures
J2					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimothérapie
5	Chimiothérapie	Vinblastine	0.11 mg/ KG	Intraveineuse	dans 100 cc SS en 10 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Chimiothérapie	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
8	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 60 min
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J3					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimothérapie

5	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
6	Chimiothérapie	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
7	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 60 min
8	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J4					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimothérapie
5	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
6	Chimiothérapie	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
7	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 60 min
8	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J5					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
6	Pré-médication	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8

7	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 30 min
8	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
9	Soins de support	Filgrastim	30.0 UNITE	Sous-cutanée	Neupogen ou Gran: 1 injection ss-cutanée par jour de j5 à j10

Gil-Martin M, Pardo B, Barretina-Ginesta MP. Rare ovarian tumours. Other treatments for ovarian cancer. EJC Suppl. 2020 Aug 22;15:96-103. doi: 10.1016/j.ejcsup.2019.11.002. PMID: 33240448; PMCID: PMC7573466.

VINCRISTINE DACTINOMYCINE CYCLOPHOSPHAMIDE (VAC) J1=J21 :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L en 60 min
2	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL
6	Chimiothérapie	Vincristine	1.4 mg/M2	Intraveineuse	Dans 100 cc SS 0.9% en 10 min puis rinçage sans dépasser 2mg en dose totale
7	Chimiothérapie	Dactinomycine	1.25 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 10 cc SS 0.9% en 10 min (après avoir atteint la dose cumulée de doxorubicine)
8	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS 0.9% puis rinçage

9	Pré-médication	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0.9% en 10 min puis rinçage
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L en 60 min

Slayton RE, Park RC, Silverberg SG, Shingleton H, Creasman WT, Blessing JA. Vincristine, dactinomycin, and cyclophosphamide in the treatment of malignant germ cell tumors of the ovary. A Gynecologic Oncology Group Study (a final report). Cancer. 1985 Jul 15;56(2):243-8. doi: 10.1002/1097-0142(19850715)56:2<243::aid-cncr2820560206>3.0.co;2-t. PMID: 2988740

Docetaxel-Carboplatine J1=J21 :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	5.0 mg	Orale	1cp 1 heure avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Docetaxel	75mg/ m2	Intraveineuse	Dans 500ml de SG5% en 1h
5	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5.0	Intraveineuse	AUC 5 dans 250 cc SG en 60 min

Markman M, Kennedy A, Webster K, Peterson G, Kulp B, Belinson J. Combination chemotherapy with carboplatin and docetaxel in the treatment of cancers of the ovary and fallopian tube and primary carcinoma of the peritoneum. J Clin Oncol. 2001 Apr 1;19(7):1901-5. doi: 10.1200/JCO.2001.19.7.1901. PMID: 11283121.

GEMCITABINE – OXALIPLATINE J1=J15 :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	0.9% 250 cc en 30 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000.0 mg/M2	Intraveineuse	ds 250 cc SS ou SG en 30 min puis rinçage j1 j15
5	Chimiothérapie	Oxaliplatine	100.0 mg/ M2	Intraveineuse	ds 250 cc SG en 2H puis rinçage j1 j15
6	Rinçage	Chlorure De Sodium	100.0 ml	Intraveineuse	0.9% 100 ml en 10 min

Vici P, Sergi D, Pizzuti L, Mariani L, Arena MG, Barba M, Maugeri-Saccà M, Vincenzoni C, Vizza E, Corrado G, Paoletti G, Tomao F, Tomao S, Giannarelli D, Di Lauro L. Gemcitabine-oxaliplatin (GEMOX) as salvage treatment in pretreated epithelial ovarian cancer patients. J Exp Clin Cancer Res. 2013 Aug 8;32(1):49. doi: 10.1186/1756-9966-32-49. PMID: 23927758; PMCID: PMC3750635.

CARBOPLATINE - ETOPOSIDE – IFOSFAMIDE ICE J1 À J3, J1=J21:

Ordre	Type	Produit/Protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L en 6h
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	50.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Pré-médication	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
8	Chimiothérapie	Carboplatine	35mg/m2	Intraveineuse	dans 250 cc SG en 60 min
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J2					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L sur 6h
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie

4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	50.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Chimiothérapie	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
8	Chimiothérapie	Carboplatine	35mg/m2	Intraveineuse	dans 250 cc SG en 60 min
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J3					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L sur 6h
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	50.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Chimiothérapie	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
8	Chimiothérapie	Carboplatine	35mg/m2	Intraveineuse	dans 250 cc SG en 60 min
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h

Fanning J, Hilgers RD, Hutson E. Carboplatin, etoposide, and ifosfamide as second-line treatment for ovarian cancer. Am J Clin Oncol. 1994 Aug;17(4):335-7. doi: 10.1097/00000421-199408000-00011. PMID: 8048396.

PEMBROLIZUMAB J1=J21 :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	200.0 mg	Intraveineuse	Dans 250 cc SS 0,9 %

David M. O'Malley et al.Pembrolizumab in Patients With Microsatellite Instability–High Advanced Endometrial Cancer: Results From the KEYNOTE-158 Study. JCO 40, 752-761(2022). DOI:10.1200/JCO.21.01874

V- SÉREUX DE BAS GRADE/ ENDOMÉTRIOIDE GRADE 1 :

Tamoxifene en continu :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Hormonothérapie	Tamoxifene	20.0 mg	orale	1cp/j en continu

Williams C, Simera I, Bryant A. Tamoxifen for relapse of ovarian cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Mar 17;2010(3):CD001034. doi: 10.1002/14651858.CD001034.pub2. PMID: 20238312; PMCID: PMC4235755.

Anastrozole en continu :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Hormonothérapie	Anastrozole	1.0 mg	orale	1cp/j en continu

Tang M, O'Connell RL, Amant F, Beale P, McNally O, Sjoquist KM, Grant P, Davis A, Sykes P, Mileshkin L, Moujaber T, Kennedy CJ, deFazio A, Tan K, Antill Y, Goh J, Bonaventura T, Scurry J, Friedlander M. PARAGON: A Phase II study of anastrozole in patients with estrogen receptor-positive recurrent/metastatic low-grade ovarian cancers and serous borderline ovarian tumors. Gynecol Oncol. 2019

Létrozole en continu :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Hormonothérapie	Létrozole	20.0 mg	orale	1cp/j en continu

Papadimitriou CA, Markaki S, Siapkaras J, Vlachos G, Efstathiou E, Grimani I, Hamilos G, Zorzou M, Dimopoulos MA. Hormonal therapy with letrozole for relapsed epithelial ovarian cancer. Long-term results of a phase II study. Oncology. 2004;66(2):112-7. doi: 10.1159/000077436. PMID: 15138362

Exemestane en continu :

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
1	Hormonothérapie	Exemestane	25.0 mg	orale	1cp/j en continu

S. Verma et al.Phase II study of exemestane (E) in refractory ovarian cancer (ROC). JCO 24, 5026-5026(2006). DOI:10.1200/jco.2006.24.18_suppl.5026

Fulvestrant J1=J28

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Fulvestrant	IM	500 mg	J1, J14, J28 la 1ère séance puis tous les 28 jours dans chaque fesse en intramusculaire profonde

Argenta PA, Thomas SG, Judson PL, Downs LS Jr, Geller MA, Carson LF, Jonson AL, Ghebre R. A phase II study of fulvestrant in the treatment of multiply-recurrent epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2009 May;113(2):205-9. doi :

10.1016/j.ygyno.2009.01.012. Epub 2009 Feb 23. PMID: 19239974.