C- LE CANCER DU COL UTÉRIN

1- Stade Localisé :

CISPLATINE J1=J8 RCC [1-3]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
5	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	40.0 mg/ m2	500 ml SS 9%
6	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)

[1] Morris M, Eifel PJ, Lu J, Grigsby PW, Levenback C, Stevens RE, et al. Pelvic radiation with concurrent chemotherapy compared with pelvic and para-aortic radiation for high-risk cervical cancer. N Engl J Med 1999; 340:1137–1143

[2] Rose PG, Bundy BN, Watkins EB, Thigpen JT, Deppe G, Maiman MA, et al. Concurrent cisplatin-based radiotherapy and chemotherapy for locally advanced cervical cancer. N Engl J Med 1999; 340:1144–1153.

[3] Peters WA, Liu PY, Barrett RJ, Stock RJ, Monk BJ, Berek JS, et al. Concurrent chemotherapy and pelvic radiation therapy compared with pelvic radiation therapy alone as adjuvant therapy after radical surgery in high-risk early-stage cancer of the cervix. J Clin Oncol 2000; 18:1606–1613.

2- Stade Métastatique :

Cisplatine en monothérapie J1=J21 [4,5]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie

3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
5	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	50.0 mg/ M2	500 ml SS 9%
6	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)

[4] Bonomi P, Blessing JA, Stehman FB, DiSaia PJ, Walton L, Major FJ. Randomized trial of three cisplatin dose schedules in squamous-cell carcinoma of the cervix: a Gynecologic Oncology Group study. J Clin Oncol 1985; 3:1079–1085.

[5] Long HJ, Bundy BN, Grendys EC, Benda JA, McMeekin DS, Sorosky J, et al. Randomized Phase III Trial of Cisplatin With or Without Topotecan in Carcinoma of the Uterine Cervix: A Gynecologic Oncology Group Study. JCO 2005; 23:4626–4633.

Paclitaxel-Cisplatine J1=J21 [6]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/ M2	250 ml SG 5% ou SS 0.9% puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	50.0 mg/M2	500 ml SS 9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)

[6]- Kitagawa R, Katsumata N, Shibata T, Kamura T, Kasamatsu T, Nakanishi T, et al. Paclitaxel Plus Carboplatin Versus Paclitaxel Plus Cisplatin in Metastatic or Recurrent Cervical Cancer: The Open-Label Randomized Phase III Trial JCOG0505. J Clin Oncol 2015; 33:2129–2135.

Paclitaxel-Carboplatine J1=J21 [6]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Clartec 1cp 4h avant Paclitaxel
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Omeprazole 20mg 1 cp le jour de la chimio
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	500 ml SG 5% ou SS 0.9%
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage

[6] Kitagawa R, Katsumata N, Shibata T, Kamura T, Kasamatsu T, Nakanishi T, et al. Paclitaxel Plus Carboplatin Versus Paclitaxel Plus Cisplatin in Metastatic or Recurrent Cervical Cancer: The Open-Label Randomized Phase III Trial JCOG0505. J Clin Oncol 2015; 33:2129–2135.

Cisplatine-Topotecan J1 à J3 J1=J21 [8]

Ordre	Type prescription	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Topotecan	Intraveineuse	0.75 mg/M2	100 ml SS 9%, durée de 30min

6	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	50.0 mg/M2	500 ml SS 9%
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
Ordre	**Type prescription**	**Produit / Prescription**	**Voie**	**Dosage**	**Observation**
J2					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	Comprimé de 80 mg
2	Pré-m9édication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Topotecan	Intraveineuse	0.75 mg/M2	100 ml SS 9%
Ordre	Type prescription	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J3					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	Comprimé de 80 mg
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Veineuse	120.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Veineuse	8.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Veineuse	10.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Topotecan	Veineuse	0.75 mg/M2	100 ml SS 9%

[8] Long HJ, Bundy BN, Grendys EC, Benda JA, McMeekin DS, Sorosky J, et al. Randomized Phase III Trial of Cisplatin With or Without Topotecan in Carcinoma of the Uterine Cervix: A Gynecologic Oncology Group Study. JCO 2005; 23:4626–4633.

Paclitaxel-Carboplatine-Bevacizumab J1=J21 [7]

Type prescription	Ordre	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
Pré-médication	1	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Omeprazole 20mg 1 cp le jour de la chimio
Pré-médication	1	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Clartec 1cp 4h avant Paclitaxel
Pré-médication	2	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
Pré-médication	3	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
Thérapie ciblée	4	Bevacizumab	Intraveineuse	7.5 mg/KG	100 ml SG 5% TA et BU avant Bevacizumab, TA après Bevacizumab
Chimiothérapie	5	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/ M2	500 ml SG 5% ou SS 0.9%
Chimiothérapie	6	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage

[7] Tewari KS, Sill MW, Long HJ, Penson RT, Huang H, Ramondetta LM, et al. Improved survival with bevacizumab in advanced cervical cancer. N Engl J Med 2014; 370:734–743

Paclitaxel-Cisplatine-Bevacizumab J1=J21 [7]

Ordre	Type prescription	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+4g Nacl et 2g Kcl)
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Thérapie ciblée	Bevacizumab	Intraveineuse	7.5 mg/ KG	100 ml SG 5% TA et BU avant Bevacizumab, TA après Bevacizumab
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	500 ml SG 5% ou SS 0.9%
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	50.0 mg/ M2	500 ml SS 9%
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+4g Nacl et 2g Kcl)

[7] Tewari KS, Sill MW, Long HJ, Penson RT, Huang H, Ramondetta LM, et al. Improved survival with bevacizumab in advanced cervical cancer. N Engl J Med 2014; 370:734–743.

Paclitaxel-Carboplatine-Bevacizumab-Pembrolizumab J1=J21 [9-10]

Ordre	Type prescription	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Omeprazole 20mg 1 cp le jour de la chimio
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Clartec 1cp 4h avant Paclitaxel
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Thérapie ciblée	Bevacizumab	Intraveineuse	15 mg/ KG	100 ml SG 5% TA et BU avant Bevacizumab, TA après Bevacizumab
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	500 ml SG 5% ou SS 0.9%
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage
7	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200mg	toutes les 3 semaines en perfusion intraveineuse pendant 30 minutes

Paclitaxel-Cisplatine-Bevacizumab-Pembrolizumab J1=J21 [9-10]

Ordre	Type prescription	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Omeprazole 20mg 1 cp le jour de la chimio
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Clartec 1cp 4h avant Paclitaxel
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Thérapie ciblée	Bevacizumab	Intraveineuse	15 mg/ KG	100 ml SG 5% TA et BU avant Bevacizumab, TA après Bevacizumab
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	500 ml SG 5% ou SS 0.9%
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	50.0 mg/M2	500 ml SS 9%
7	Immunothérapie	Pembrolizumab	intraveineuse	200mg	toutes les 3 semaines en perfusion intraveineuse pendant 30 minutes

[9] Tewari KS, Colombo N, Monk BJ, Dubot C, Cáceres MV, Hasegawa K, et al. Pembrolizumab + chemotherapy in patients with persistent, recurrent, or metastatic cervical cancer: Subgroup analysis of KEYNOTE-826. JCO 2022;40:5506–5506. https://doi.org/10.1200/JCO.2022.40.16_suppl.5506.

[10] Colombo Nicoletta, Dubot Coraline, Lorusso Domenica, Caceres M. Valeria, Hasegawa Kosei, Shapira-Frommer Ronnie, et al. Pembrolizumab for Persistent, Recurrent, or Metastatic Cervical Cancer. New England Journal of Medicine 2021;385:1856–67. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2112435.