D- LES CANCERS DE L'ENDOMÈTRE

1-Stade Localisé :

CISPLATINE J1=J8 RCC [1]

Ordre	Type prescription	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
5	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	40.0 mg/ m2	500 ml SS 9%
6	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)

[1] Colombo N, Creutzberg C, Amant F, Bosse T, González-Martín A, Ledermann J, et al. ESMO-ESGO-ESTRO Consensus Conference on Endometrial Cancer: diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 2016; 27:16–41.

Paclitaxel - Carboplatine J1=J21 [2]

Ordre	Type prescription	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Omeprazole 20mg 1 cp le jour de la chimio
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Clartec 1cp 4h avant Paclitaxel
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/ m2	500 ml SG 5% ou SS 0.9%
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage

[2] Sovak MA, Dupont J, Hensley ML, Ishill N, Gerst S, Abu-Rustum N, et al. Paclitaxel and carboplatin in the treatment of advanced or recurrent endometrial cancer: a large retrospective study. Int J Gynecol Cancer 2007; 17:197–203.

2- Stade Métastatique :

Paclitaxel - Carboplatine J1=J21 [3]

Ordre	Type prescription	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Omeprazole 20mg 1 cp le jour de la chimio
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Clartec 1cp 4h avant Paclitaxel
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/ m2	500 ml SG 5% ou SS 0.9%
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	AUC 5 100 ml SG 5% puis rinçage

[3] Sovak MA, Dupont J, Hensley ML, Ishill N, Gerst S, Abu-Rustum N, et al. Paclitaxel and carboplatin in the treatment of advanced or recurrent endometrial cancer: a large retrospective study. Int J Gynecol Cancer 2007; 17:197–203..

Cisplatine-Doxorubicine J1=J21 [4][5]

Ordre	Type prescription	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	Per Os
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	60.0 mg/ M2	100 ml SS 9%
6	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	50.0 mg/ M2	500 ml SS 9%
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)

[4] Thigpen JT, Brady MF, Homesley HD, Malfetano J, DuBeshter B, Burger RA, et al. Phase III trial of doxorubicin with or without cisplatin in advanced endometrial carcinoma: a gynecologic oncology group study. J Clin Oncol 2004; 22:3902–3908.

[5] van Wijk FH, Aapro MS, Bolis G, Chevallier B, van der Burg MEL, Poveda A, et al. Doxorubicin versus doxorubicin and cisplatin in endometrial carcinoma: definitive results of a randomised study (55872) by the EORTC Gynaecological Cancer Group. Ann Oncol 2003; 14:441–448.

Paclitaxel hebdomadaire J1, J8, J15, J1 = J28 [8]

Ordre	Type prescription	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Prémédication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1 cp 4h avant traitement
2	Prémédication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	20mg 1 cp le jour de la chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ m2	Dans 500 cc SS 0.9% en 60 min puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit / Prescription**	**Voie**	**Dosage**	**Observation**
J8					
1	Prémédication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1 cp 4h avant traitement
2	Prémédication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	20mg 1 cp le jour de la chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ m2	Dans 500 cc SS 0.9% en 60 min puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit / Prescription**	**Voie**	**Dosage**	**Observation**
J15					
1	Prémédication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1 cp 4h avant traitement
2	Prémédication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	20mg 1 cp le jour de la chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ m2	Dans 500 cc SS 0.9% en 60 min puis rinçage

[8] Alexandre J, Le Frère-Belda M-A, Angelergues A, Ferron G, Treilleux I, Gaillard A-L, et al. Recommandations pour la pratique clinique Nice/Saint-Paul-de-Vence 2022–2023 : Prise en charge du cancer de l'endomètre métastatique et/ou en rechute. Bulletin Du Cancer 2023;110:6S34–43. https://doi.org/10.1016/S0007-4551(23)00332-6.

Lenvatinib - Pembrolizumab [9-10]

Ordre	Type	Prescription	Voie	Dosage	Observation
1	Thérapie ciblée	Lenvatinib	Orale	10 mg	20 mg par voie orale une fois par jour (deux gélules de 10 mg)
2	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200 mg	toutes les 3 semaines en perfusion IV pendant 30 minutes, jusqu'à la intolérance ou progression

[9] Lenvatinib - LENVIMA® - fiches anticancéreux oraux - OMEDIT PdL. OMEDIT n.d. https://www.omedit-paysdelaloire.fr/documentation/lenvatinib-lenvima-fiche-medicaments-anticancereux-oraux-cancer/ (accessed April 3, 2024).

[10] KEYTRUDA (pembrolizumab) - Cancer de l'endomètre. Haute Autorité de Santé n.d. https://has-sante.fr/jcms/p_3325579/fr/keytruda-pembrolizumab-cancer-de-l-endometre (accessed April 3, 2024).

Acétate de mégestrol [6]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
1	Hormonothérapie	Acétate de mégestrol	orale	160 mg	1 cp par jour en continu

Tamoxifène [6]

Ordre	Type	Prescription	Voie	Dosage	Observation
1	Hormonothérapie	Tamoxifène	orale	20 mg	1 cp par jour en continu

[6] Camille B. Prise en charge du cancer de l'endomètre métastatique et/ou en récidive n.d.

Letrozole [7]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
1	Hormonothérapie	Letrozole	Orale	2,5 mg	1 cp par jour en continu

[7] Azaïs H, Lecointre L, Canlorbe G. Quelles nouveautés pour la prise en charge du cancer de l'endomètre ? Le point sur les recommandations européennes de 2021. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie 2021

Cas particuliers : les Sarcomes utérins

Doxorubicine J1 = J21 [11]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	60 mg/m2	Dans 100 cc SS en 15 min

[11] Alexandre J, Le Frère-Belda M-A, Angelergues A, Ferron G, Treilleux I, Gaillard A-L, et al. Recommandations pour la pratique clinique Nice/Saint-Paul-de-Vence 2022–2023 : Prise en charge du cancer de l'endomètre métastatique et/ou en rechute. Bulletin Du Cancer 2023;110:6S34–43. https://doi.org/10.1016/S0007-4551(23)00332-6.

Paclitaxel J1 = J21 [12]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
1	Prémédication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1 cp 4h avant traitement
2	Prémédication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	20mg 1 cp le jour de la chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	170 mg/ m2	Dans 500 cc SS 0.9% en 60 min puis rinçage

[12] Wolfson A, Brady M, Rocereto T, Mannel R, Lee Y, Futoran R, et al. A gynecologic oncology group randomized phase III trial of whole abdominal irradiation (WAI) vs. cisplatin-ifosfamide and mesna (CIM) as post-surgical therapy in stage I–IV carcinosarcoma (CS) of the uterus. Gynecologic Oncology 2007;107:177–85. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2007.07.070.

Cisplatine J1=J21 [13]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
5	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	60.0 mg/m2	500 ml SS 9%
6	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)

[13] Alexandre J, Le Frere-Belda MA, Prulhiere K, Treilleux I, Leary A, Pomel C, et al. Prise en charge du cancer de l'endomètre métastatique et/ou en rechute. Recommandations 2020 pour la pratique clinique (Colloque de Nice-Saint Paul de Vence). Bulletin Du Cancer 2020;107:1006–18. https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2020.06.006.

GEMCITABINE J1,J8 + DOCETAXEL J1=J21 [14]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10 mg	IVL
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	900 mg/m2	dans 250 cc SS 9% ou SG 5% en 30 min puis rinçage

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J8					
1	Prémédication	Anti Histaminiques H1	Orale	10 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	900 mg/ m2	dans 250 cc SS 9% ou SG 5% en 30 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	75 mg/ m2	Dans 250 cc SS 0.9% SG 5% en 60 min puis rinçage
7	Soins de support	Filgrastim	Sous-cutanée	30 UI	Neupogen ou Gran: 1 injection sous cutanée par jour de J10 à J15

[14] Hensley ML. Update on gemcitabine and docetaxel combination therapy for primary and metastatic sarcomas. CurrOpinOncol 2010; 22:356–361

IFOSFAMIDE J1 à J5 J1=J21 [15]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Prescription**	**Voie**	**Dosage**	**Observation**
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Soins de support	Filgrastim	Sous-cutanée	30.0 UNITE	Neupogen ou Gran: 1 injection ss-cutanée par jour de J20 à J26
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

[15] Sutton GP, Blessing JA, et al. A phase II study of ifosfamide and mesna in refractory adeno carcinoma of the endometrium. A gynecolo gic oncology group study. Cancer 1994;73 (5):1453–5.

Cisplatine Ifosfamide J1 à J5 J1= J28 [16]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	50.0 mg/ M2	dans 100 cc SS 0,9% ou SG 5% en 15 min puis rinçage
6	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
8	Post-hydrata-tion	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Prescription**	**Voie**	**Dosage**	**Observation**
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydrata-tion	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Prescription**	**Voie**	**Dosage**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydrata-tion	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
Ordre	**Type**	**Produit / Prescription**	**Voie**	**Dosage**	**Observation**
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL

5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
8	Soins de support	Filgrastim	Sous-cutanée	30.0 UNITE	Neupogen ou Gran: 1 injection ss-cutanée par jour de J20 à J26

[16] Pautier, P., Genestie, C., Fizazi, K., Morice, P., Mottet, C., Haie-Meder, C., Le Cesne, A., and Lhommé, C. (2002b). Cisplatin-based chemotherapy regimen (DECAV) for uterine sarcomas. Int. J. Gynecol. Cancer 12, 749–754.

Paclitaxel Ifosfamide J1 à J5 J1=J28 [17-18]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	135 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% ou SG 5% en 15 min puis rinçage

6	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
8	Post-hydrata-tion	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Prescription**	**Voie**	**Dosage**	**Observation**
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydrata-tion	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Prescription**	**Voie**	**Dosage**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL

5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydrata-tion	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Prescription**	**Voie**	**Dosage**	**Observation**
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
Ordre	**Type**	**Produit / Prescription**	**Voie**	**Dosage**	**Observation**
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL

5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Soins de support	Filgrastim	Sous-cutanée	30.0 UNITE	Neupogen ou Gran: 1 injection ss-cutanée par jour de J20 à J26
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

[17] Homesley HD, Filiaci V, Markman M, Bitterman P, Eaton L, Kilgore LC, et al. Phase III Trial of Ifosfamide With or Without Paclitaxel in Advanced Uterine Carcinosarcoma: A Gynecologic Oncology Group Study. JCO 2007;25:526–31. https://doi.org/10.1200/JCO.2006.06.4907

[18] Powell MA, Filiaci VL, Hensley ML, et al. A randomized phase 3 trial of paclitaxel (P) plus carboplatin (C) versus paclitaxel plus ifosfa mide (I) in chemotherapy-naive patients with stage I–IV, persistent or recurrent carcinosarcoma of the uterus or ovary: an NRG oncology trial. J Clin Oncol 2019;37 [abstr 5500].

DOXORUBUCINE, IFOSFAMIDE J1 à J3 J1=J21 [19]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Voie	Dosage	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	3000.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage

6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	3000.0 mg/M2	dans 1000cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	60.0 mg/ M2	dans 100 cc SS ou SG en 15min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Prescription**	**Voie**	**Dosage**	**Observation**
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Mesna	Intraveineuse	3000.0 mg/M2	Dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	3000.0 mg/M2	Dans 1000 cc SS 0,9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Prescription**	**Voie**	**Dosage**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Orale	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Mesna	Intraveineuse	3000.0 mg/M2	Dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	3000.0 mg/M2	Dans 1000 cc SS 0,9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[19] Verma S, Younus J, Stys-Norman D, Haynes AE, Blackstein M, Members of the SarcomaDisease Site Group of Cancer Care Ontario's Program in Evidence-Based Care. Meta-analysis of ifosfamide-based combination chemotherapy in advanced soft tissue sarcoma. Cancer TreatRev 2008; 34:339–347.