E- LE CANCER DU VAGIN

1-Maladie Localisée :

CISPLATINE J1=J8 RCC:

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	orale	45min avant cisplatine
4	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
5	Chimiothérapie	Cisplatin	40 mg/ m^2	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
6	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1000 ml SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)

1. Rose, P.G. et al. Concurrent cisplatin-based radiotherapy and chemotherapy for locally advanced cervical cancer. NZJM 1999; 340: 1144-1153.

5FU + CISPLATINE J1=J28 RCC:

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie

3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	orale	45min avant cisplatine
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	4000.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans SS 0,9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours (j1j2j3j4j5)
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	100 mg/ m²	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

RTOG 9001: Morris M, Eifel PJ, Lu J, Grigsby PW, Levenback C, Stevens RE, Rotman M, Gershenson DM, Mutch DG. Pelvic radiation with concurrent chemotherapy compared with pelvic and para-aortic radiation for high-risk cervical cancer. N Engl J Med. 1999 Apr 15;340(15):1137-43. link to original article dosing details in manuscript have been reviewed by our editors

CAPECITABINE + CISPLATINE J1=J28 RCC:

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Chimiothérapie	Capecitabine	1650.0 mg/M2	Orale	2x/j matin et soir 30 min après le repas, 5 jours sur 7, pendant toute la durée de la radiothérapie
2	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	100 mg/m²	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Whitney CW, Sause W, Bundy BN, Malfetano JH, Hannigan EV, Fowler WC, Jr, Clarke-Pearson DL, Liao SY. A randomized comparison of fluorouracil plus cisplatin versus hydroxyurea as an adjunct to radiation therapy in stages IIB-IVA carcinoma of the cervix with negative para-aortic lymph nodes. A Gynecologic Oncology Group and Southwest Oncology Group Study. J Clin Oncol. 1999;17:1339–1348.

2 - Maladie avancée ou métastatique:

CISPLATIN + PACLITAXEL J1=J21:

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	orale	45min avant cisplatine
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	175 mg/ m²	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 180 minutes.
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	50 mg/ m²	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[6] : Rose, P. G., Blessing, J. A., Gershenson, D. M., & McGehee, R. (1999). Paclitaxel and cisplatin as first-line therapy in recurrent or advanced squamous cell carcinoma of the cervix: A Gynecologic Oncology Group study. Journal of Clinical Oncology, 17(9), 2676–2680. https://doi.org/10.1200/JCO.1999.17.9.2676

CARBOPLATINE + PACLITAXEL J1=J21

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Paclitaxel	175 mg/ m²	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 180 minutes.
4	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de glucose 5% sur 60 minutes
5	Post-hydratation (Rinçage)	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0,9%

[7] : Tinker, A. V., Bhagat, K., Swenerton, K. D., & Hoskins, P. J. (2005). Carboplatin and paclitaxel for advanced and recurrent cervical carcinoma: The British Columbia Cancer Agency experience. Gynecologic Oncology, 98(1), 54–58. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2005.03.037

Cisplatin + topotecan J1=J21 : [11]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	orale	45min avant cisplatine
4	Chimiothérapie	Cisplatin	50 mg/m²	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Chimiothérapie	Topotecan	0.75 mg/j	Intraveineuse	PerfuPerfusion intraveineuse dans 100 ml de chlorure de sodium chlorure de sodium 0,9 % en 30 minutes J1, J2 et J3
6	Post-hydratation (Rinçage)	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0,9%

[11] : Long HJ III, Bundy BN, Grendys EC Jr, et al. Randomized phase III trial of cisplatin with or without topotecan in carcinoma of the uterine cervix: a Gynecologic Oncology Group Study. J Clin Oncol 2005;23:4626-4633.

CISPLATINE J1=J21 : [12]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	orale	45min avant cisplatine
4	Chimiothérapie	Cisplatin	50 mg/m²	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
6	Post-hydratation (Rinçage)	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0,9%

[12] :Moore DH, Blessing JA, McQuellon RP, et al. Phase III study of cisplatin with or without paclitaxel in stage IVB, recurrent, or persistent squamous cell carcinoma of the 9 cervix: a gynecologic oncology group study. J Clin Oncol 2004;22:3113-3119.

CARBOPLATINE J1=J28 : [13]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Carboplatine	400 mg/m2	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de glucose 5% sur 60 minutes
6	Post-hydratation (Rinçage)	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0,9%

[13] : Weiss GR, Green S, Hannigan EV, et al. A phase II trial of carboplatin for recurrent or metastatic squamous carcinoma of the uterine cervix: a Southwest Oncology Group study. Gynecol Oncol 1990;39:332-336.

PACLITAXEL J1, J8, J15 J1=J28 : [16]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Paclitaxel	80 mg/ m^2	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 250 ml de chlorure de sodium 0,9 % pendant 60 minutes
4	Post-hydratation (Rinçage)	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0,9%

[16] : Machida, H., Moeini, A., Ciccone, M. A., Mostofizadeh, S., Takiuchi, T., Brunette, L. L., Roman, L. D., & Matsuo, K. (2018). Efficacy of modified dose-dense paclitaxel in recurrent cervical cancer. American Journal of Clinical Oncology, 41(9), 851–860. https://doi.org/10.1097/COC.0000000000000394

CISPLATINE+ PACLITAXEL+ BEVACIZUMAB J1=J21: [18]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie

3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	orale	45min avant cisplatine
5	Thérapie ciblée	Bevacizumab	15 mg/ m2	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 100 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 90 minutes.
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	175 mg/m²	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 180 minutes.
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	50 mg/ m²	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[18] : Tewari, K. S., Sill, M. W., Long, H. J., Penson, R. T., Huang, H., Ramondetta, L. M., Landrum, L. M., Oaknin, A., Reid, T. J., Leitao, M. M., Michael, H. E., & Monk, B. J. (2014). Improved survival with bevacizumab in advanced cervical cancer. The New England Journal of Medicine, 370(8), 734–743. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1309748

CARBOPLATINE + PACLITAXEL + BEVACIZUMAB J1=J21 [9]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Bevacizumab	15mg/ m2	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 100 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 90 minutes.
4	Chimiothérapie	Paclitaxel	175 mg/m²	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 180 minutes.
5	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de glucose 5% sur 60 minutes
6	Post-hydratation (Rinçage)	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0,9%

[9] : Tao, W., Yang, J., Jiang, Y., Chen, W., & Wang, Y. (2020). Paclitaxel, carboplatin, and bevacizumab in advanced cervical cancer: A treatment response and safety analysis. Medicine, 99(31), e21410. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000021410
PMCID: PMC7391439 | PMID: 32774193

Topotecan + paclitaxel + bevacizumab J1=J21 [8]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Bevacizumab	15mg/ m2	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 100 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 90 minutes.
4	Chimiothérapie	Paclitaxel	175 mg/ m²	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 180 minutes.
5	Chimiothérapie	Topotecan	0.75 mg/j	Intraveineuse	PerfuPerfusion intraveineuse dans 100 ml de chlorure de sodium chlorure de sodium 0,9 % en 30 minutes J1, J2 et J3
6	Post-hydratation (Rinçage)	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0,9%

[8] : Frumovitz M, Munsell MF, Burzawa JK, Byers LA, Ramalingam P, Brown J, Coleman RL.
Combination therapy with topotecan, paclitaxel, and bevacizumab improves progression-free survival in recurrent small cell neuroendocrine carcinoma of the cervix.

Gynecol Oncol. 2016 Nov 4;144(1):46–50. doi: 10.1016/j.ygyno.2016.10.040

PEMBROLIZUMAB + CISPLATINE+ PACLITAXEL+/- BEVACIZUMAB J1=J21: [4]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	orale	45min avant cisplatine
5	Immunothérapie	Pembrolizumab	200 mg	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 100 ml de chlorure de sodium 0,9 % pendant 30 minutes avec un filtre de 0,2 micron
6	Thérapie ciblée	Bevacizumab	15 mg/ m2	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 100 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 90 minutes.
7	Chimiothérapie	Paclitaxel	175 mg/ m²	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 180 minutes.

J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	50 mg/ m^2	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[4]: Colombo N, Dubot C, Lorusso D, et al. Pembrolizumab for persistent, recurrent, or metastatic cervical cancer. N Engl J Med 2021;385:1856-1867.

PEMBROLIZUMAB + CARBOPLATINE+ PACLITAXEL+/- BEVACIZUMAB J1=J21 [5]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Bevacizumab	15mg/ m2	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 100 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 90 minutes.

4	Immunothérapie	Pembrolizumab	200 mg	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 100 ml de chlorure de sodium 0,9 % pendant 30 minutes avec un filtre de 0,2 micron
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	175 mg/ m^2	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 180 minutes.
6	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de glucose 5% sur 60 minutes
7	Post-hydratation (Rinçage)	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0,9%

[5] : Colombo, N., Dubot, C., Lorusso, D., Caceres, M. V., Hasegawa, K., Shapira-Frommer, R., Tewari, K. S., et al.(2021). Pembrolizumab for persistent, recurrent, or metastatic cervical cancer. The New England Journal of Medicine, 385(20), 1856–1867. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2112435