A. CARCINOMES ÉPIDERMOÏDES DE LA SPHÈRE ORL

(Cavité buccale, oropharynx, hypopharynx, larynx glottique, larynx supraglottique)

I-TRAITEMENT DES FORMES LOCALISÉES

RCC avec Cisplatine 100 mg J1=J22 (Radio-chimiothérapie concomitante). [1,2]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisoloe	Intraveineuse	120.0mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mgM2	Dans 500 ml SS 0,9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 4h

[1] Al-Sarraf M, LeBlanc M, Giri PG, Fu KK, Cooper J, Vuong T, et al. Chemoradiotherapy versus radiotherapy in patients with advanced nasopharyngeal cancer: phase III randomized Intergroup study 0099. J Clin Oncol 1998; 16:1310–1317.

[2] Lin J-C, Jan J-S, Hsu C-Y, Liang W-M, Jiang R-S, Wang W-Y. Phase III study of concurrent chemoradiotherapy versus radiotherapy alone for advanced nasopharyngeal carcinoma: positive effect on overall and progression-free survival. J Clin Oncol 2003; 21:631–637.

RCC avec Cisplatine 40 mg J1=J8 [1,2]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h

2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chi-miothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	40.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0,9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 3h

[1] Al-Sarraf M, LeBlanc M, Giri PG, Fu KK, Cooper J, Vuong T, et al. Chemoradiotherapy versus radiotherapy in patients with advanced nasopharyngeal cancer: phase III randomized Intergroup study 0099. J Clin Oncol 1998; 16:1310–1317.

[2] Lin J-C, Jan J-S, Hsu C-Y, Liang W-M, Jiang R-S, Wang W-Y. Phase III study of concurrent chemoradiotherapy versus radiotherapy alone for advanced nasopharyngeal carcinoma: positive effect on overall and progression-free survival. J Clin Oncol 2003; 21:631–637.

RCC avec Carboplatine-5FU continue J1=J22. [4,5]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
4	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% puis rinçage
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/M2	SS 0.9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours

[4] Depondt J, Gehanno P, Martin M, Lelievre G, Guerrier B, Peytral C, et al. Neoadjuvant chemotherapy with carboplatin/5-fluorouracil in head and neck cancer. Oncology 1993; 50 Suppl 2:23–27.

[5] Hanemaaijer SH, Kok IC, Fehrmann RSN, van der Vegt B, Gietema JA, Plaat BEC, et al. Comparison of Carboplatin With 5-Fluorouracil vs. Cisplatin as Concomitant Chemoradiotherapy for Locally Advanced Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Front Oncol 2020; 10:761.

TPF = Docetaxel-Cisplatine-5FU J1=J22 (chimiothérapie d´induction). [11–14]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1500.0 ml	SS 0.9% 2L en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	75.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage (J1)
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/M2	Dans 500 ml SS en 1h (J1)
7	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% de J1 à J5 en perfusion continue
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4gNacl +2gKcl) sur 4h
9	Soins de support	Filgrastim	Sous-cutanée	30.0 UNITE	1 injection SC par jour de J5 à J10

[11] Haddad R, Colevas AD, Tishler R, Busse P, Goguen L, Sullivan C, et al. Docetaxel, cisplatin, and 5-fluorouracil-based induction chemotherapy in patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck: The Dana Farber Cancer Institute experience. Cancer 2003; 97:412–418.

[12] Li R, Ye L, Zhu Y, Ding H, Wang S, Ying H, et al. Induction chemotherapy of modified docetaxel, cisplatin, 5-fluorouracil for laryngeal preservation in locally advanced hypopharyngeal squamous cell carcinoma. Head Neck 2022; 44:2018–2029.

[13] Bae WK, Hwang JE, Shim HJ, Cho SH, Lee JK, Lim S-C, et al. Phase II study of docetaxel, cisplatin, and 5-FU induction chemotherapy followed by chemoradiotherapy in locoregionally advanced nasopharyngeal cancer. Cancer Chemother Pharmacol 2010; 65:589–595.

[14] Katori H, Tsukuda M, Mochimatu I, Ishitoya J, Kawai S, Mikami Y, et al. Phase I trial of concurrent chemoradiotherapy with docetaxel, cisplatin and 5-fluorouracil (TPF) in patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN). Br J Cancer 2004; 90:348–352.

Cisplatine-5FU continue J1=J22. [20]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl +2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml SS en 1h
7	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/M2	En perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L ou SG 5% 1L + 4gNacl +2gKcl en 3h

[20] Gibson MK, Li Y, Murphy B, Hussain MHA, DeConti RC, Ensley J, et al. Randomized phase III evaluation of cisplatin plus fluorouracil versus cisplatin plus paclitaxel in advanced head and neck cancer (E1395): an intergroup trial of the Eastern Cooperative Oncology Group. J Clin Oncol 2005; 23:3562–3567.

RCC avec Cetuximab J1=J8. [6–10]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1 C1 (Ou Si Arrêt > 2 Semaines) = Dose De Charge (J1c1 Une Semaine Avant Rth)	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 1h avant Cetuximab
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Cetuximab	Intraveineuse	400.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 2h (Vitesse Max de Perfusion = 10 mg/min)

Ordre	Type	Produit / Protocole À Partir De J8	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 1h avant Cetuximab
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Cetuximab	Intraveineuse	250.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h (Vitesse Max de Perfusion = 10 mg/min)

[6] Bonner JA, Harari PM, Giralt J, Azarnia N, Shin DM, Cohen RB, et al. Radiotherapy plus cetuximab for squamous-cell carcinoma of the head and neck. N Engl J Med 2006; 354:567–578.

[7] Bonner JA, Harari PM, Giralt J, Cohen RB, Jones CU, Sur RK, et al. Radiotherapy plus cetuximab for locoregionally advanced head and neck cancer: 5-year survival data from a phase 3 randomised trial, and relation between cetuximab-induced rash and survival. Lancet Oncol 2010; 11:21–28.

[8] Curran D, Giralt J, Harari PM, Ang KK, Cohen RB, Kies MS, et al. Quality of life in head and neck cancer patients after treatment with high-dose radiotherapy alone or in combination with cetuximab. J Clin Oncol 2007; 25:2191–2197.

[9] Dattatreya S, Goswami C. Cetuximab plus radiotherapy in patients with unresectable locally advanced squamous cell carcinoma of head and neck region--a open labelled single arm phase II study. Indian J Cancer 2011; 48:154–157.

[10] Okano S, Yoshino T, Fujii M, Onozawa Y, Kodaira T, Fujii H, et al. Phase II study of cetuximab plus concomitant boost radiotherapy in Japanese patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck. Jpn J Clin Oncol 2013; 43:476–482.

II. TRAITEMENT DES FORMES AVANCÉES (RÉCIDIVANTES OU MÉTASTATIQUES)

Methotrexate J1=J8. [21]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Chimiothérapie	Methotrexate	Intraveineuse	40.0 mg/M2	Dans 100 ml SS 0.9% ou SG 5% en 15 min

[21] Guardiola E, Peyrade F, Chaigneau L, Cupissol D, Tchiknavorian X, Bompas E, et al. Results of a randomised phase II study comparing docetaxel with methotrexate in patients with recurrent head and neck cancer. Eur J Cancer 2004; 40:2071–2076.

Cetuximab-Cisplatine-5FU continue J1=J22. [30]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1c1 (Ou Si Arrêt > 2 Semaines) = Dose De Charge	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% 2L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl +2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	IVL Clartec un Cp 4 h avant + Atarax un Cp 1 h avant Cetuximab
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
6	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h
8	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/M2	En perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours
9	Thérapie Ciblée	Cetuximab	Intraveineuse	400.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 2h
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% 1L en 3h ou SG 5% 2L +4gNacl +2gKcl en 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole Des J1 (> C1)	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% 2L en 6h ou SG 5% 2L +4g Nacl +2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1cp 4 heures avant cetuximab
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
6	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h
8	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/ M2	En perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours
9	Thérapie Ciblée	Cetuximab	Intraveineuse	250.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% 1L en 3h ou SG 5% 2L +4gNacl +2gKcl en 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole J8 Et J15	Voie	Dose	Observation
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1cp 4 heures avant cetuximab
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Thérapie Ciblée	Cetuximab	Intraveineuse	250.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h

[30] Cohen MH, Chen H, Shord S, Fuchs C, He K, Zhao H, et al. Approval summary: Cetuximab in combination with cis-platin or carboplatin and 5-fluorouracil for the first-line treatment of patients with recurrent locoregional or metastatic squamous cell head and neck cancer. Oncologist 2013; 18:460–466.

Cetuximab-Carboplatine-5FU continue J1=J22. [31]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1c1 (Ou Si Arrêt > 2 Semaines) = Dose De Charge	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 1 h avant Cetuximab
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 1h puis rinçage
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/M2	SS 0.9% en perfusion continue sur diffu-seur portable sur 5 jours

7	Thérapie Ciblée	Cetuximab	Intraveineuse	400.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 2h

Ordre	Type	Produit / Protocole Des J1 (> C1)	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 1 h avant Cetuximab
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 100 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/M2	SS 0.9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours
7	Thérapie Ciblée	Cetuximab	Intraveineuse	250.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h

Ordre	Type	Produit / Protocole J8 Et J15	Voie	Dose	Observation
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 1 h avant Cetuximab
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Thérapie Ciblée	Cetuximab	Intraveineuse	250.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h

[31] Burgy M, Barthélémy P, Lefevre F, Dupret-Bories A, Truntzer P, Korenbaum C, et al. Cetuximab-Carboplatin-5-Fluorouracil Regimen in Elderly Patients with Recurrent or Metastatic Head and Neck Squamous-Cell Carcinoma: A French Retrospective Survey. Oncology 2017; 93:11–17.

Cetuximab-Paclitaxel J1=J29. [33]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1c1 (Ou Si Arrêt > 2 Semaines) = Dose De Charge	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	5.0 mg	Un Cp 4h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h
6	Thérapie Ciblée	Cetuximab	Intraveineuse	400.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 2h

Ordre	Type	Produit / Protocole Des J1 (> C1)	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	5.0 mg	Un Cp 4h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h
6	Thérapie Ciblée	Cetuximab	Intraveineuse	250.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h

Ordre	Type	Produit / Protocole J8 Et J15	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	5.0 mg	Un Cp 4h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie

3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h
6	Thérapie Ciblée	Cetuximab	Intraveineuse	250.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h

Ordre	Type	Produit / Protocole J22	Voie	Dose	Observation
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 1 h avant Cetuximab
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Thérapie Ciblée	Cetuximab	Intraveineuse	250.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h

[33] Hitt R, Irigoyen A, Cortes-Funes H, Grau JJ, García-Sáenz JA, Cruz-Hernandez JJ. Phase II study of the combination of cetuximab and weekly paclitaxel in the first-line treatment of patients with recurrent and/or metastatic squamous cell carcinoma of head and neck. Annals of Oncology 2012; 23:1016–1022.

Pembrolizumab-Cisplatine-5FU continue J1=J22. [34]

Ordre	Type	Produit / Protocole J2	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl +2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9% en 30 min
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/ M2	Dans 1000 ml SS 0,9% en 2h

8	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/ M2	En perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L ou SG 5% 1L + 4gNacl +2gKcl en 3h

[34] Burtness B, Harrington KJ, Greil R, Soulières D, Tahara M, De Castro G, et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. The Lancet 2019; 394:1915–1928.

Pembrolizumab-Carboplatine-5FU continue J1=J22. [34]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 1 h avant Cetuximab
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9% en 30 min
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min
7	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/M2	SS 0.9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours

[34] Burtness B, Harrington KJ, Greil R, Soulières D, Tahara M, De Castro G, et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. The Lancet 2019; 394:1915–1928.

Pembrolizumab J1=J22. [35,36]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9% en 30 min

[35] Cohen EEW, Soulières D, Le Tourneau C, Dinis J, Licitra L, Ahn M-J, et al. Pembrolizumab versus methotrexate, docetaxel, or cetuximab for recurrent or metastatic head-and-neck squamous cell carcinoma (KEYNOTE-040): a randomised, open-label, phase 3 study. The Lancet 2019; 393:156–167.

[36] Hsu C, Lee S-H, Ejadi S, Even C, Cohen RB, Le Tourneau C, et al. Safety and Antitumor Activity of Pembrolizumab in Patients With Programmed Death-Ligand 1–Positive Nasopharyngeal Carcinoma: Results of the KEYNOTE-028 Study. JCO 2017; 35:4050–4056.

Nivolumab J1=J15. [37,38]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	3.0 mg/ Kg	Dans 200 ml SS 0,9%

[37] Ferris RL, Blumenschein G, Fayette J, Guigay J, Colevas AD, Licitra L, et al. Nivolumab for Recurrent Squamous-Cell Carcinoma of the Head and Neck. N Engl J Med 2016; 375:1856–1867.

[38] Ma BBY, Lim W-T, Goh B-C, Hui EP, Lo K-W, Pettinger A, et al. Antitumor Activity of Nivolumab in Recurrent and Metastatic Nasopharyngeal Carcinoma: An International, Multicenter Study of the Mayo Clinic Phase 2 Consortium (NCI-9742). JCO 2018; 36:1412–14f.