B. CANCER DU CAVUM (UCNT)

I. TRAITEMENT DES FORMES LOCALISÉES

RCC avec Cisplatine 100 mg J1=J22 (Radio-chimiothérapie concomitante). [1,2]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisoloe	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0,9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 4h

[1] Al-Sarraf M, LeBlanc M, Giri PG, Fu KK, Cooper J, Vuong T, et al. Chemoradiotherapy versus radiotherapy in patients with advanced nasopharyngeal cancer: phase III randomized Intergroup study 0099. J Clin Oncol 1998; 16:1310–1317.

[2] Lin J-C, Jan J-S, Hsu C-Y, Liang W-M, Jiang R-S, Wang W-Y. Phase III study of concurrent chemoradiotherapy versus radiotherapy alone for advanced nasopharyngeal carcinoma: positive effect on overall and progression-free survival. J Clin Oncol 2003; 21:631–637.

RCC avec Cisplatine 40 mg J1=J8. [1,2]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	40.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0,9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 3h

[1] Al-Sarraf M, LeBlanc M, Giri PG, Fu KK, Cooper J, Vuong T, et al. Chemoradiotherapy versus radiotherapy in patients with advanced nasopharyngeal cancer: phase III randomized Intergroup study 0099. J Clin Oncol 1998; 16:1310–1317.

[2] Lin J-C, Jan J-S, Hsu C-Y, Liang W-M, Jiang R-S, Wang W-Y. Phase III study of concurrent chemoradiotherapy versus radiotherapy alone for advanced nasopharyngeal carcinoma: positive effect on overall and progression-free survival. J Clin Oncol 2003; 21:631–637.

TPF = Docetaxel-Cisplatine-5FU J1=J21 [38,39]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1500.0 ml	SS 0.9% 2L en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	60.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage (J1)
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	60.0 mg/M2	Dans 500 ml SS en 1h (J1)
7	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	600mg/m²/j	Dans 500 ml SS 0.9% de J1 à J5 en perfusion continue
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4gNacl +2gKcl) sur 4h
9	Soins de support	Filgrastim	Sous-cutanée	30.0 UNITE	1 injection SC par jour de J5 à J10

[38]Bae WK, Hwang JE, Shim HJ, et al. Phase II study of docetaxel, cisplatin, and 5-FU induction chemotherapy followed by chemoradiotherapy in locoregionally advanced nasopharyngeal cancer. Cancer Chemother Pharmacol 2010;65:589-595.

[39]Sun Y, Li WF, Chen NY, et al. Induction chemotherapy plus concurrent chemoradiotherapy versus concurrent chemoradiotherapy alone in locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma: a phase 3, multicentre, randomised controlled trial. Lancet Oncol 2016;17:1509-1520.

Cisplatine-Gemcitabine J1=J21 [33,34]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2L en 6h ou SG 5% 2L +4gNaCl +2gKCl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/ M2	Dans 100 ml SS 0.9% en 30min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 3h ou SG 5% 1L + 4gNacl +2gKcl en 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole J8	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/ M2	Dans 100 ml SS 0.9% puis rinçage

[33] Zhang Y, Chen L, Hu G-Q, Zhang N, Zhu X-D, Yang K-Y, et al. Gemcitabine and Cisplatin Induction Chemotherapy in Nasopharyngeal Carcinoma. N Engl J Med 2019; 381:1124–1135.

[34] Ngan RKC, Yiu HHY, Lau WH, Yau S, Cheung FY, Chan TM, et al. Combination gemcitabine and cisplatin chemotherapy for metastatic or recurrent nasopharyngeal carcinoma: report of a phase II study. Annals of Oncology 2002; 13:1252–1258.

II. TRAITEMENT DES FORMES RÉCIDIVANTES OU MÉTASTATIQUES

Cisplatine-Gemcitabine J1=J22. [15,16]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2L en 6h ou SG 5% 2L +4gNaCl +2gKCl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 100 ml SS 0.9% en 30min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 3h ou SG 5% 1L + 4gNacl +2gKcl en 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole J8	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 100 ml SS 0.9% puis rinçage

[15] Zhang Y, Chen L, Hu G-Q, Zhang N, Zhu X-D, Yang K-Y, et al. Gemcitabine and Cisplatin Induction Chemotherapy in Nasopharyngeal Carcinoma. N Engl J Med 2019; 381:1124–1135.

[16] Ngan RKC, Yiu HHY, Lau WH, Yau S, Cheung FY, Chan TM, et al. Combination gemcitabine and cisplatin chemotherapy for metastatic or recurrent nasopharyngeal carcinoma: report of a phase II study. Annals of Oncology 2002; 13:1252–1258.

Cisplatine-Docetaxel J1=J22. [17–19]

Ordre	Type	Produit / protocole j1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure de sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2L en 6h ou SG 5% 2L +4g NaCl +2g KCl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Anti histaminiques h1	Orale	10.0 mg	Un Cp 1h avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
6	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h puis rinçage
8	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure de sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 4h ou SG 5% 1L + 4gNacl +2gKcl en 4h
10	Soins de support	Filgrastim	Sous-cutanée	30.0 UNITE	1 injection SC par jour de J5 à J10

[17] Hui EP, Ma BB, Leung SF, King AD, Mo F, Kam MK, et al. Randomized phase II trial of concurrent cisplatin-radiotherapy with or without neoadjuvant docetaxel and cisplatin in advanced nasopharyngeal carcinoma. J Clin Oncol 2009; 27:242–249.

[18] Chua DTT, Sham JST, Au GKH. A phase II study of docetaxel and cisplatin as first-line chemotherapy in patients with metastatic nasopharyngeal carcinoma. Oral Oncol 2005; 41:589–595.

[19] Specht L, Larsen SK, Hansen HS. Phase II study of docetaxel and cisplatin in patients with recurrent or disseminated squamous-cell carcinoma of the head and neck. Ann Oncol 2000; 11:845–849.

Docetaxel J1=J22. [22]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 1h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage

[22] Catimel G, Verweij J, Mattijssen V, Hanauske A, Piccart M, Wanders J, et al. Docetaxel (Taxotere): an active drug for the treatment of patients with advanced squamous cell carcinoma of the head and neck. EORTC Early Clinical Trials Group. Ann Oncol 1994; 5:533–537.

Paclitaxel J1=J8. [23]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	5.0 mg	Un Cp 4h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h

[23] Tahara M, Minami H, Hasegawa Y, Tomita K, Watanabe A, Nibu K, et al. Weekly paclitaxel in patients with recurrent or metastatic head and neck cancer. Cancer Chemother Pharmacol 2011; 68:769–776.

Cisplatine-Doxorubicine J1=J22. [24,25]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% +4g NaCl +2g KCl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	50.0 mg/ M2	Dans 100 ml SS 0,9% en 15 min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% + 4gNacl +2gKcl en 3h

[24] M'Rabti H, Sbiti Y, Afqir S, Boutayeb S, Errihani H. La chimiothérapie dans les cancers du cavum. Annales d'Otolaryngologie et de Chirurgie Cervico-faciale 2006; 123:59–64.

[25] Prawira A, Oosting SF, Chen TW, Delos Santos KA, Saluja R, Wang L, et al. Systemic therapies for recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma: a systematic review. Br J Cancer 2017; 117:1743–1752.

Cisplatine-Paclitaxel J1=J22. [20]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2L en 6h ou SG 5% 2L +4g NaCl +2g KCl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie

3	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
4	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
5	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
6	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
7	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
8	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	Dans 500 ml SG 5% ou SS 0.9%
9	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h puis rinçage
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 3h ou SG 5% 1L + 4gNacl +2gKcl en 3h

[20] Gibson MK, Li Y, Murphy B, Hussain MHA, DeConti RC, Ensley J, et al. Randomized phase III evaluation of cisplatin plus fluorouracil versus cisplatin plus paclitaxel in advanced head and neck cancer (E1395): an intergroup trial of the Eastern Cooperative Oncology Group. J Clin Oncol 2005; 23:3562–3567.

Cisplatine-Capecitabine J1=J22. [26]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2L en 6h ou SG 5% 2L +4g NaCl +2g KCl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 4h ou SG 5% 1L + 4gNacl +2gKcl en 4h
8	Chimiothérapie	Capecitabine	Orale	2000.0 mg/M2	2x/jour : matin et soir 30 min après le repas, pdt 14J

[26] Li Y-H, Wang F-H, Jiang W-Q, Xiang X-J, Deng Y-M, Hu G-Q, et al. Phase II study of capecitabine and cisplatin combination as first-line chemotherapy in Chinese patients with metastatic nasopharyngeal carcinoma. Cancer Chemother Pharmacol 2008; 62:539–544.

Capecitabine J1=J22. [27]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Chimiothérapie	Capecitabine	Orale	2500.0 mg/M2	2x/jour : matin et soir 30 min après le repas, pdt 14J puis repos 7 jours

[27] Iqbal H, Pan Q. Capecitabine for treating head and neck cancer. Expert Opinion on Investigational Drugs 2016; 25:851–859.

Gemcitabine J1=J8. [28]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0,9% ou SG 5% en 30 min puis rinçage

[28] Zhang L, Zhang Y, Huang P-Y, Xu F, Peng P-J, Guan Z-Z. Phase II clinical study of gemcitabine in the treatment of patients with advanced nasopharyngeal carcinoma after the failure of platinum-based chemotherapy. Cancer Chemother Pharmacol 2008; 61:33–38.

Paclitaxel-Carboplatine J1=J22. [29]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/ M2	Dans 500 ml SG 5% ou SS 0.9% en 3h
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 100 ml SG 5% puis rinçage

[29] Alfieri S, Granata R, Bergamini C, Resteghini C, Bossi P, Licitra LF, et al. Systemic therapy in metastatic salivary gland carcinomas: A pathology-driven paradigm? Oral Oncology 2017; 66:58–63.