C. CANCERS DES GLANDES SALIVAIRES

I. TRAITEMENT DES FORMES AVANCÉES, RÉCIDIVANTES OU MÉTASTATIQUES

Paclitaxel-Carboplatine J1=J21 [42,43]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	Dans 500 ml SG 5% ou SS 0.9% en 3h
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 60mn puis rinçage

[42]Nakano K, Sato Y, Sasaki T, et al. Combination chemotherapy of carboplatin and paclitaxel for advanced/metastatic salivary gland carcinoma patients: differences in responses by different pathological diagnoses. Acta Otolaryngol 2016;136:948-951.

[43]Airoldi M, Fornari G, Pedani F, et al. Paclitaxel and carboplatin for recurrent salivary gland malignancies. Anticancer Res 2000;20:3781-3783

Vinorelbine-Cisplatine J1=J21 [41]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2L en 6h ou SG 5% 2L +4gNaCl +2gKCl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie

3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Vinorelbine	Intraveineuse	25mg/m2	50 ml de chlorure de sodium à 0,9 % pendant 15 minutes puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/m2	Dans 1000ml SS 0,9% en 1h puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 3h ou SG 5% 1L + 4gNacl +2gKcl en 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole J8	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Vinorelbine	Intraveineuse	25mg/m2	50 ml de chlorure de sodium à 0,9 % pendant 15 minutes puis rinçage

[41]Airoldi M, Pedani F, Succo G, et al. Phase II randomized trial comparing vinorelbine versus vinorelbine plus cisplatin in patients with recurrent salivary gland malignancies. Cancer 2001;91:541-547

Gemcitabine -Carboplatine J1=J22. [44]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2L en 6h ou SG 5% 2L +4gNaCl +2gKCl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 250 ml SS 0.9% en 30mn puis rinçage
7	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5	Dans 500 ml SG 5% en 60mn puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L en 3h ou SG 5% 1L + 4gNacl +2gKcl en 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole J8	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 250 ml SS 0.9% en 30 mn puis rinçage

[44]Laurie SA, Siu LL, Winquist E, et al. A phase 2 study of platinum and gemcitabine in patients with advanced salivary gland cancer: a trial of the NCIC Clinical Trials Group. Cancer 2010;116:362-368