A- Sarcomes des tissus mous – Tumeurs desmoïdes – Rhabdomyosarcomes :

I-DANS LA MALADIE LOCALISÉE:

AI (DOXORUBUCINE,IFOSFAMIDE) J1 à J3 J1=J21 [1]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	3000.0 mg/ M2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	3000.0 mg/ M2	dans 1000cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	60.0 mg/M2	dans 100 cc SS ou SG en 15min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Mesna	Intraveineuse	3000.0 mg/ M2	Dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	3000.0 mg/ M2	Dans 1000 cc SS 0,9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Orale	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Mesna	Intraveineuse	3000.0 mg/ M2	Dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage

6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	3000.0 mg/ M2	Dans 1000 cc SS 0,9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[1] Verma S, Younus J, Stys-Norman D, Haynes AE, Blackstein M, Members of the SarcomaDisease Site Group of Cancer Care Ontario's Program in Evidence-Based Care. Meta-analysis of ifosfamide-basedcombinationchemotherapy in advanced soft tissue sarcoma. Cancer TreatRev 2008; 34:339–347.

IFOSFAMIDE- EPIRUBUCINE- MESNA. J1=J21 [2]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Doses	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL
5	Chimiothérapie	Mesna	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage (H0 H4 H8)
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 1000cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Epirubucine	100.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL
5	Chimiothérapie	Mesna	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage (H0 H4 H8)
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 1000cc SS 0,9%
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL
5	Chimiothérapie	Mesna	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage (H0 H4 H8)
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 1000cc SS 0,9%

8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL
5	Chimiothérapie	Mesna	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage (H0 H4 H8)
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 1000cc SS 0,9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL
5	Chimiothérapie	Mesna	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage (H0 H4 H8)

6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1800.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 1000cc SS 0,9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
8	Soin de support	Filgrastim	30 UI	Sous-cutanée	1 inj par jour pdt 5 jours de J7 à J11

[2] Frustaci S, Gherlinzoni F, De Paoli A, et al. Adjuvant chemotherapy for adult soft tissue sarcomas of the extremities and girdles: results of the Italian randomized cooperative trial. J ClinOncol 2001;19:1238-1247.

CAS PARTICULIERS:

Rhabdomyosarcome

VAC (VINCRISTINE,DOXORUBICINE,CYCLOPHOSPHAMIDE) J1=J21 [40]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	0.9% 1L en 60 min
2	Prémédication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Vincristine	Intraveineuse	1.4 mg/ M2	dans 100 cc SS 0.9% en 10 min puis rinçage sans dépasser 2mg en dose totale
7	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage

8	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS 0.9% puis rinçage
9	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 10 min puis rinçage
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 1L en 60 min

[40] Grier HE, Krailo MD, Tarbell NJ, Link MP, Fryer CJH, Pritchard DJ, et al. Addition of Ifosfamide and Etoposide to Standard Chemotherapy for Ewing's Sarcoma and Primitive Neuroectodermal Tumor of Bone. N Engl J Med 2003; 348:694–701.

LES TUMEUR DESMOIDES

METHOTREXATE- VINBLASTINE (HEBDOMADAIRE)[17]

Ordre	Type	Drogue	Dose	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Methotrexate	30.0 mg/M2	Intraveineuse	En perfusion de 12h dans 1L de SG 5%
4	Chimiothérapie	Vinblastine	6.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 100 cc SS 0,9% en 10 min puis rinçage
5	Chimiothérapie	Folinate De Calcium	60.0 mg/M2	Intramusculaire	30 mg chaque 12H à J2

[17] Azzarelli A, Gronchi A, Bertulli R, et al. Low-dose chemotherapywithmethotrexate and vinblastine for patients with-advancedaggressivefibromatosis. Cancer 2001;92:1259-1264.

II- Dans la maladie métastatique:

AI (DOXORUBUCINE,IFOSFAMIDE) J1 à J3 J1=J21 [1]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	3000.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	3000.0 mg/M2	dans 1000cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	60.0 mg/ M2	dans 100 cc SS ou SG en 15min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Mesna	Intraveineuse	3000.0 mg/M2	Dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	3000.0 mg/M2	Dans 1000 cc SS 0,9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Mesna	Intraveineuse	3000.0 mg/M2	Dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage

6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	3000.0 mg/M2	Dans 1000 cc SS 0,9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[1] Verma S, Younus J, Stys-Norman D, Haynes AE, Blackstein M, Members of the SarcomaDisease Site Group of Cancer Care Ontario's Program in Evidence-Based Care. Meta-analysis of ifosfamide-basedcombinationchemotherapy in advanced soft tissue sarcoma. Cancer TreatRev 2008; 34:339–347.

ERIBULINE J1=J21[3]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Chimiothérapie	Eribuline	1 à 4 mg/M2	Intraveineuse	Une injection sur 2 à 5 min
J8					
1	Chimiothérapie	Eribuline	1 à 4 mg/M2	Intraveineuse	Une injection sur 2 à 5 min

[3] Schöffski P, Ray-Coquard IL, Cioffi A, et al. Activity of eribulinmesylate in patients with soft-tissue sarcoma: a phase 2 study in four independenthistologicalsubtypes. LancetOncol 2011;12:1045-1052.

TRABECTEDINE J1=J21 [4]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Chimiothérapie	Trabectedine	1.2 mg/M2	Intraveineuse	Une injection sur 24h

[4] Demetri GD, vonMehren M, Jones RL, et al. Efficacy and safety of trabectedin or dacarbazine for metastaticliposarcoma or leiomyosarcomaafterfailure of conventionalchemotherapy: results of a phase III randomizedmulticenterclinical trial. J Clin Oncol 2016;34:786-793.

CARBOPLATINE- ETOPOSIDE J1 à J3 J1=J21 [24]

Ordre	Type	Drogue	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5	Intraveineuse	AUC 5 dans 250 cc de SG 5% en 30 min puis rinçage
4	Chimiothérapie	Etoposide	150.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS 0,9% en 1h puis rinçage
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	150.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS 0,9% en 1h puis rinçage
J3					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	150.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS 0,9% en 1h puis rinçage

[24] Klingebiel T, Pertl U, Hess CF, et al. Treatment of childrenwithrelapsed soft tissue sarcoma: report of the German CESS/CWS REZ 91 trial. Med PediatrOncol 1998;30:269-275.

DOXORUBICINE + DACARBAZINE J1 à J3 J1=J21 [25]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	60.0 mg/ m2	dans 100 cc SS 0,9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Dacarbazine	Intraveineuse	300.0 mg/ m2	dans 250 ml de SG 5% en 30 min puis rincer
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Prémédication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Dacarbazine	Intraveineuse	300.0 mg/ m2	dans 250 ml de SG 5% en 30 min puis rincer

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J3					
1	Prémédication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Dacarbazine	Intraveineuse	300.0 mg/ m2	dans 250 ml de SG 5% en 30 min puis rincer

[25] Antman K, Crowley J, Balcerzak SP, Rivkin SE, Weiss GR, Elias A, et al. An intergroup phase III randomized study of doxorubicin and dacarbazine with or without ifosfamide and mesna in advanced soft tissue and bone sarcomas. J ClinOncol 1993; 11:1276–1285.

GEMCITABINE J1,J8 + DOCETAXEL J1=J21 [26,27]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10 mg	IVL
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	900 mg/m2	dans 250 cc SS 9% ou SG 5% en 30 min puis rinçage

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Prémédication	Anti Histaminiques H1	Orale	10 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	900 mg/m2	dans 250 cc SS 9% ou SG 5% en 30 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	75 mg/m2	Dans 250 cc SS 0.9% SG 5% en 60 min puis rinçage
7	Soins de support	Filgrastim	Sous-cutanée	30 UI	Neupogen ou Gran: 1 injection sous cutanée par jour de J10 à J15

[26] Hensley ML. Update on gemcitabine and docetaxel combination therapy for primary and metastatic sarcomas. CurrOpinOncol 2010; 22:356–361.

[27] Navid F, Willert JR, McCarville MB, Furman W, Watkins A, Roberts W, et al. Combination of gemcitabine and docetaxelin the treatment of children and young adults with refractory bone sarcoma.Cancer 2008; 113:419–425.

DACARBAZINE J1 à J3 J1=J21 [28]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Aprepitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL

5	Chimiothérapie	Dacarbazine	Intraveineuse	300mg/ m2	dans 250 ml de SG 5% puis rincer
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Prémédication	Aprepitant	Orale	80 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Dacarbazine	Intraveineuse	300mg/ m2	dans 250 ml de SG 5% puis rincer
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Prémédication	Aprepitant	Orale	80 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Dacarbazine	Intraveineuse	300mg/ m2	dans 250 ml de SG 5% puis rincer

[28]Van Tine BA, Weiss MC, Hirbe AC, Oppelt PJ, Abaricia S, Trinkaus K, et al. Phase II study of dacarbazine given with modern prophylactic anti-emetics and growth factor support to patients with metastatic, resistant soft tissue, and bone sarcoma. Rare Tumors 2021; 13:20363613211052

GEMCITABINE J1,J8,J15 J1=J28

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/m2	Dans 250 ml de SG 5% ou SS 0.9% puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/m2	Dans 250 ml de SG 5% ou SS 0.9% puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J15					
1	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/m2	Dans 250 ml de SG 5% ou SS 0.9% puis rinçage

DOXORUBICINE J1=J21 [25,29]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
4	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	75 mg/m2	dans 100 cc SS 9% ou SG 5% en 15 min puis rinçage

[25] Antman K, Crowley J, Balcerzak SP, Rivkin SE, Weiss GR, Elias A, et al. An intergroup phase III randomized study of doxorubicin and dacarbazine with or without ifosfamide and mesna in advanced soft tissue and bone sarcomas. J Clin Oncol 1993; 11:1276–1285.

[29] Edmonson JH, Ryan LM, Blum RH, Brooks JS, Shiraki M, Frytak S, et al. Randomized comparison of doxorubicinalone versus ifosfamide plus doxorubicin or mitomycin, doxorubicin, and cisplatin against advanced soft tissue sarcomas. J Clin Oncol 1993; 11:1269–1275

IFOSFAMIDE J1 à J3 J1=J21 BOLUS (5 g/m²) [30]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8

6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800mg/m2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800mg/m2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL

5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800mg/ M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

[30] Verschoor AJ, Speetjens FM, Dijkstra PDS, Fiocco M, Sande MAJ, Bovée JVMG, et al. Single-Center Experience with Ifosfamide Monotherapy as Second-Line Treatment of Recurrent/Metastatic Osteosarcoma. The Oncologist 2020; 25:e716–e721.

IFOSFAMIDE J1 à J5 J1=J21 BOLUS (9g/m²) [31]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800mg/ M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800mg/ M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800mg/ M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800mg/ M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800mg/ M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9 %

7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

[31] Verschoor AJ, Speetjens FM, Dijkstra PDS, Fiocco M, Sande MAJ, Bovée JVMG, et al. Single-Center Experience with Ifosfamide Monotherapy as Second-Line Treatment of Recurrent/Metastatic Osteosarcoma. The Oncologist 2020; 25:e716–e721.

VINORELBINE J1,J8,J15 J1=J21 [32]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Vinorelbine	Intraveineuse	30.0 mg/m2	dans 100 cc SS 0.9% en 10 min puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Vinorelbine	Intraveineuse	30.0 mg/m2	dans 100 cc SS 0.9% en 10 min puis rinçage

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J15					
1	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Vinorelbine	Intraveineuse	30.0 mg/m2	dans 100 cc SS 0.9% en 10 min puis rinçage

[32]Casanova M, Ferrari A, Spreafico F, Terenziani M, Massimino M, Luksch R, et al. Vinorelbine in previously treated advanced childhood sarcomas: Evidence of activity in rhadbomyosarcoma. Cancer 2002; 94:3263–3268.

PACLITAXEL J1,J8,J15 J1=J21 [33]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1 cp 4h avant traitement
2	Prémédication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	20mg 1 cp le jour de la chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ m2	Dans 500 cc SS 0.9% en 60 min puis rinçage

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Prémédication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1 cp 4h avant traitement
2	Prémédication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	20mg 1 cp le jour de la chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ m2	Dans 500 cc SS 0.9% en 60 min puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J15					
1	Prémédication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	1 cp 4h avant traitement
2	Prémédication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	20mg 1 cp le jour de la chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ m2	Dans 500 cc SS 0.9% en 60 min puis rinçage

[33] Schlemmer M, Reichardt P, Verweij J, Hartmann JT, Judson I, Thyss A, et al. Paclitaxel in patients with advanced angiosarcomas of soft tissue: a retrospective study of the EORTC soft tissue and bone sarcoma group. Eur J Cancer 2008; 44:2433–2436.

IMATINIB EN CONTINU [9,10]

Ordre	Type	Drogue	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Imatinib	400mg	Orale	100mg per os: 4 cp par jour 1 h avant repas ou 2h après repas pendant 30j en continu ou 400mg per os: 1cp par jour 1 h avant repas ou 2h après repas pendant 30j en continu

[9] Rutkowski P, Van Glabbeke M, Rankin CJ, Ruka W, Rubin BP, Debiec-Rychter M, et al. Imatinib mesylate in advanced dermatofibrosarcomaprotuberans: pooled analysis of two phase II clinical trials. J ClinOncol 2010; 28:1772–1779.

[10] Stacchiotti S, Pedeutour F, Negri T, Conca E, Marrari A, Palassini E, et al. Dermatofibrosarcomaprotuberans-derived fibrosarcoma: clinical history, biological profile and sensitivity to imatinib. Int J Cancer 2011; 129:1761–1772.

PAZOPANIB EN CONTINU [11]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Pazopanib	800mg	Orale	800mg par jour en continu 1 h avant repas ou 2h après repas pendant 30 jours

[11]van der Graaf WTA, Blay J-Y, Chawla SP, Kim D-W, Bui-Nguyen B, Casali PG, et al. Pazopanib for metastatic soft-tissue sarcoma (PALETTE): arandomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 2012; 379:1879–188

REGORAFENIB [12]J1=J28

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Regorafinib	160.0 mg	Orale	1 cp / j pdt 21 j puis repos 7 jours

[12] Florence Duffaud , Olivier Mir , Pascaline Boudou-Rouquette , Sophie Piperno-Neumann , Nicolas Penel , Emanuelle-Bompas , Corinne Delcambre ,Elsa Kalbacher, Antoine Italiano, Olivier Collard , Christine Chevreau , Esma Saada, Nicolas Isambert , Jessy Delaye , Camille Schiffler , Corinne Bouvier , Vincent Vidal , Sylvie Chabaud , Jean-Yves Blay ; French Sarcoma Group. Efficacy and safety of regorafenib in adult patients withmetastaticosteosarcoma: a non-comparative, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 study

CABOZANTINIB [13] en continu

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Cabozantinib	60 mg	Orale	1 cp / j en continu en dehors des repas à heure fixe

[13] Italiano A, Mir O, Mathoulin-Pelissier S, et al. Cabozantinib in patients with advanced Ewing sarcoma or osteosarcoma (CABONE): a multicentre, single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol 2020;21:446-455.

SORAFENIB en continu [14]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Sorafinib	800mg	Orale	400 mg * 2/ j en continu en dehors des repas

[14] Grignani G, Palmerini E, Dileo P, et al. A phase II trial of sorafenib in relapsed and unresectablehigh-grade osteosarcomaafterfailure of standard multimodal therapy: an ItalianSarcoma Group study. Ann Oncol 2012; 23:508-516.

ATEZOLIZUMAB J1=J21 [15]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Atezolizumab	1200.0 mg	Intraveineuse	Dans 250 cc de SS 0,9%

[15] Naqash AR, Coyne GH, Moore N, et al. Phase II study of atezolizumab in advanced alveolar soft part sarcoma (ASPS). JClin Oncol 2021;39:suppl.11519.

SUNITINIB en continu [19,20]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Sunitinib	37,5mg	Orale	1 cp par jour en continu 1H avant ou 2H après repas chaque 28 jours

[19] Stacchiotti S, Negri T, Zaffaroni N, et al. Sunitinib in advanced alveolar soft part sarcoma: evidence of a direct antitumor effect. Ann Oncol 2011;22:1682-1690.

[20] Stacchiotti S, Tamborini E, Marrari A, et al. Response to sunitinib malate in advanced alveolar soft part sarcoma. Clin Cancer Res 2009;15:1096-1104.