B- LE CANCER DU SEIN TRIPLE NÉGATIF

I - Stade Localisé :

AC 60 (J1=J21) : [1]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Doxorubicine	IV	60 mg/ m2	Dans 100cc de SS en 15 min
5	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	IV	600 mg/ m2	Dans 250cc de SS en 30 min

[1] W. Eiermann et al., "Phase III study of doxorubicin/cyclophosphamide with concomitant versus sequential docetaxel as adjuvant treatment in patients with human epidermal growth factor receptor 2-normal, node-positive breast cancer: BCIRG-005 trial," J. Clin. Oncol., vol. 29, no. 29, pp. 3877–3884, Oct. 2011, doi: 10.1200/JCO.2010.28.5437.

AC 60 dose dense (J1=J15) : [1]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Doxorubicine	IV	60 mg/ m2	Dans 100cc de SS en 15 min
5	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	IV	600 mg/ m2	Dans 250cc de SS en 30 min
6	Soins de support	Filgrastim	SC	30 U	01 injection SC par jour pendant 05 jours

[1] W. Eiermann et al., "Phase III study of doxorubicin/cyclophosphamide with concomitant versus sequential docetaxel as adjuvant treatment in patients with human epidermal growth factor receptor 2-normal, node-positive breast cancer: BCIRG-005 trial," J. Clin. Oncol., vol. 29, no. 29, pp. 3877–3884, Oct. 2011, doi: 10.1200/JCO.2010.28.5437.

Paclitaxel J1, J8, J15 (J1 = J21) : [2] [3] [4]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimio
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 500 cc de SS en 60 min
J8					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimio
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 500 cc de SS en 60 min
J15					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimio
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 500 cc de SS en 60 min

[2] "[Administration hebdomadaire de paclitaxel pour le cancer du sein avancé ou métastatique - prémédications de courte durée pour les patients ambulatoires] - PubMed." https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11057321/ (accessed Apr. 06, 2024).

[3] "[Clinical study of weekly paclitaxel administration for metastatic breast cancer based on time to progression (TTP) and survival] - PubMed." https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12852349/ (accessed Apr. 06, 2024).

[4] J. A. Sparano et al., "Weekly paclitaxel in the adjuvant treatment of breast cancer," N. Engl. J. Med., vol. 358, no. 16, pp. 1663–1671, Apr. 2008, doi: 10.1056/NEJMOA0707056.

FEC 100 (J1=J21) : [5]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Epirubicine	IV	100 mg/ m2	Dans 100cc de SS en 15 min
5	Chimiothérapie	Fluorouracile	IV	500 mg/ m2	Dans 100cc de SS en 30 min
6	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	IV	500 mg/ m2	Dans 250cc de SS en 30 min

[5] M. N. Levine, K. I. Pritchard, V. H. C. Bramwell, L. E. Shepherd, D. Tu, and N. Paul, "Randomized trial comparing cyclophosphamide, epirubicin, and fluorouracil with cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil in premenopausal women with node-positive breast cancer: update of National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group Trial MA5," J. Clin. Oncol., vol. 23, no. 22, pp. 5166–5170, 2005, doi: 10.1200/JCO.2005.09.423.

EC 100 (J1=J21) : [6]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Epirubicine	IV	100 mg/ m2	Dans 100cc de SS en 15 min
5	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	IV	500 mg/ m2	Dans 250cc de SS en 30 min

[6] J. U. Blohmer et al., "Epirubicin and cyclophosphamide versus epirubicin and docetaxel as first-line therapy for women with metastatic breast cancer: final results of a randomised phase III trial," Ann. Oncol. Off. J. Eur. Soc. Med. Oncol., vol. 21, no. 7, pp. 1430–1435, Jan. 2010, doi: 10.1093/ANNONC/MDP585.

EC 100 dose dense (J1=J15): [6]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Epirubicine	IV	100 mg/ m2	Dans 100cc de SS en 15 min
5	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	IV	600 mg/ m2	Dans 250cc de SS en 30 min
6	Soins de support	Filgrastim	SC	30 U	01 injection SC par jour pdt 05 jours

[6] J. U. Blohmer et al., "Epirubicin and cyclophosphamide versus epirubicin and docetaxel as first-line therapy for women with metastatic breast cancer: final results of a randomised phase III trial," Ann. Oncol. Off. J. Eur. Soc. Med. Oncol., vol. 21, no. 7, pp. 1430–1435, Jan. 2010, doi: 10.1093/ANNONC/MDP585.

CMF modifié (J1=J21) : [7] [8]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	IV	600 mg/ m2	Dans 250cc de SS en 30 min
5	Chimiothérapie	Méthotrexate	IV	40 mg/m2	Dans 250 cc de SS en 30 min
6	Chimiothérapie	Fluorouracile	IV	500 mg/ m2	Dans 250cc de SS en 30 min

[7] I. F. Tannock et al., "A randomized trial of two dose levels of cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil chemotherapy for patients with metastatic breast cancer," J. Clin. Oncol., vol. 6, no. 9, pp. 1377–1387, 1988, doi: 10.1200/JCO.1988.6.9.1377.

[8] C. Harper-Wynne et al., "Randomized trial to compare the efficacy and toxicity of cyclophosphamide, methotrexate and 5-fluorouracil (CMF) with methotrexate mitoxantrone (MM) in advanced carcinoma of the breast," Br. J. Cancer, vol. 81, no. 2, p. 316, 1999, doi: 10.1038/SJ.BJC.6990694.

Docetaxel + cyclophosphamide (TC) (J1=J21) : [9]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	75 mg/ m2	Dans 250cc de SS en 60 min
7	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	IV	600 mg/m2	Dans 250cc de SS en 30 min

[9] S. Jones et al., "Docetaxel With Cyclophosphamide Is Associated With an Overall Survival Benefit Compared With Doxorubicin and Cyclophosphamide: 7-Year Follow-Up of US Oncology Research Trial 9735," J. Clin. Oncol., vol. 27, no. 8, pp. 1177–1183, Mar. 2009, doi: 10.1200/JCO.2008.18.4028.

Carboplatine AUC 5 (J1=J21) : [4]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 5	Dans 500 cc SG en 60 min

[4] F. Le Du, E. Moati, P. Vaflard, C. Bailleux, J. Y. Pierga, and V. Dieras, "La prise en charge des cancers du sein triple négatifs : état actuel et perspectives," Bull Cancer, vol. 112, no. 1, pp. 82–99, Jan. 2025, doi: 10.1016/J.BULCAN.2024.09.002.

Docetaxel (J1=J21) : [9] [10] [11][12]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	100 mg/m2	Dans 250 cc de SS en 60 min

[9] Lagha A, Chraiet N, Labidi S, Krimi S, Ayadi M, Gligorov J, Boussen H. Place des taxanes en adjuvant dans le traitement des cancers du sein sans envahissement ganglionnaire. Bull Cancer 2013 ; 100 : 465-71. doi : 10.1684/bdc.2013.1743.

[10] M. E. Trudeau et al., "Docetaxel in patients with metastatic breast cancer: a phase II study of the National Cancer Institute of Canada-Clinical Trials Group," J. Clin. Oncol., vol. 14, no. 2, pp. 422–428, 1996, doi: 10.1200/JCO.1996.14.2.422.

[11] C. A. Hudis et al., "Phase II and pharmacologic study of docetaxel as initial chemotherapy for metastatic breast cancer," J. Clin. Oncol., vol. 14, no. 1, pp. 58–65, 1996, doi: 10.1200/JCO.1996.14.1.58.

[12] P. M. Ravdin et al., "Phase II trial of docetaxel in advanced anthracycline-resistant or anthracenedione-resistant breast cancer," J. Clin. Oncol., vol. 13, no. 12, pp. 2879–2885, 1995, doi: 10.1200/JCO.1995.13.12.2879.

Capécitabine (J1=J21) : [1], [2]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Chimiothérapie	Capécitabine	Orale	2000 mg/m2	2 fois par jour après repas (matin et soir) pdt 14 jours puis repos 1 semaine

[1] C. M. Walko and C. Lindley, "Capecitabine: A review," Clin Ther, vol. 27, no. 1, pp. 23–44, 2005, doi: 10.1016/j.clinthera.2005.01.005.

[2] C. H. Smorenburg, M. Bontenbal, and J. Verweij, "Capecitabine in breast cancer: current status.," Clin Breast Cancer, vol. 1, no. 4, 2001, doi: 10.3816/cbc.2001.n.003.

Paclitaxel + carboplatine (J1 = J21) : [18]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	175 - 200 mg/m2	Dans 500cc de SS en 180 min
7	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 6	Dans 500 cc SG en 60 min

[18] P. Zhang et al., "Better pathologic complete response and relapse-free survival after carboplatin plus paclitaxel compared with epirubicin plus paclitaxel as neoadjuvant chemotherapy for locally advanced triple-negative breast cancer: a randomized phase 2 trial," Oncotarget, vol. 7, no. 37, pp. 60647–60656, 2016, doi: 10.18632/ONCOTARGET.10607.

Paclitaxel + carboplatine (J1, J8, J15) : J1 = J28 : [18]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	100 mg/m2	Dans 500cc de SS en 180 min
7	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 2	Dans 500 cc SG en 60 min

J8					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	100 mg/ m2	Dans 500cc de SS en 180 min
7	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 2	Dans 500 cc SG en 60 min
J15					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	100 mg/ m2	Dans 500cc de SS en 180 min
7	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 2	Dans 500 cc SG en 60 min

[18] P. Zhang et al., "Better pathologic complete response and relapse-free survival after carboplatin plus paclitaxel compared with epirubicin plus paclitaxel as neoadjuvant chemotherapy for locally advanced triple-negative breast cancer: a randomized phase 2 trial," Oncotarget, vol. 7, no. 37, pp. 60647–60656, 2016, doi: 10.18632/ONCOTARGET.10607

Carboplatine + docetaxel (J1=J21) : J1 = J21: [7]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	75 mg/ m2	Dans 250 cc de SS en 60 min
6	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC6	Dans 500 cc SG en 60 min

[7] L. Zhang et al., "Neoadjuvant docetaxel plus carboplatin vs epirubicin plus cyclophosphamide followed by docetaxel in triple-negative, early-stage breast cancer (NeoCART): Results from a multicenter, randomized controlled, open-label phase II trial," Int J Cancer, vol. 150, no. 4, pp. 654–662, Feb. 2022, doi: 10.1002/IJC.33830.

Paclitaxel + carboplatine (J1, J8, J15) + Pembrolizumab (J1=J21) : (J1=J28) : [19]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	90 mg/ m2	Dans 500cc de SS en 180 min
7	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 2	Dans 500 cc SG en 60 min
8	Immunothérapie	Pembrolizumab	IV	200mg	200 mg IV en 30 min, toute les 3 semaines

J8					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	90 mg/ m2	Dans 500cc de SS en 180 min
7	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 2	Dans 500 cc SG en 60 min
J15					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	90 mg/ m2	Dans 500cc de SS en 180 min
7	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 2	Dans 500 cc SG en 60 min

[19] Schmid P, Cortes J, Dent R, et al. Overall Survival with Pembrolizumab in Early-Stage Triple-Negative Breast Cancer. N Engl J Med. 2024;391(21):1981-1991. doi:10.1056/NEJMoa2409932

Pembrolizumab (J1 = J21) [19]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	IV	200 mg	200 mg IV en 30 min, toute les 3 semaines

[19] Schmid P, Cortes J, Dent R, et al. Overall Survival with Pembrolizumab in Early-Stage Triple-Negative Breast Cancer. N Engl J Med. 2024;391(21):1981-1991. doi:10.1056/NEJMoa2409932

Olaparib: [20]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Olaparib	Orale	150 mg	2 cps 2 fois par jour en continu

[20] A. N. J. Tutt et al., " Adjuvant Olaparib for Patients with BRCA1 - or BRCA2 -Mutated Breast Cancer ," New England Journal of Medicine, vol. 384, no. 25, pp. 2394–2405, Jun. 2021, doi: 10.1056/nejmoa2105215.

II- Stade Métastatique :

EC100 : (J1 = J21) : [6]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Epirubicine	IV	100 mg/m2	Dans 100cc de SS en 15 min
5	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	IV	600 mg/m2	Dans 250cc de SS en 30 min

[6] J. U. Blohmer et al., "Epirubicin and cyclophosphamide versus epirubicin and docetaxel as first-line therapy for women with metastatic breast cancer: final results of a randomised phase III trial," Ann. Oncol. Off. J. Eur. Soc. Med. Oncol., vol. 21, no. 7, pp. 1430–1435, Jan. 2010, doi: 10.1093/ANNONC/MDP585.

AC60 : (J1 = J21) : [1]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Doxorubicine	IV	60 mg/m2	Dans 100cc de SS en 15 min
5	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	IV	600 mg/m2	Dans 250cc de SS en 30 min

[1] W. Eiermann et al., "Phase III study of doxorubicin/cyclophosphamide with concomitant versus sequential docetaxel as adjuvant treatment in patients with human epidermal growth factor receptor 2-normal, node-positive breast cancer: BCIRG-005 trial," J. Clin. Oncol., vol. 29, no. 29, pp. 3877–3884, Oct. 2011, doi: 10.1200/JCO.2010.28.5437.

Docetaxel : (J1 = J21) : [9] [10] [11] [12]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	100 mg/m2	Dans 250 cc de SS en 60 min

[9] Lagha A, Chraiet N, Labidi S, Krimi S, Ayadi M, Gligorov J, Boussen H. Place des taxanes en adjuvant dans le traitement des cancers du sein sans envahissement ganglionnaire. Bull Cancer 2013 ; 100 : 465-71. doi : 10.1684/bdc.2013.1743.

[10] M. E. Trudeau et al., "Docetaxel in patients with metastatic breast cancer: a phase II study of the National Cancer Institute of Canada-Clinical Trials Group," J. Clin. Oncol., vol. 14, no. 2, pp. 422–428, 1996, doi: 10.1200/JCO.1996.14.2.422.

[11] C. A. Hudis et al., "Phase II and pharmacologic study of docetaxel as initial chemotherapy for metastatic breast cancer," J. Clin. Oncol., vol. 14, no. 1, pp. 58–65, 1996, doi: 10.1200/JCO.1996.14.1.58.

[12] P. M. Ravdin et al., "Phase II trial of docetaxel in advanced anthracycline-resistant or anthracenedione-resistant breast cancer," J. Clin. Oncol., vol. 13, no. 12, pp. 2879–2885, 1995, doi: 10.1200/JCO.1995.13.12.2879.

Paclitaxel (J1, J8, J15) : (J1 = J21) [2] [3] [4]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimio
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 500 cc de SS en 60 min
J8					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimio

2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/ m2	Dans 500 cc de SS en 60 min
J15					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimio
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/ m2	Dans 500 cc de SS en 60 min

[2] "[Administration hebdomadaire de paclitaxel pour le cancer du sein avancé ou métastatique - prémédications de courte durée pour les patients ambulatoires] - PubMed." https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11057321/ (accessed Apr. 06, 2024).

[3] "[Clinical study of weekly paclitaxel administration for metastatic breast cancer based on time to progression (TTP) and survival] - PubMed." https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12852349/ (accessed Apr. 06, 2024).

[4] J. A. Sparano et al., "Weekly paclitaxel in the adjuvant treatment of breast cancer," N. Engl. J. Med., vol. 358, no. 16, pp. 1663–1671, Apr. 2008, doi: 10.1056/NEJMOA0707056.

Docetaxel + capecitabine (J1 = J21) : [16]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Aprépitant	Prémédication	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie

4	Méthylprednisolone	Prémédication	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Ondansétron	Prémédication	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
6	Docetaxel	Chimiothérapie	IV	75 mg/m2	Dans 250cc de SS en 60 min
7	Capécitabine	Chimiothérapie	Orale	950 mg/m2	2 fois par jour : matin et soir pdt 14 jours, 30 min après repas

[16] J. O'Shaughnessy et al., "Superior survival with capecitabine plus docetaxel combination therapy in anthracycline-pretreated patients with advanced breast cancer: phase III trial results," J. Clin. Oncol., vol. 20, no. 12, pp. 2812–2823, Jun. 2002, doi: 10.1200/JCO.2002.09.002.

Paclitaxel (J1 = J21) + gemcitabine (J1, J8) J1 = J21 : [3]

Ordre	Type	Produit/protocole	**Voie**	Dose	**Observation**
J1					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	175 mg/m2	Dans 500 cc SS en 60 min
7	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1250 mg/m2	Dans 100 cc SS en 30 min
J8					
1	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	**IV**	120 mg	IVL 30 min avant chimio
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1250 mg/m2	Dans 100 cc SS en 30 min

[3] K. Da Yu et al., "Effect of Adjuvant Paclitaxel and Carboplatin on Survival in Women with Triple-Negative Breast Cancer: A Phase 3 Randomized Clinical Trial," JAMA Oncol, vol. 6, no. 9, pp. 1390–1396, Sep. 2020, doi: 10.1001/jamaoncol.2020.2965.

Carboplatine (J1 = J21) :[4]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 5	Dans 500 cc SG en 60 min

[4] F. Le Du, E. Moati, P. Vaflard, C. Bailleux, J. Y. Pierga, and V. Dieras, "La prise en charge des cancers du sein triple négatifs : état actuel et perspectives," Bull Cancer, vol. 112, no. 1, pp. 82–99, Jan. 2025, doi: 10.1016/J.BULCAN.2024.09.002.

Gemcitabine (J1,J8) J1 = J21 : [17]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimio
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1000 mg/m2	Dans 100 cc SS en 30 min
J8					
1	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimio
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1000 mg/m2	Dans 100 cc SS en 30 min

[17] J. Carmichael et al., "Advanced breast cancer: a phase II trial with gemcitabine," J. Clin. Oncol., vol. 13, no. 11, pp. 2731–2736, 1995, doi: 10.1200/JCO.1995.13.11.2731.

Gemcitabine (J1, J8) + carboplatine AUC2 (J1, J8): J1 = J21 [15]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1000 mg/ m2	Dans 100 cc SS en 30 min
5	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 2	Dans 500 cc SG en 60 min
J8					
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1000 mg/ m2	Dans 100 cc SS en 30 min
5	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 2	Dans 500 cc SG en 60 min

[15] Ou J, Zhu X, Zhang H, et al. A Retrospective Study of Gemcitabine and Carboplatin With or Without Intravenous Vitamin C on Patients With Advanced Triple-Negative Breast Cancer. Integr Cancer Ther. 2020;19:1534735419895591. doi:10.1177/1534735419895591

Paclitaxel – carboplatine J1 = J21 [16] :

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	175 –200 mg/m2	Dans 500cc de SS en 180 min
7	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 6	Dans 500 cc SG en 60 min

[16] Fountzilas G, et al. "A phase II study of paclitaxel plus carboplatin as first-line chemotherapy in women with metastatic breast carcinoma." Cancer, 2000

Paclitaxel hebdomadaire + carboplatine hebdomadaire : J1 = J28 : [17]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	Orale 5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	100 mg/ m2	Dans 500cc de SS en 180 min
7	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 2	Dans 500 cc SG en 60 min

J8					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	100 mg/ m2	Dans 500cc de SS en 180 min
7	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 2	Dans 500 cc SG en 60 min
J15					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	100 mg/ m2	Dans 500cc de SS en 180 min
7	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 2	Dans 500 cc SG en 60 min

[17] O'Shaughnessy J, et al. «A phase II clinical trial of weekly paclitaxel and carboplatin in metastatic triple-negative breast cancer.» Clinical Breast Cancer, 2015

Cyclophosphamide oral metronomique [18] :

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	Orale	50 mg	1 cp par jour en continu pdt 1 mois

[18] Nasr KE, Osman MA, Elkady MS, Ellithy MA. Metronomic methotrexate and cyclophosphamide after carboplatin included adjuvant chemotherapy in triple negative breast cancer: a phase III study. Ann Transl Med. 2015;3(19):284. doi:10.3978/j.issn.2305-5839.2015.11.14

Eribuline (J1, J8) : J1 = J21 : [19] [20]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Chimiothérapie	Eribuline Mesylate	IV	1,23 mg/m2	Dans 100cc SS en 5 min
J8					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Chimiothérapie	Eribuline Mesylate	IV	1,23 mg/m2	Dans 100cc SS en 5 min

[19] P. A. Kaufman et al., "Phase III open-label randomized study of eribulin mesylate versus capecitabine in patients with locally advanced or metastatic breast cancer previously treated with an anthracycline and a taxane," J. Clin. Oncol., vol. 33, no. 6, pp. 594–601, Feb. 2015, doi: 10.1200/JCO.2013.52.4892.

[20] J. Cortes et al., "Eribulin monotherapy versus treatment of physician's choice in patients with metastatic breast cancer (EMBRACE): a phase 3 open-label randomised study," Lancet (London, England), vol. 377, no. 9769, pp. 914–923, 2011, doi: 10.1016/S0140-6736(11)60070-6.

Vinorelbine IV : J1, J8, J15 (J1=J28) [21]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimio
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
3	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/m2	Dans 100 cc SS en 10 min
J8					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimio
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
3	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/m2	Dans 100 cc SS en 10 min
J15					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimio
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
3	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/m2	Dans 100 cc SS en 10 min

[21] J. García-conde et al., "Phase II trial of weekly IV vinorelbine in first-line advanced breast cancer chemotherapy," Ann. Oncol. Off. J. Eur. Soc. Med. Oncol., vol. 5, no. 9, pp. 854–857, 1994, doi: 10.1093/OXFORDJOURNALS.ANNONC.A059019.

Vinorelbine orale J1, J8, J15 (J1=J28) : [22] [23]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Chimiothérapie	Vinorelbine	Orale	60 mg/m2	En une prise unique
J8					
1	Chimiothérapie	Vinorelbine	Orale	60 mg/m2	En une prise unique
J15					
1	Chimiothérapie	Vinorelbine	Orale	60 mg/m2	En une prise unique

[22] M. Mansour and C. Mourad, "Phase II study of single agent oral vinorelbine as first-line treatment in patients with HER-2 negative metastatic breast cancer," Cancer Chemother. Pharmacol., vol. 72, no. 2, pp. 429–435, Aug. 2013, doi: 10.1007/S00280-013-2216-8.

[23] G. G. Steger et al., "Phase Ii Study Evaluating Oral Vinorelbine As a Single-Agent As First-Line Chemotherapy for Metastatic Breast Cancer Patients with Bone Metastases (Norbreast-228 Trial): First Efficacy Results," Ann. Oncol., vol. 25, p. iv132, Sep. 2014, doi: 10.1093/ANNONC/MDU329.52.

Capecitabine : J1 = J21 : [1] [2]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Chimiothérapie	Capécitabine	Orale	2000 mg/ m2	2 fois par jour après repas (matin et soir) pdt 14 jours puis repos 1 semaine

[1] C. M. Walko and C. Lindley, "Capecitabine: A review," Clin Ther, vol. 27, no. 1, pp. 23–44, 2005, doi: 10.1016/j.clinthera.2005.01.005.

[2] C. H. Smorenburg, M. Bontenbal, and J. Verweij, "Capecitabine in breast cancer: current status.," Clin Breast Cancer, vol. 1, no. 4, 2001, doi: 10.3816/cbc.2001.n.003.

Capécitabine + vinorelbine IV (J1, J8) : J1 = J21 [14]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimio
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
3	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/ m2	Dans 100 cc SS en 10 min
4	Chimiothérapie	Capécitabine	Orale	1 g /m2	2 fois par jour après repas (matin et soir) pdt 14 jours puis repos 1 semaine
J8					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimio
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
3	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/ m2	Dans 100 cc SS en 10 min

[14] M. R. Strada et al., "Intravenous or Oral Vinorelbine Plus Capecitabine As First-Line Treatment in HER2– Metastatic Breast Cancer: Joint Analysis of 2 Consecutive Prospective Phase II Trials," Clin. Breast Cancer, vol. 12, no. 1, pp. 30–39, Feb. 2012, doi: 10.1016/J.CLBC.2011.11.001.

Pembrolizumab + paclitaxel hebdomadaire (J1, J8, J15) J1 = J28 : [24] [25]

Ordre	Type	Produit/protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Prémédication	Antihistaminique	5 mg	Orale	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	20 mg	Orale	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	120 mg	IV	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	8 mg	IV	IVL 30 min avant chimiothérapie

5	Chimiothérapie	Paclitaxel	90 mg/m2	IV	Dans 500 cc SS en 60 min
6	Immunothérapie	Pembrolizumab	200 mg	IV	200 mg IV en 30 min, toute les 3 semaines
J8					
1	Prémédication	Antihistaminique	5 mg	Orale	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	20 mg	Orale	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	120 mg	IV	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	8 mg	IV	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	90 mg/m2	IV	Dans 500 cc SS en 60 min
J15					
1	Prémédication	Antihistaminique	5 mg	Orale	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	20 mg	Orale	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	120 mg	IV	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	8 mg	IV	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	90 mg/m2	IV	Dans 500 cc SS en 60 min
J21					
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	200 mg	IV	200 mg IV en 30 min, toute les 3 semaines

[24] P. A. Fasching et al., "Pembrolizumab in combination with nab-paclitaxel for the treatment of patients with early-stage triple-negative breast cancer – A single-arm phase II trial (NeoImmunoboost, AGO-B-041)," Eur. J. Cancer, vol. 184, pp. 1–9, May 2023, doi: 10.1016/J.EJCA.2023.01.001.

[25] J. Cortes et al., "Pembrolizumab plus Chemotherapy in Advanced Triple-Negative Breast Cancer," N. Engl. J. Med., vol. 387, no. 3, pp. 217–226, Jul. 2022, doi: 10.1056/NEJMOA2202809.

Pembrolizumab + Gemcitabine + carboplatine AUC 2 (J1, J8) : J1 = J21 : [26][25]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimio
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1000 mg/ m2	Dans 100 cc SS en 30 min
4	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 2	Dans 500 cc SG en 60 min
5	Immunothérapie	Pembrolizumab	IV	200 mg	200 mg IV en 30 min, toute les 3 semaines
J8					
1	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimio
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1000 mg/ m2	Dans 100 cc SS en 30 min
4	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 2	Dans 500 cc SG en 60 min

[25] J. Cortes et al., "Pembrolizumab plus Chemotherapy in Advanced Triple-Negative Breast Cancer," N. Engl. J. Med., vol. 387, no. 3, pp. 217–226, Jul. 2022, doi: 10.1056/NEJMOA2202809.

[26] "Keynote 355: métastatique (triple négatif) Pembrolizumab Carboplatine Gemzar ou Taxol." https://www.oncoclic.fr/sein/c/0/i/76853088/article-n-1521 (accessed Jan. 20, 2025).

Bevacizumab (J1, J15) + Paclitaxel (J1, J8, J15): J1 = J28 : [15]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Bevacizumab	Thérapie ciblée	IV	10 mg/ Kg	Dans 100cc SS 0,9% en 90 min par perfusion IV bien rincer à la fin TA et BU avant bevacizumab , TA après bevacizumab
6	Paclitaxel	Chimiothérapie	IV	80 mg/ m2	Dans 500 cc SS en 60 min
J8					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie

4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Paclitaxel	Chimiothérapie	IV	80 mg/ m2	Dans 500 cc SS en 60 min
J15					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	Orale 5 mg	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Bevacizumab	Thérapie ciblée	IV	10 mg/ Kg	Dans 100cc SS 0,9% en 90 min par perfusion IV bien rincer à la fin TA et BU avant bevacizumab , TA après bevacizumab
6	Paclitaxel	Chimiothérapie	IV	80 mg/ m2	Dans 500 cc SS en 60 min

[15] K. Miller et al., "Paclitaxel plus bevacizumab versus paclitaxel alone for metastatic breast cancer," N. Engl. J. Med., vol. 357, no. 26, pp. 2666–2676, Dec. 2007, doi: 10.1056/NEJMOA072113.

Olaparib en continu: [27] :

Ordre	Type	Produit/ protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Olaparib	Orale	150 mg	2 cps 2 fois par jour en continu

[27] Robson ME, Tung N, Conte P, et al. OlympiAD final overall survival and tolerability results: Olaparib versus chemotherapy treatment of physician's choice in patients with a germline BRCA mutation and HER2-negative metastatic breast cancer. Ann Oncol. 2019;30(4):558-566. doi:10.1093/annonc/mdz012

Talazoparib [28] :

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Talazoparib	Orale	1 mg	1 capsule par jour pendant 28 jours

[28] Litton JK, Hurvitz SA, Mina LA, et al. Talazoparib versus chemotherapy in patients with germline BRCA1/2-mutated HER2-negative advanced breast cancer: final overall survival results from the EMBRACA trial. Ann Oncol. 2020;31(11):1526-1535. doi:10.1016/j.annonc.2020.08.2098

Sacituzumab-govitecan J1-J8 (J1=J21) : [29]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Thérapie ciblée	Sacituzumab govitecan	IV	10 mg/kg	Perfusion intraveineuse dans 500 ml

J8					
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Thérapie ciblée	Sacituzumab govitecan	IV	10 mg/kg	Perfusion intraveineuse dans 500 ml

[29] Bardia A, Rugo HS, Tolaney SM, et al. Final Results From the Randomized Phase III ASCENT Clinical Trial in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer and Association of Outcomes by Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 and Trophoblast Cell Surface Antigen 2 Expression. J Clin Oncol. 2024;42(15):1738-1744. doi:10.1200/JCO.23.01409