C - CANCER DU SEIN RH+ :

I - Stade Localisé :

EC 100 : J1 = J21 : [6]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Epirubicine	IV	100 mg/ m2	Dans 100cc de SS en 15 min
5	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	IV	600 mg/ m2	Dans 250cc de SS en 30 min

[6] J. U. Blohmer et al., "Epirubicin and cyclophosphamide versus epirubicin and docetaxel as first-line therapy for women with metastatic breast cancer: final results of a randomised phase III trial," Ann. Oncol. Off. J. Eur. Soc. Med. Oncol., vol. 21, no. 7, pp. 1430–1435, Jan. 2010, doi: 10.1093/ANNONC/MDP585.

Docetaxel : J1 = J21 : [9]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	100 mg/ m2	Dans 250 cc de SS en 60 min

[9] Lagha A, Chraiet N, Labidi S, Krimi S, Ayadi M, Gligorov J, Boussen H. Place des taxanes en adjuvant dans le traitement des cancers du sein sans envahissement ganglionnaire. Bull Cancer 2013 ; 100 : 465-71. doi : 10.1684/ bdc.2013.1743.

AC 60 : J1 = J21 : [1]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Doxorubicine	IV	60 mg/m2	Dans 100cc de SS en 15 min
5	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	IV	600 mg/ m2	Dans 250cc de SS en 30 min

[1] W. Eiermann et al., "Phase III study of doxorubicin/cyclophosphamide with concomitant versus sequential docetaxel as adjuvant treatment in patients with human epidermal growth factor receptor 2-normal, node-positive breast cancer: BCIRG-005 trial," J. Clin. Oncol., vol. 29, no. 29, pp. 3877–3884, Oct. 2011, doi: 10.1200/JCO.2010.28.5437.

AC 60 Dose Dense : J1 = J14 : [1]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Doxorubicine	IV	60 mg/m2	Dans 100cc de SS en 15 min
5	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	IV	600 mg/m2	Dans 250cc de SS en 30 min
6	Soins de support	Filgrastim	SC	30 U	01 injection SC par jour pendant 05 jours

[1] W. Eiermann et al., "Phase III study of doxorubicin/cyclophosphamide with concomitant versus sequential docetaxel as adjuvant treatment in patients with human epidermal growth factor receptor 2-normal, node-positive breast cancer: BCIRG-005 trial," J. Clin. Oncol., vol. 29, no. 29, pp. 3877–3884, Oct. 2011, doi: 10.1200/JCO.2010.28.5437.

Paclitaxel (J1, J8, J15) : J1 = J21 : [4]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimio
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 500 cc de SS en 60 min
J8					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimio
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 500 cc de SS en 60 min
J15					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimio
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 500 cc de SS en 60 min

Paclitaxel : J1 = J21 : [27]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimio
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	175 mg/ m2	Dans 500 cc de SS en 180 min

[27] J. M. Nabholtz et al., "Multicenter, randomized comparative study of two doses of paclitaxel in patients with metastatic breast cancer," J. Clin. Oncol., vol. 14, no. 6, pp. 1858–1867, 1996, doi: 10.1200/JCO.1996.14.6.1858.

Docetaxel + cyclophosphamide (TC) J1 = J21 : [9]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	75 mg/m2	Dans 250cc de SS en 60 min
7	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	IV	600 mg/ m2	Dans 250cc de SS en 30 min

[9] S. Jones et al., "Docetaxel With Cyclophosphamide Is Associated With an Overall Survival Benefit Compared With Doxorubicin and Cyclophosphamide: 7-Year Follow-Up of US Oncology Research Trial 9735," J. Clin. Oncol., vol. 27, no. 8, pp. 1177–1183, Mar. 2009, doi: 10.1200/JCO.2008.18.4028.

Tamoxifène : [28]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Tamoxifène	Orale	20 mg	1 cp en continu après repas pdt 1 mois

[28] G. Mustacchi et al., "Tamoxifen alone versus adjuvant tamoxifen for operable breast cancer of the elderly: long-term results of the phase III randomized controlled multicenter GRETA trial," Ann. Oncol., vol. 14, no. 3, pp. 414–420, Mar. 2003, doi: 10.1093/ANNONC/MDG117.

Anastrozole : [29]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Anastrozole	Orale	1 mg	1 cp par jour en continu après repas

[29] J. M. Nabholtz et al., "Anastrozole is superior to tamoxifen as first-line therapy for advanced breast cancer in post-menopausal women: results of a North American multicenter randomized trial. Arimidex Study Group," J. Clin. Oncol., vol. 18, no. 22, pp. 3758–3767, Nov. 2000, doi: 10.1200/JCO.2000.18.22.3758.

Letrozole : [30]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Letrozole	Orale	2,5 mg	1 cp par jour en continu

[30] H. Mouridsen et al., "Phase III study of letrozole versus tamoxifen as first-line therapy of advanced breast cancer in postmenopausal women: analysis of survival and update of efficacy from the International Letrozole Breast Cancer Group," J. Clin. Oncol., vol. 21, no. 11, pp. 2101–2109, Jun. 2003, doi: 10.1200/JCO.2003.04.194.

Exemestane : [8]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Exemestane	Orale	25 mg	1 cp par jour en continu pdt 1 mois

[8] "Exemestane en adjuvant, avec suppression ovarienne dans le cancer du sein pré-ménopausique : suivi à long terme des essais text et soft combinés - Réseau Pro Santé." Accessed: May 25, 2025. [Online]. Available: https://reseaupro-sante.fr/articles/show/exemestane-en-adjuvant-avec-suppression-ovarienne-dans-le-cancer-du-sein-pre-me-nopau-sique-suivi-a-long-terme-des-essais-text-et-soft-combine-s-2815

Olaparib [35] :

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Olaparib	Orale	150 mg	2 cps 2 fois par jour en continu

[35] A. N. J. Tutt et al., " Adjuvant Olaparib for Patients with BRCA1 - or BRCA2 -Mutated Breast Cancer ," New England Journal of Medicine, vol. 384, no. 25, pp. 2394–2405, Jun. 2021, doi: 10.1056/nejmoa2105215.

Ribociclib + Letrozole [36]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Letrozole	Orale	2,5 mg	1 Cp par jour en continu
2	Thérapie ciblée	Ribociclib	Orale	200 mg	2 comprimés par jour pendant 21 jours puis repos 01 semaine

[36] Hortobagyi GN, Lacko A, Sohn J, et al. A phase III trial of adjuvant ribociclib plus endocrine therapy versus endocrine therapy alone in patients with HR-positive/HER2-negative early breast cancer: final invasive disease-free survival results from the NATALEE trial. Ann Oncol. 2025;36(2):149-157. doi:10.1016/j.annonc.2024.10.015

Abemacicilib + Letrozole [37]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Letrozole	Orale	2,5 mg	1 Cp par jour en continu
2	Thérapie ciblée	Abemaciclib	Orale	150 mg	01 comprimé deux fois par jour en continu

[37] Johnston SRD, Harbeck N, Hegg R, et al. Abemaciclib Combined With Endocrine Therapy for the Adjuvant Treatment of HR+, HER2-, Node-Positive, High-Risk, Early Breast Cancer (monarchE). J Clin Oncol. 2020;38(34):3987-3998. doi:10.1200/JCO.20.02514

Gosereline menstruel [34] :

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Gosereline	Sous-cutanée	3,6 mg	Une injection SC tous les 28 jours

[34] W. Jonat et al., "A randomised study to compare the effect of the luteinising hormone releasing hormone (LHRH) analogue goserelin with or without tamoxifen in pre- and perimenopausal patients with advanced breast cancer," Eur. J. Cancer, vol. 31, no. 2, pp. 137–142, Jan. 1995, doi: 10.1016/0959-8049(94)00415-2.

Triptoreline mensuel [33]:

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Triptoréline	Intramusculaire	3,75 mg	Une IM / 28 jours

[33] J. E. Frampton, "Triptorelin: A Review of its Use as an Adjuvant Anticancer Therapy in Early Breast Cancer," Drugs, vol. 77, no. 18, pp. 2037–2048, Dec. 2017, doi: 10.1007/S40265-017-0849-3,.

II - Stade Metastatique:

Palbociclib + letrozole : [32]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Letrozole	Orale	2,5 mg	1 Cp par jour en continu
2	Thérapie ciblée	Palbociclib	Orale	125 mg	1 gélule par jour pdt 21 jours puis repos 1 semaine

[32] R. S. Finn et al., "Palbociclib and Letrozole in Advanced Breast Cancer," N. Engl. J. Med., vol. 375, no. 20, pp. 1925–1936, Nov. 2016, doi: 10.1056/NEJMOA1607303/SUPPL_FILE/NEJMOA1607303_DISCLOSURES.PDF.

Palbociclib + Fulvestrant: [11]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Fulvestrant	IM	500 mg	J1, J14, J28 la 1ère séance puis tous les 28 jours dans chaque fesse en intramusculaire profonde
2	Thérapie ciblée	Palbociclib	Orale	125 mg	1 gélule par jour pdt 21 jours puis repos 1 semaine

[11] J. Albanell et al., "Randomized phase II study of fulvestrant plus palbociclib or placebo in endocrine-sensitive, hormone receptor-positive/HER2–advanced breast cancer: GEICAM/2014–12 (FLIPPER)," Eur J Cancer, vol. 161, pp. 26–37, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.ejca.2021.11.010.

Ribociclib + Letrozole: [12]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Letrozole	Orale	2,5 mg	1 Cp par jour en continu
2	Thérapie ciblée	Ribociclib	Orale	200 mg	3 comprimés par jour pendant 21 jours puis repos 01 semaine

[12] A. Prat et al., "Ribociclib plus letrozole versus chemotherapy for postmenopausal women with hormone receptor-positive, HER2-negative, luminal B breast cancer (CORALLEEN): an open-label, multicentre, randomised, phase 2 trial," Lancet Oncol, vol. 21, no. 1, pp. 33–43, Jan. 2020, doi: 10.1016/S1470-2045(19)30786-7.

Ribociclib + Fulvestrant : [38]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Fulvestrant	IM	500 mg	J1, J14, J28 la 1ère séance puis tous les 28 jours dans chaque fesse en intramusculaire profonde
2	Thérapie ciblée	Ribociclib	Orale	200 mg	3 comprimés par jour pendant 21 jours puis repos 01 semaine

[12] Slamon DJ, et al. "Ribociclib plus fulvestrant for postmenopausal women with hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer (MONALEESA-3): updated overall survival results from a randomised, double-blind, phase 3 trial." The Lancet Oncology, 2021.

Abemacicilib + Letrozole: [13]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Letrozole	Orale	2,5 mg	1 Cp par jour en continu
2	Thérapie ciblée	Abemaciclib	Orale	150 mg	01 comprimé deux fois par jour en continu

[13] "Haute Autorité de Santé - VERZENIOS (abémaciclib) - Cancer du sein." Accessed: May 25, 2025. [Online]. Available: https://www.has-sante.fr/jcms/p_3601434/en/verzenios-abemaciclib-cancer-du-sein

Abemaciclib + Fulvestrant: [14]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Fulvestrant	IM	500 mg	J1, J14, J28 la 1ère séance puis tous les 28 jours dans chaque fesse en intramusculaire profonde
2	Thérapie ciblée	Abemaciclib	Orale	150 mg	01 comprimé deux fois par jour en continu

[14] G. W. Sledge et al., "The Effect of Abemaciclib Plus Fulvestrant on Overall Survival in Hormone Receptor-Positive, ERBB2-Negative Breast Cancer That Progressed on Endocrine Therapy - MONARCH 2: A Randomized Clinical Trial," JAMA Oncol, vol. 6, no. 1, pp. 116–124, Jan. 2020, doi: 10.1001/jamaoncol.2019.4782.

Fulvestrant : [39]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Fulvestrant	IM	500 mg	J1 J14 J28 la 1ère séance puis tous les 28 jours dans chaque fesse en intramusculaire profonde

[39] J. F. R. Robertson et al., "Fulvestrant 500 mg versus anastrozole 1 mg for hormone receptor-positive advanced breast cancer (FALCON): an international, randomised, double-blind, phase 3 trial," Lancet, vol. 388, no. 10063, pp. 2997–3005, Dec. 2016, doi: 10.1016/S0140-6736(16)32389-3.

Talazoparib : [28]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Talazoparib	Orale	1 mg	1 capsule par jour pendant 28 jours

[28] Litton JK, Hurvitz SA, Mina LA, et al. Talazoparib versus chemotherapy in patients with germline BRCA1/2-mutated HER2-negative advanced breast cancer: final overall survival results from the EMBRACA trial. Ann Oncol. 2020;31(11):1526-1535. doi:10.1016/j.annonc.2020.08.2098

Olaparib : [27]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Olaparib	Orale	150 mg	2 cps 2 fois par jour en continu

[27] A. N. J. Tutt et al., " Adjuvant Olaparib for Patients with BRCA1 - or BRCA2 -Mutated Breast Cancer ," New England Journal of Medicine, vol. 384, no. 25, pp. 2394–2405, Jun. 2021, doi: 10.1056/nejmoa2105215.

Everolimus + letrozole : [40]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Letrozole	Orale	2,5 mg	1 Cp par jour en continu
2	Thérapie ciblée	Everolimus	Orale	10 mg	10 mg/j en continu 1h avant repas ou 2h après repas pdt 1 mois

[40] M. Royce et al., "Everolimus plus endocrine therapy for postmenopausal women with estrogen receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer: A clinical trial," JAMA Oncol, vol. 4, no. 7, pp. 977–984, Jul. 2018, doi: 10.1001/jamaoncol.2018.0060.

Everolimus + anatrozole [41]:

Ordre	Type	Produit/ protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Anastrozole	Orale	1 mg	1 cp par jour en continu après repas
2	Thérapie ciblée	Everolimus	Orale	10 mg	10 mg/j en continu 1h avant repas ou 2h après repas pdt 1 mois

[31] Jerusalem G, et al. "Everolimus plus aromatase inhibitors as maintenance therapy after first-line chemotherapy for metastatic breast cancer: The randomized phase III MAIN-A trial." European Journal of Cancer, 2021.

Everolimus + fulvestrant [42]:

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Fulvestrant	IM	500 mg	J1, J14, J28 la 1ère séance puis tous les 28 jours dans chaque fesse en intramusculaire profonde
2	Thérapie ciblée	Everolimus	Orale	10 mg	10 mg/j en continu 1h avant repas ou 2h après repas pdt 1 mois

[42] N. Kornblum et al., "Randomized phase II trial of fulvestrant plus everolimus or placebo in postmenopausal women with hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative metastatic breast cancer resistant to aromatase inhibitor therapy: Results of PrE0102," Journal of Clinical Oncology, vol. 36, no. 16, pp. 1556–1563, Jun. 2018, doi: 10.1200/JCO.2017.76.9331.

Exemestane + everolimus [42]:

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Exemestane	Orale	25 mg	1 cp par jour en continu pdt 1 mois
2	Thérapie ciblée	Everolimus	Orale	10 mg	10 mg/j en continu 1h avant repas ou 2h après repas pdt 1 mois

[31] D. A. Yardley et al., "Everolimus Plus Exemestane in Postmenopausal Patients with HR+ Breast Cancer: BOLERO-2 Final Progression-Free Survival Analysis," Adv. Ther., vol. 30, no. 10, p. 870, 2013, doi: 10.1007/S12325-013-0060-1.

Sacituzumab-govitecan J1-J8 (J1=J21) : [46]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Thérapie ciblée	Sacituzumab govitecan	IV	10 mg/ kg	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de de sodium à 0,9 % pendant 180 minutes pour la première perfusion. Si celle-ci est bien tolérée, les perfusions suivantes peuvent être administrées pendant 60 à 120 minutes.
J8					
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Thérapie ciblée	Sacituzumab govitecan	IV	10 mg/ kg	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de de sodium à 0,9 % pendant 180 minutes pour la première perfusion. Si celle-ci est bien tolérée, les perfusions suivantes peuvent être administrées pendant 60 à 120 minutes.

[46 Bardia A, Rugo HS, Tolaney SM, et al. Final Results From the Randomized Phase III ASCENT Clinical Trial in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer and Association of Outcomes by Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 and Trophoblast Cell Surface Antigen 2 Expression. J Clin Oncol. 2024;42(15):1738-1744. doi:10.1200/JCO.23.01409

Trastuzumab deruxtecan (J1=J21) : [45]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab deruxtecan	IV	5.4mg/kg	Dans du serum Glucosé à 5 % 100 ml pendant 90 minutes pour la première perfusion. Si celle-ci est bien tolérée, les perfusions suivantes peuvent être administrées pendant 30 minutes.

[45] Ueno NT, Cottone F, Dunton K, et al. Patient-reported outcomes from DESTINY-Breast04: trastuzumab deruxtecan versus physician's choice of chemotherapy in patients with HER2-low mBC. Oncologist. 2025;30(5):oyaf048. doi:10.1093/oncolo/oyaf048

Gosereline mensuel : [34]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Gosereline	Sous-cutanée	3,6 mg	Une injection SC tous les 28 jours

[34] W. Jonat et al., "A randomised study to compare the effect of the luteinising hormone releasing hormone (LHRH) analogue goserelin with or without tamoxifen in pre- and perimenopausal patients with advanced breast cancer," Eur. J. Cancer, vol. 31, no. 2, pp. 137–142, Jan. 1995, doi: 10.1016/0959-8049(94)00415-2.

Triptoréline mensuel : [16]

Ordre	Type	Produit/ protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Triptoréline	Intramusculaire	3,75 mg	Une IM / 28 jours

[16] J. E. Frampton, "Triptorelin: A Review of its Use as an Adjuvant Anticancer Therapy in Early Breast Cancer," Drugs, vol. 77, no. 18, pp. 2037–2048, Dec. 2017, doi: 10.1007/S40265-017-0849-3