A - LES FACTEURS DE CROISSANCE GRANULOCYTAIRES:

Filgrastim [1] [2]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Soins de support	Filgrastim	sous-cutanée	0,5 MUI (5µg)/kg/j	à débuter 24 heures à 48 heures après la fin de la chimiothérapie pour une durée de 5 à 10 jours

PEGFILGRASTIM [2]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Soins de support	Pegfilgrastim	Sous-cutanée	6 mg en dose unique	À administrer 24 à 72 heures après la fin de la chimiothérapie, en dose unique par cycle

[1] : Lalami Y, Klastersky J. Impact of chemotherapy-induced neutropenia (CIN) and febrile neutropenia (FN) on cancer treatment outcomes: An overview about well-established and recently emerging clinical data. Crit Rev Oncol Hematol. 2017 Dec;120:163-179
[2] Hematopoietic Growth Factors. NCCN Guidelines. Version 1.2025

B - ERYTHROPOIÉTINE :

Époétine [1-4] :

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Soins de support	Époétine	Sous-cutanée	450 UI/kg/ semaine	Indication : Hb < 10 g/dL, objectif 12 g/dL. Si Hb augmente < 1 g/dL en 4 sem. → doubler la dose. Si Hb augmente > 2 g/dL en 4 sem. → réduire la dose de 25-50%. Arrêt si Hb > 12 g/dL, absence de réponse après 8 sem., ou fin de chimiothérapie.