Darbépoïétine [1-4] :

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
2	Soins de support	Darbépoïétine	Sous-cutanée	2,25 µg/kg/ semaine ou 500 µg/3 semaines	Indication : Hb < 10 g/dL, objectif 12 g/dL. Si Hb augmente < 1 g/dL en 4 sem. → doubler la dose. Si Hb augmente > 2 g/dL en 4 sem. → réduire la dose de 25-50%. Arrêt si Hb > 12 g/dL, absence de réponse après 8 sem., ou fin de chimiothérapie.

[1]Knight K, Wade S, Balducci L. Prevalence and outcomes of anemia in cancer: a systematic review of the literature. Am J Med. 2004 Apr 5;116 Suppl 7A:11S-26S
[2]Tonelli M et al.: Benefits and harms of erythropoiesis-stimulating agents for anemia related to cancer: a meta-analysis. CMAJ, 2009, 180:E62-E71
[3]Bohlius J et al.: Recombinant human erythropoiesis-stimulating agents and mortality in patients with cancer: a metaanalysis of randomised trials. Lancet, 2009,373:1532-42
[4]Rizzo J.D. et al: : American Society of Clinical Oncology/ American Society of Hematology clinical practice guideline update on the use of epoetin and darbepoetin in adult patients with cancer. J Clin Oncol, 2010, 28:4996-5010

C- FACTEUR DE CROISSANCE PLAQUETTAIRE:

Romiplostim [1-2] :

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Soins de support	Romiplostim	Sous-cutanée	1 µg/ kg/semaine	Taux de plaquettes (x 10^9 /l): - < 50 Augmenter la dose hebdomadaire de 1 µg/kg - > 150 pendant 2 semaines consécutives Diminuer la dose hebdomadaire de 1 µg/ kg. -> 250 Interrompre le traitement