A - Les cancers pulmonaires non à petites cellules

I- stade localisé / localement avancé

RCC avec Cisplatine-Vinorelbine J1=J22. [1]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Vinorelbine	Intraveineuse	15.0 mg/ M2	Dans 100 ml SS en 10 min puis rinçage abondant
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)

[1] Aupérin A, Le Péchoux C, Rolland E, Curran WJ, Furuse K, Fournel P, et al. Meta-analysis of concomitant versus sequential radiochemotherapy in locally advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2010; 28:2181–2190.

RCC avec Cisplatine-Pemetrexed J1=J22. [2]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/M2	Dans 500 ml SS en 1h puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h

[2] Senan S, Brade A, Wang L, Vansteenkiste J, Dakhil S, Biesma B, et al. PROCLAIM: Randomized Phase III Trial of Pemetrexed-Cisplatin or Etoposide-Cisplatin Plus Thoracic Radiation Therapy Followed by Consolidation Chemotherapy in Locally Advanced Nonsquamous Non–Small-Cell Lung Cancer. JCO 2016; 34:953–962.

RCC avec Carboplatine-Paclitaxel J1=J8. [3]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	50.0 mg/M2	Dans 250 ml SG 5% ou SS 0.9% en 1h puis rinçage
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 2.0	Dans 250 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[3] Belani CP, Choy H, Bonomi P, Scott C, Travis P, Haluschak J, et al. Combined chemoradiotherapy regimens of paclitaxel and carboplatin for locally advanced non-small-cell lung cancer: a randomized phase II locally advanced multi-modality protocol. J Clin Oncol 2005; 23:5883–5891.

Cisplatine-Pemetrexed J1=J22. [4]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylpredniso-lone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/M2	Dans 500 ml SS en 1h puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodi-um	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h

[4] Yamamoto N, Kenmotsu H, Yamanaka T, Nakamura S, Tsuboi M. Randomized Phase III Study of Cisplatin With Pemetrexed and Cisplatin With Vinorelbine for Completely Resected Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer: The JIPANG Study Protocol. Clin Lung Cancer 2018; 19:e1–e3.

Cisplatine-Vinorelbine J1=J22. [6]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Vinorelbine	Intraveineuse	25.0 mg/ M2	Dans 100 ml SS en 10 min puis rinçage abondant
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Chimiothérapie	Vinorelbine	Intraveineuse	25.0 mg/ M2	Dans 100 ml SS en 10 min puis rinçage abondant

[6] Douillard J-Y, Tribodet H, Aubert D, Shepherd FA, Rosell R, Ding K, et al. Adjuvant cisplatin and vinorelbine for completely resected non-small cell lung cancer: subgroup analysis of the Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation. J Thorac Oncol 2010; 5:220–228.

Carboplatine-Paclitaxel J1=J22. [7]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 3h puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 250 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[7] Strauss GM, Herndon III JE, Maddaus MA, et al. Adjuvant paclitaxel plus carboplatine compared with observation in stage Ib non small cell lung cancer : CALGB 9633 with the Cancer and Leukemia Group B , Radiation Therapy Oncology Group, and North Cancer Tratment Group Study Groups. J Clin Oncol 2008;26:5043-5051

Carboplatine-Paclitaxel (j1, j8 , j15) J1=J29. [7]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	90.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage

6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 6.0	Dans 250 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H0	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	90.0 mg/ M1	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J15					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	90.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage

[7] Strauss GM, Herndon III JE, Maddaus MA, et al. Adjuvant paclitaxel plus carboplatine compared with observation in stage Ib non small cell lung cancer : CALGB 9633 with the Cancer and Leukemia Group B , Radiation Therapy Oncology Group, and North Cancer Tratment Group Study Groups. J Clin Oncol 2008;26:5043-5051.

Alectinib [8]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Alectinib	Orale	600.0 mg	2x /j Per os au cours d'un repas : en continu

[8] Benjamin J Solomon, Yi Long Wu: ALINA: A phase 3 study of alectinib versus chemotherapy as adjuvant therapy in patients with stage IB-IIIA anaplasic lymphoma kinase- positive (ALK+) non small cell lung cancer

Osimertinib . [9]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Osimertinib	Orale	80.0 mg	Per os en continu 1h avant le repas ou 2h après avec un grand verre d'eau

[9] Wu Y-L, Tsuboi M, He J, John T, Grohe C, Majem M,et al: Osimertinib in resected EGFR - Mutated non small cell lung cancer. N Engl J Med. 29 oct 2020; 383 (18): 1711 -23

Nivolumab-Cisplatine-Pemetrexed J1=J22. [10] [11] [12]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	360.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage

7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 3h

[10] Spicer et al. Neoadjuvant nivolumab (NIVO) + chemotherapy (chemo) vs chemo in patients with resectable non small cell lung cancer: 4-year update from CheckMate 816. ASCO 2024.

[11] Forde PM, Spicer J, Lu S, et al. néoadjuvant nivolumab plus chemotherapy in resectable lung cancer .N Engl J Med 2022;386: 1973 – 1985

[12] Cascone T, Awad M, Spicer J, et al. Perioperative Nivolumab in resectable lung cancer. N Engl J Med 2024; 390:1756-1769.

Nivolumab-Cisplatine-Gemcitabine (J1,J8 J1=J22). [10] [11] [12]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	360.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1250.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1250mg/ M2	Dans 100 ml SS en 10 min puis rincage abondant

[10] Spicer et al. Neoadjuvant nivolumab (NIVO) + chemotherapy (chemo) vs chemo in patients with resectable non small cell lung cancer: 4-year update from CheckMate 816. ASCO 2024.

[11] Forde PM, Spicer J, Lu S, et al. néoadjuvant nivolumab plus chemotherapy in resectable lung cancer .N Engl J Med 2022;386: 1973 – 1985

[12] Cascone T, Awad M, Spicer J, et al. Perioperative Nivolumab in resectable lung cancer. N Engl J Med 2024; 390:1756- 1769.

Nivolumab-Carboplatine-Paclitaxel J1=J22. [10] [11] [12]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant le paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	360.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 3h puis rinçage
7	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5	Dans 500 ml SS 0.9% en 30 min puis r

[10] Spicer et al. Neoadjuvant nivolumab (NIVO) + chemotherapy (chemo) vs chemo in patients with resectable non small cell lung cancer: 4-year update from CheckMate 816. ASCO 2024.

[11] Forde PM, Spicer J, Lu S, et al. néoadjuvant nivolumab plus chemotherapy in resectable lung cancer .N Engl J Med 2022;386: 1973 – 1985

[12] Cascone T, Awad M, Spicer J, et al. Perioperative Nivolumab in resectable lung cancer. N Engl J Med 2024; 390:1756- 1769.

Pembrolizumab-Cisplatine-Pemetrexed J1=J22. [13]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 3h

[13] Wakelee H, Liberman M, Kato T, et al :perioperative pembrolizumab for early stage non small cell lung cancer .N Engl J Med 2023 ; 389: 491- 503

Pembrolizumab-Cisplatine-Gemcitabine J1= J22. [13]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000 mg/M2	Dans 100 ml SS en 10 min puis rincage abondant

[13] Wakelee H, Liberman M, Kato T, et al :perioperative pembrolizumab for early stage non small cell lung cancer .N Engl J Med 2023 ; 389: 491- 503

Durvalumab-Cisplatine-Pemetrexed J1= J22. [14]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
6	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500 mg	Dans SS 0,9%

7	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/M2	Dans 500 ml SS en 1h puis rinçage SG
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h

[14] Heymah JV ,Harpole D, Mitsudomi T, et al : periopérative durvalumab for rsectable non small cell lung cancer .N Engl J Med 2023; 389-1672 - 1684.

Durvalumab-Carboplatine-Pemetrexed J1= J22. [14]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500 mg	Dans SS 0,9%
4	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[14] Heymah JV ,Harpole D, Mitsudomi T, et al : periopérative durvalumab for resectable non small cell lung cancer . N Engl J Med 2023; 389-1672 - 1684.

Durvalumab-Cisplatine-Gemcitabine J1= J22. [14]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500 mg	Dans SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS ou SG en 30 min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS ou SG en 30 min puis rinçage

[14] Heymah JV ,Harpole D, Mitsudomi T, et al : periopérative durvalumab for rsectable non small cell lung cancer .N Engl J Med 2023; 389-1672 - 1684.

Durvalumab-Carboplatine-Gemcitabine J1=J22. [14]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500 mg	Dans SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/ M2	Dans 100 ml SS 0.9% en 30 min
7	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 1h puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/ M2	Dans 100 ml SS ou SG en 30 min

[14] Heymah JV ,Harpole D, Mitsudomi T, et al : periopérative durvalumab for rsectable non small cell lung cancer .N Engl J Med 2023; 389-1672 - 1684.

Durvalumab-Carboplatine-Paclitaxel J1= J22. [14]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant le paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 3h puis rinçage
7	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5	Dans 500 ml SS 0.9% en 30 min puis r

[14] Heymah JV ,Harpole D, Mitsudomi T, et al : periopérative durvalumab for rsectable non small cell lung cancer .N Engl J Med 2023; 389-1672 - 1684.

Nivolumab J1=J22. [12]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	360.0 mg/Kg	Dans SS 0,9%

[12] Cascone T, Awad M, Spicer J, et al. Perioperative Nivolumab in resectable lung cancer. N Engl J Med 2024; 390:1756-1769.

Pembrolizumab J1= J22. [15] [13]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9% en 30 min

[15] Mary Obrien: Pembrolizumab versus placebo as adjuvant therapy for completely resected stage IB -IIIA non slall cell lung cancer (PEARLS/KEYNOTE - 091): an interanalysis of a randomided , triple blind, phase 3 trials

[13] Wakelee H, Liberman M, Kato T, et al :perioperative pembrolizumab for early stage non small cell lung cancer .N Engl J Med 2023 ; 389: 491- 503

Atezolizumab J1= J22. [16]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Atezolizumab	Intraveineuse	1200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9% en 1h

[16] Felip E, Altorki N, Zhou C, Csőszi T, Vynnychenko I, Goloborodko O, et al. Adjuvant atezolizumab after adjuvant chemotherapy in resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (IMpower010): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial. Lancet 2021; 398:1344–1357.

Durvalumab J1= J28. [14]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500mg	Dans SS 0,9%

[14] Heymah JV ,Harpole D, Mitsudomi T, et al : perioperative durvalumab for resectable non small cell lung cancer .N Engl J Med 2023; 389-1672 - 1684.

Durvalumab consolidation aprés RCC J1= J15. [17]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	10mg/kg	Dans SS 0,9%

[17] Antonia SJ, Villegas A, Daniel D, et al. Overall Survival with Durvalumab after Chemoradio-therapy in stage III NS-CLC.NEngl J Med.2018 Sep25.doi :10.1056/NEJMoa1809697

II- Stade avancé et Métastatique

Cisplatine-Pemetrexed J1= J22. [4]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/M2	Dans 500 ml SS en 1h puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h

[4] Yamamoto N, Kenmotsu H, Yamanaka T, Nakamura S, Tsuboi M. Randomized Phase III Study of Cisplatin With Pemetrexed and Cisplatin With Vinorelbine for Completely Resected Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer: The JIPANG Study Protocol. Clin Lung Cancer 2018; 19:e1–e3.

Remplacer par [7] Schiller JH, Harrington D, Belani CP, Langer C, Sandler A, Krook J, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2002; 346:92–98.

Cisplatine-Gemcitabine J1= J22. [5]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl

2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 500 ml SS ou SG en 30 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 500 ml SS ou SG en 30 min puis rinçage

[5] Sandler AB, Nemunaitis J, Denham C, von Pawel J, Cormier Y, Gatzemeier U, et al. Phase III trial of gemcitabine plus cisplatin versus cisplatin alone in patients with locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2000; 18:122–130.

Cisplatine-Docetaxel : J1= J22. [18] [19]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 1h avant chimiothérapie
2	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl

3	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
6	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
7	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS en 1h puis rinçage SG
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h

[18] Fossella F, Pereira JR, von Pawel J, Pluzanska A, Gorbounova V, Kaukel E, et al. Randomized, multinational, phase III study of docetaxel plus platinum combinations versus vinorelbine plus cisplatin for advanced non-small-cell lung cancer: the TAX 326 study group. J Clin Oncol 2003; 21:3016–3024.

[19] Schiller JH, Harrington D, Belani CP, Langer C, Sandler A, Krook J, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2002; 346:92–98.

Cisplatine-Vinorelbine J1= J22. [19]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

5	Chimiothérapie	Vinorelbine	Intraveineuse	25.0 mg/M2	Dans 100 ml SS en 10 min puis rinçage abondant
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Chimiothérapie	Vinorelbine	Intraveineuse	25.0 mg/M2	Dans 100 ml SS en 10 min puis rinçage abondant

[19] Schiller JH, Harrington D, Belani CP, Langer C, Sandler A, Krook J, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2002; 346:92–98.

Cisplatine-Paclitaxel J1= J22. [19]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10 mg	Un Cp 4h avant chimiothérapie
2	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
3	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

5	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	Dans 500 ml SS en 3h puis rinçage SG
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h

[19] Schiller JH, Harrington D, Belani CP, Langer C, Sandler A, Krook J, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2002; 346:92–98.

Carboplatine-Paclitaxel J1= J22. [20]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 3h puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 250 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[20] Rosell R, Gatzemeier U, Betticher DC, Keppler U, Macha HN, Pirker R, et al. Phase III randomised trial comparing paclitaxel/carboplatin with paclitaxel/cisplatin in patients with advanced non-small-cell lung cancer: a cooperative multinational trial. Ann Oncol 2002; 13:1539–1549.

Carboplatine-Gemcitabine J1= J22. [19] [21]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/ M2	Dans 100 ml SS 0.9% en 30 min
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 1h puis rinçage
J8					
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/ M2	Dans 100 ml SS ou SG en 30 min

[19] Schiller JH, Harrington D, Belani CP, Langer C, Sandler A, Krook J, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2002; 346:92–98.

[21] Grossi F, Aita M, Defferrari C, Rosetti F, Brianti A, Fasola G, et al. Impact of Third-Generation Drugs on the Activity of First-Line Chemotherapy in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Meta-Analytical Approach. The Oncologist 2009; 14:497–510.

Carboplatine-Pemetrexed J1= J22. [22]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[22] Shinoda M, Shinkai M, Hara Y, Tomaru K, Manabe S, Murakami S, et al. Efficacy and safety of carboplatin and pemetrexed followed by maintenance with pemetrexed for elderly patients with advanced non-squamous non-small cell lung cancer: A single-arm, open-label, multicenter, phase II study. Asia Pac J Clin Oncol 2021; 17:486–494.

Carboplatine-Docetaxel J1= J22. [19] [21]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 1h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	75.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[19] Schiller JH, Harrington D, Belani CP, Langer C, Sandler A, Krook J, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2002; 346:92–98.

[21] Grossi F, Aita M, Defferrari C, Rosetti F, Brianti A, Fasola G, et al. Impact of Third-Generation Drugs on the Activity of First-Line Chemotherapy in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Meta-Analytical Approach. The Oncologist 2009; 14:497–510.

Carboplatine-Nab-Paclitaxel J1= J22. [23]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Nab-Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Nab-Paclitaxel	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 6.0	Dans 250 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Nab-Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Nab-Paclitaxel	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J15					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H2	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Nab-Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Nab-Paclitaxel	Intraveineuse	100.0 mg/M3	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage

[23] Socinski MA, Bondarenko I, Karaseva NA, Makhson AM, Vynnychenko I, Okamoto I, et al. Weekly nab -Paclitaxel in Combination With Carboplatin Versus Solvent-Based Paclitaxel Plus Carboplatin as First-Line Therapy in Patients With Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer: Final Results of a Phase III Trial. JCO 2012; 30:2055–2062.

Carboplatine-Docetaxel J1=J22. [19] [21]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 1h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[19] Schiller JH, Harrington D, Belani CP, Langer C, Sandler A, Krook J, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2002; 346:92–98.

[21] Grossi F, Aita M, Defferrari C, Rosetti F, Brianti A, Fasola G, et al. Impact of Third-Generation Drugs on the Activity of First-Line Chemotherapy in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Meta-Analytical Approach. The Oncologist 2009; 14:497–510.

Docetaxel J1= J22. [24] [25]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 1h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h

[24] Fossella FV, DeVore R, Kerr RN, Crawford J, Natale RR, Dunphy F, et al. Randomized phase III trial of docetaxel versus vinorelbine or ifosfamide in patients with advanced non-small-cell lung cancer previously treated with platinum-containing chemotherapy regimens. The TAX 320 Non-Small Cell Lung Cancer Study Group. J Clin Oncol 2000; 18:2354–2362.

[25] Fidias PM, Dakhil SR, Lyss AP, Loesch DM, Waterhouse DM, Bromund JL, et al. Phase III Study of Immediate Compared With Delayed Docetaxel After Front-Line Therapy With Gemcitabine Plus Carboplatin in Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer. JCO 2009; 27:591–598.

Gemcitabine J1= J29. [19] [21]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 100 ml SS ou SG en 30 min
J8					
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 100 ml SS ou SG en 30 min
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J15					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 100 ml SS ou SG en 30 min

[19] Schiller JH, Harrington D, Belani CP, Langer C, Sandler A, Krook J, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2002; 346:92–98.

[21] Grossi F, Aita M, Defferrari C, Rosetti F, Brianti A, Fasola G, et al. Impact of Third-Generation Drugs on the Activity of First-Line Chemotherapy in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Meta-Analytical Approach. The Oncologist 2009; 14:497–510.

Paclitaxel J1=J8. [19] [21]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	5.0 mg	Un Cp 4h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h

[19] Schiller JH, Harrington D, Belani CP, Langer C, Sandler A, Krook J, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2002; 346:92–98.

[21] Grossi F, Aita M, Defferrari C, Rosetti F, Brianti A, Fasola G, et al. Impact of Third-Generation Drugs on the Activity of First-Line

Pemetrexed J1= J22. [26]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage SG

[26] Hanna N, Shepherd FA, Fossella FV, Pereira JR, De Marinis F, von Pawel J, et al. Randomized phase III trial of pemetrexed versus docetaxel in patients with non-small-cell lung cancer previously treated with chemotherapy. J Clin Oncol 2004; 22:1589–1597.

Vinorelbine (J1,J8) J1= J22. [27]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Chimiothérapie	Vinorelbine	Intraveineuse	30.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 10min puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Chimiothérapie	Vinorelbine	Intraveineuse	30.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 10min puis rinçage

[27] Gralla R, Harper P, Johnson S, Delgado FM. Vinorelbine (Navelbine®) in the treatment of non-small-cell lung cancer: Studies with single-agent therapy and in combination with cisplatin. Annals of Oncology 1999; 10:S41–S45.

Vinorelbine J1= J28. [27]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Chimiothérapie	Vinorelbine	Orale	60.0 mg/ M2	Per os en une seule prise
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Chimiothérapie	Vinorelbine	Orale	60.0 mg/ M2	Per os en une seule prise
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J15					
1	Chimiothérapie	Vinorelbine	Orale	60.0 mg/ M2	Per os en une seule prise

[27] Gralla R, Harper P, Johnson S, Delgado FM. Vinorelbine (Navelbine®) in the treatment of non-small-cell lung cancer: Studies with single-agent therapy and in combination with cisplatin. Annals of Oncology 1999; 10:S41–S45.

Bevacizumab-Carboplatine-Paclitaxel J1= J22. [28]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 3h puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 250 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
7	Thérapie Ciblée	Bevacizumab	Intraveineuse	7.5 mg/ KG	Dans 500 ml SS en 90 min C1 puis 60 min > C1 puis rinçage TA et BU avant, TA après Bevacizumab

[28] Sandler A, Gray R, Perry MC, Brahmer J, Schiller JH, Dowlati A, et al. Paclitaxel-carboplatin alone or with bevacizumab for non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2006; 355:2542–2550.

Bevacizumab-Carboplatine-Pemetrexed J1= J22. [29]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
5	Thérapie Ciblée	Bevacizumab	Intraveineuse	7.5 mg/KG	Dans 500 ml SS en 90 min C1 puis 60 min > C1 puis rinçage TA et BU avant, TA après Bevacizumab

[29] Patel JD, Socinski MA, Garon EB, Reynolds CH, Spigel DR, Olsen MR, et al. PointBreak: A Randomized Phase III Study of Pemetrexed Plus Carboplatin and Bevacizumab Followed by Maintenance Pemetrexed and Bevacizumab Versus Paclitaxel Plus Carboplatin and Bevacizumab Followed by Maintenance Bevacizumab in Patients With Stage IIIB or IV Nonsquamous Non–Small-Cell Lung Cancer. JCO 2013; 31:4349–4357.

Bevacizumab-Cisplatine-Pemetrexed J1= J22. [30] [31]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS en 1h puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
7	Thérapie Ciblée	Bevacizumab	Intraveineuse	7.5 mg/ KG	Dans 500 ml SS en 90 min C1 puis 60 min > C1 puis rinçage TA et BU avant, TA après Bevacizumab

[30] Barlesi F, Scherpereel A, Rittmeyer A, Pazzola A, Ferrer Tur N, Kim J-H, et al. Randomized Phase III Trial of Maintenance Bevacizumab With or Without Pemetrexed After First-Line Induction With Bevacizumab, Cisplatin, and Pemetrexed in Advanced Nonsquamous Non–Small-Cell Lung Cancer: AVAPERL (MO22089). JCO 2013; 31:3004–3011.

[31] Barlesi F, Scherpereel A, Gorbunova V, Gervais R, Vikström A, Chouaid C, et al. Maintenance bevacizumab–pemetrexed after first-line cisplatin–pemetrexed–bevacizumab for advanced nonsquamous nonsmall-cell lung cancer: updated survival analysis of the AVAPERL (MO22089) randomized phase III trial. Annals of Oncology 2014; 25:1044–1052.

Bevacizumab-Cisplatine-Gemcitabine J1= J22. [32]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS ou SG en 30 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
7	Thérapie Ciblée	Bevacizumab	Intraveineuse	7.5 mg/KG	Dans 500 ml SS en 90 min C1 puis 60 min > C1 puis rinçage TA et BU avant, TA après Bevacizumab
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS ou SG en 30 min puis rinçage

[32] Reck M, von Pawel J, Zatloukal P, Ramlau R, Gorbounova V, Hirsh V, et al. Phase III trial of cisplatin plus gemcitabine with either placebo or bevacizumab as first-line therapy for nonsquamous non-small-cell lung cancer: AVAil. J Clin Oncol 2009; 27:1227–1234.

Ramucirumab-Docetaxel J1= J22. [33] [34]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 1h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Docetaxel	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h
6	Thérapie Ciblée	Ramucirumab	Intraveineuse	10.0 mg/ Kg	Dans 500 ml SS 0,9%

[33] Garon EB, Ciuleanu T-E, Arrieta O, Prabhash K, Syrigos KN, Goksel T, et al. Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel for second-line treatment of stage IV non-small-cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy (REVEL): a multicentre, double-blind, randomised phase 3 trial. The Lancet 2014; 384:665–673.

[34] Reck M, Paz-Ares L, Bidoli P, Cappuzzo F, Dakhil S, Moro-Sibilot D, et al. Outcomes in patients with aggressive or refractory disease from REVEL: A randomized phase III study of docetaxel with ramucirumab or placebo for second-line treatment of stage IV non-small-cell lung cancer. Lung Cancer 2017; 112:181–187.

Gefitinib-Carboplatine-Pemetrexed J1= J22. [35]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Gefitinib	Orale	250 mg	Per os en continu 1h avant le repas ou 2h après avec un grand verre d'eau

4	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[35] Noronha V,Patil VM, Joshi A, et al.Gefitinib versus Gefitinib plus Pemitrexed and carboplatin chemotherapy in EGFR-Mutated Lung cancer. J Clin Oncol. 14 Août 2019 ;JCO1901154

Afatinib continu. [36] [37]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Afatinib	Orale	40.0 mg	Per os en continu 1h avant le repas ou 2h après avec un grand verre d'eau

[36] Yang JC-H, Wu Y-L, Schuler M, Sebastian M, Popat S, Yamamoto N, et al. Afatinib versus cisplatin-based chemotherapy for EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma (LUX-Lung 3 and LUX-Lung 6): analysis of overall survival data from two randomised, phase 3 trials. Lancet Oncol 2015; 16:141–151.

[37] Yang JC-H, Sequist LV, Geater SL, Tsai C-M, Mok TSK, Schuler M, et al. Clinical activity of afatinib in patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring uncommon EGFR mutations: a combined post-hoc analysis of LUX-Lung 2, LUX-Lung 3, and LUX-Lung 6. Lancet Oncol 2015; 16:830–838.

Erlotinib continu. [38]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Erlotinib	Orale	150.0 mg	Per os en continu 1h avant le repas ou 2h après avec un grand verre d'eau

[38] Rosell R, Carcereny E, Gervais R, Vergnenegre A, Massuti B, Felip E, et al. Erlotinib versus standard chemotherapy as first-line treatment for European patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (EURTAC): a multicentre, open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2012; 13:239–246.

Dacomitinib continu. [39] [40]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Dacomitinib	Orale	45.0 mg	Per os en continu 1h avant le repas ou 2h après avec un grand verre d'eau

[39] Wu Y-L, Cheng Y, Zhou X, Lee KH, Nakagawa K, Niho S, et al. Dacomitinib versus gefitinib as first-line treatment for patients with EGFR-mutation-positive non-small-cell lung cancer (ARCHER 1050): a randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology 2017; 18:1454–1466.

[40] Mok TS, Cheng Y, Zhou X, Lee KH, Nakagawa K, Niho S, et al. Improvement in Overall Survival in a Randomized Study That Compared Dacomitinib With Gefitinib in Patients With Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer and EGFR -Activating Mutations. JCO 2018; 36:2244–2250.

Gefitinib continu. [41] [42]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Gefitinib	Orale	250.0 mg	Per os en continu 1h avant le repas ou 2h après avec un grand verre d'eau

[41] Mok TS, Wu Y-L, Thongprasert S, Yang C-H, Chu D-T, Saijo N, et al. Gefitinib or carboplatin-paclitaxel in pulmonary adenocarcinoma. N Engl J Med 2009; 361:947–957.

[42] Douillard J-Y, Ostoros G, Cobo M, Ciuleanu T, McCormack R, Webster A, et al. First-line gefitinib in Caucasian EGFR mutation-positive NSCLC patients: a phase-IV, open-label, single-arm study. Br J Cancer 2014; 110:55–62.

Osimertinib continu. [43] [44] [45]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Osimertinib	Orale	80.0 mg	Per os en continu 1h avant le repas ou 2h après avec un grand verre d'eau

[43] Soria J-C, Ohe Y, Vansteenkiste J, Reungwetwattana T, Chewaskulyong B, Lee KH, et al. Osimertinib in Untreated EGFR-Mutated Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2018; 378:113–125.

[44] Mok TS, Wu Y-L, Ahn M-J, Garassino MC, Kim HR, Ramalingam SS, et al. Osimertinib or Platinum-Pemetrexed in EGFR T790M-Positive Lung Cancer. N Engl J Med 2017; 376:629–640.

[45] Cho JH, Lim SH, An HJ, Kim KH, Park KU, Kang EJ, et al. Osimertinib for Patients With Non-Small-Cell Lung Cancer Harboring Uncommon EGFR Mutations: A Multicenter, Open-Label, Phase II Trial (KCSG-LU15-09). J Clin Oncol 2020; 38:488–495.

Erlotinib-Bevacizumab J1=J22. [46] [47]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Erlotinib	Orale	150.0 mg	Per os en continu 1h avant le repas ou 2h après avec un grand verre d'eau
2	Thérapie Ciblée	Bevacizumab	Intraveineuse	15 mg/ KG	Dans 500 ml SS en 90 min C1 puis 60 min > C1 puis rinçage TA et BU avant, TA après Bevacizumab

[46] Kawashima Y, Fukuhara T, Saito H, Furuya N, Watanabe K, Sugawara S, et al. Bevacizumab plus erlotinib versus erlotinib alone in Japanese patients with advanced, metastatic, EGFR-mutant non-small-cell lung cancer (NEJ026): overall survival analysis of an open-label, randomised, multicentre, phase 3 trial. The Lancet Respiratory Medicine 2022; 10:72–82.

[47] Zhou Q, Xu C-R, Cheng Y, Liu Y-P, Chen G-Y, Cui J-W, et al. Bevacizumab plus erlotinib in Chinese patients with untreated, EGFR-mutated, advanced NSCLC (ARTEMIS-CTONG1509): A multicenter phase 3 study. Cancer Cell 2021; 39:1279-1291.e3.

Erlotinib-Ramucirumab J1=J15. [48]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Erlotinib	Orale	150.0 mg	Per os en continu 1h avant le repas ou 2h après avec un grand verre d'eau
2	Thérapie Ciblée	Ramucirumab	Intra-veineuse	10.0 mg/ Kg	Dans 500 ml SS 0,9%

[48] Nakagawa K, Garon EB, Seto T, Nishio M, Ponce Aix S, Paz-Ares L, et al. Ramucirumab plus erlotinib in patients with untreated, EGFR-mutated, advanced non-small-cell lung cancer (RELAY): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. The Lancet Oncology 2019; 20:1655–1669.

Alectinib continu. [49] [50]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Alectinib	Orale	600.0 mg	2x /j Per os au cours d'un repas

[49] S P, Dr C, At S, S G, Js A, Dw K, et al. Alectinib versus Crizotinib in Untreated ALK-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. The New England Journal of Medicine 2017; 377.

[50] Hida T, Nokihara H, Kondo M, Kim YH, Azuma K, Seto T, et al. Alectinib versus crizotinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer (J-ALEX): an open-label, randomised phase 3 trial. Lancet 2017; 390:29–39.

Brigatinib continu. [51] [52] [53] [54]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Brigatinib	Orale	180.0 mg	D'abord 90 mg/j pendant 7 j (Préparation) Puis 180 mg 1x /j Per os en continu

[51] Camidge DR, Kim HR, Ahn M-J, Yang JCH, Han J-Y, Hochmair MJ, et al. Brigatinib Versus Crizotinib in ALK Inhibitor–Naive Advanced ALK-Positive NSCLC: Final Results of Phase 3 ALTA-1L Trial. Journal of Thoracic Oncology 2021; 16:2091–2108.

[52] Huber RM, Hansen KH, Paz-Ares Rodríguez L, West HL, Reckamp KL, Leighl NB, et al. Brigatinib in Crizotinib-Refractory ALK+ NSCLC: 2-Year Follow-up on Systemic and Intracranial Outcomes in the Phase 2 ALTA Trial. Journal of Thoracic Oncology 2020; 15:404–415.

[53] Stinchcombe TE, Doebele RC, Wang X, Gerber DE, Horn L, Camidge DR. Preliminary Clinical and Molecular Analysis Results From a Single-Arm Phase 2 Trial of Brigatinib in Patients With Disease Progression After Next-Generation ALK Tyrosine Kinase Inhibitors in Advanced ALK+ NSCLC. Journal of Thoracic Oncology 2021; 16:156–161.

[54] Nishio M, Yoshida T, Kumagai T, Hida T, Toyozawa R, Shimokawaji T, et al. Brigatinib in Japanese Patients With ALK-Positive NSCLC Previously Treated With Alectinib and Other Tyrosine Kinase Inhibitors: Outcomes of the Phase 2 J-ALTA Trial. Journal of Thoracic Oncology 2021; 16:452–463.

Ceritinib continu. [55] [56] [57]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Certinib	Orale	750.0 mg	1x /j Per os en continu

[55] Soria J-C, Tan DSW, Chiari R, Wu Y-L, Paz-Ares L, Wolf J, et al. First-line ceritinib versus platinum-based chemotherapy in advanced ALK -rearranged non-small-cell lung cancer (ASCEND-4): a randomised, open-label, phase 3 study. The Lancet 2017; 389:917–929.

[56] Shaw AT, Kim TM, Crinò L, Gridelli C, Kiura K, Liu G, et al. Ceritinib versus chemotherapy in patients with ALK-rearranged non-small-cell lung cancer previously given chemotherapy and crizotinib (ASCEND-5): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology 2017; 18:874–886.

[57] Lim SM, Kim HR, Lee J-S, Lee KH, Lee Y-G, Min YJ, et al. Open-Label, Multicenter, Phase II Study of Ceritinib in Patients With Non–Small-Cell Lung Cancer Harboring ROS1 Rearrangement. JCO 2017; 35:2613–2618.

Crizotinib continu. [49] [58]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Crizotinib	Orale	250.0 mg	2x /j Per os en continu 1h avant le repas ou 2h après avec un grand verre d'eau

[49] S P, Dr C, At S, S G, Js A, Dw K, et al. Alectinib versus Crizotinib in Untreated ALK-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. The New England Journal of Medicine 2017; 377.

[58] Solomon BJ, Mok T, Kim D-W, Wu Y-L, Nakagawa K, Mekhail T, et al. First-line crizotinib versus chemotherapy in ALK-positive lung cancer. N Engl J Med 2014; 371:2167–2177.

Lorlatinib continu. [59] [60] [61]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Lorlatinib	Orale	100.0 mg	1x /j Per os en continu

[59] Shaw AT, Bauer TM, De Marinis F, Felip E, Goto Y, Liu G, et al. First-Line Lorlatinib or Crizotinib in Advanced ALK -Positive Lung Cancer. N Engl J Med 2020; 383:2018–2029.

[60] Solomon BJ, Besse B, Bauer TM, Felip E, Soo RA, Camidge DR, et al. Lorlatinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. The Lancet Oncology 2018; 19:1654–1667.

[61] Shaw AT, Solomon BJ, Chiari R, Riely GJ, Besse B, Soo RA, et al. Lorlatinib in advanced ROS1-positive non-small-cell lung cancer: a multicentre, open-label, single-arm, phase 1–2 trial. The Lancet Oncology 2019; 20:1691–1701.

Entrectinib continu. [62] [63]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Entrectinib	Orale	600.0 mg	1x /j Per os en continu

[62] Demetri GD, De Braud F, Drilon A, Siena S, Patel MR, Cho BC, et al. Updated Integrated Analysis of the Efficacy and Safety of Entrectinib in Patients With NTRK Fusion-Positive Solid Tumors. Clinical Cancer Research 2022; 28:1302–1312.

[63] Dziadziuszko R, Krebs MG, De Braud F, Siena S, Drilon A, Doebele RC, et al. Updated Integrated Analysis of the Efficacy and Safety of Entrectinib in Locally Advanced or Metastatic ROS1 Fusion–Positive Non–Small-Cell Lung Cancer. JCO 2021; 39:1253–12

Repotrectinib continu. [64]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Repotrectinib	Orale	160.0 mg	1x /j Per os pendant 14 jours puis x2 /j en continu

[64] Yun MR, Kim DH, Kim S-Y, Joo H-S, Lee YW, Choi HM, et al. Repotrectinib Exhibits Potent Antitumor Activity in Treatment-Naïve and Solvent-Front–Mutant ROS1-Rearranged Non–Small Cell Lung Cancer. Clinical Cancer Research 2020; 26:3287–3295.

Dabrafenib continu. [65]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Dabrafenib	Orale	300.0 mg	2x 150 mg /j per os en continu

[65] Planchard D, Kim TM, Mazieres J, Quoix E, Riely G, Barlesi F, et al. Dabrafenib in patients with BRAFV600E-positive advanced non-small-cell lung cancer: a single-arm, multicentre, open-label, phase 2 trial. The Lancet Oncology 2016; 17:642–650.

Dabrafenib-Trametinib continus. [66]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Dabrafenib	Orale	300.0 mg	2x 150 mg /j per os en continu
2	Thérapie Ciblée	Trametinib	Orale	2.0 mg	1x /j per os en continu

[66] Planchard D, Besse B, Groen HJM, Hashemi SMS, Mazieres J, Kim TM, et al. Phase 2 Study of Dabrafenib Plus Trametinib in Patients With BRAF V600E-Mutant Metastatic NSCLC: Updated 5-Year Survival Rates and Genomic Analysis. Journal of Thoracic Oncology 2022; 17:103–115.

Vemurafenib continu. [67] [68] [69]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Vemurafenib	Orale	960.0 mg	2x /j per os en continu

[67] Hyman DM, Puzanov I, Subbiah V, Faris JE, Chau I, Blay J-Y, et al. Vemurafenib in Multiple Nonmelanoma Cancers with BRAF V600 Mutations. N Engl J Med 2015; 373:726–736.

[68] Subbiah V, Gervais R, Riely G, Hollebecque A, Blay J-Y, Felip E, et al. Efficacy of Vemurafenib in Patients With Non–Small-Cell Lung Cancer With BRAF V600 Mutation: An Open-Label, Single-Arm Cohort of the Histology-Independent VE-BASKET Study. JCO Precision Oncology 2019:1–9.

[69] Mazieres J, Cropet C, Montané L, Barlesi F, Souquet PJ, Quantin X, et al. Vemurafenib in non-small-cell lung cancer patients with BRAFV600 and BRAFnonV600 mutations. Annals of Oncology 2020; 31:289–294.

Sotorasib continu. [70]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Sotorasib	Orale	960.0 mg	1x /j per os en continu

[70] De Langen AJ, Johnson ML, Mazieres J, Dingemans A-MC, Mountzios G, Pless M, et al. Sotorasib versus docetaxel for previously treated non-small-cell lung cancer with KRASG12C mutation: a randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet 2023; 401:733–746.

Adagrasib continu. [71]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Adagrasib	Orale	600.0 mg	2x /j per os en continu

[71] Jänne PA, Riely GJ, Gadgeel SM, Heist RS, Ou S-HI, Pacheco JM, et al. Adagrasib in Non–Small-Cell Lung Cancer Harboring a KRAS G12C Mutation. N Engl J Med 2022; 387:120–131.

Larotrectinib continu. [72]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Larotrectinib	Orale	100.0 mg	2x /j per os en continu

[72] Drilon A, Tan DSW, Lassen UN, Leyvraz S, Liu Y, Patel JD, et al. Efficacy and Safety of Larotrectinib in Patients With Tropomyosin Receptor Kinase Fusion–Positive Lung Cancers. JCO Precision Oncology 2022:e2100418.

Capmatinib continu. [73]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Capmatinib	Orale	400.0 mg	2x /j per os en continu

[73] Wolf J, Seto T, Han J-Y, Reguart N, Garon EB, Groen HJM, et al. Capmatinib in MET Exon 14–Mutated or MET -Amplified Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2020; 383:944–957.

Tepotinib continu. [74]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Tepotinib	Orale	450.0 mg	2 Cp de 225mg /j per os en continu

[74] Le X, Sakai H, Felip E, Veillon R, Garassino MC, Raskin J, et al. Tepotinib Efficacy and Safety in Patients with MET Exon 14 Skipping NSCLC: Outcomes in Patient Subgroups from the VISION Study with Relevance for Clinical Practice. Clinical Cancer Research 2022; 28:1117–1126

Selpercatinib continu. [75] [76]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Selpercatinib	Orale	160.0 mg	2x /j per os en continu

[75] Drilon A, Oxnard GR, Tan DSW, Loong HHF, Johnson M, Gainor J, et al. Efficacy of Selpercatinib in RET Fusion–Positive Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2020; 383:813–824.

[76] Subbiah V, Gainor JF, Oxnard GR, Tan DSW, Owen DH, Cho BC, et al. Intracranial Efficacy of Selpercatinib in RET Fusion-Positive Non–Small Cell Lung Cancers on the LIBRETTO-001 Trial. Clinical Cancer Research 2021; 27:4160–4167.

Pralsetinib continu. [77]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Pralsetinib	Orale	400.0 mg	1x /j per os en continu

[77] Griesinger F, Curigliano G, Thomas M, Subbiah V, Baik CS, Tan DSW, et al. Safety and efficacy of pralsetinib in RET fusion–positive non-small-cell lung cancer including as first-line therapy: update from the ARROW trial. Annals of Oncology 2022; 33:1168–1178.

Trastuzumab-deruxtecan J1=J22. [78]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	ADC	Trastuzumab Deruxtecan	Intraveineuse	6.4 mg/Kg	dans 100 ml de SG 5%

[78] Li BT, Smit EF, Goto Y, Nakagawa K, Udagawa H, Mazières J, et al. Trastuzumab Deruxtecan in HER2 -Mutant Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2022; 386:241–251.

Pembrolizumab-Cisplatine-Pemetrexed J1=J22. [79] [80]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9% en 30 min
6	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS en 1h puis rinçage SG
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h

[79] Rodríguez-Abreu D, Powell SF, Hochmair MJ, Gadgeel S, Esteban E, Felip E, et al. Pemetrexed plus platinum with or without pembrolizumab in patients with previously untreated metastatic nonsquamous NSCLC: protocol-specified final analysis from KEYNOTE-189. Annals of Oncology 2021; 32:881–895.
[80] Gandhi L, Rodríguez-Abreu D, Gadgeel S, Esteban E, Felip E, De Angelis F, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2018; 378:2078–2092.

Pembrolizumab-Carboplatine-Pemetrexed J1=J22. [79] [80]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9% en 30 min
4	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[79] Rodríguez-Abreu D, Powell SF, Hochmair MJ, Gadgeel S, Esteban E, Felip E, et al. Pemetrexed plus platinum with or without pembrolizumab in patients with previously untreated metastatic nonsquamous NSCLC: protocol-specified final analysis from KEYNOTE-189. Annals of Oncology 2021; 32:881–895.

[80] Gandhi L, Rodríguez-Abreu D, Gadgeel S, Esteban E, Felip E, De Angelis F, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2018; 378:2078–2092

Pembrolizumab-Carboplatine-Paclitaxel J1= J22. [81] [82]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9% en 30 min
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 3h puis rinçage SG
7	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 250 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[81] Paz-Ares L, Vicente D, Tafreshi A, Robinson A, Soto Parra H, Mazières J, et al. A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Pembrolizumab Plus Chemotherapy in Patients With Metastatic Squamous NSCLC: Protocol-Specified Final Analysis of KEYNOTE-407. Journal of Thoracic Oncology 2020; 15:1657–1669.

[82] Paz-Ares L, Luft A, Vicente D, Tafreshi A, Gümüş M, Mazières J, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2018; 379:2040–2051.

Pembrolizumab-Carboplatine-Nab-Paclitaxel J1= J22. [81] [82]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Nab-Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9% en 30 min
6	Chimiothérapie	Nab-Paclitaxel	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage
7	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 6.0	Dans 250 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Nab-Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Nab-Paclitaxel	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage
Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J15					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H2	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Nab-Paclitaxel

3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Nab-Paclitaxel	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage

[81] Paz-Ares L, Vicente D, Tafreshi A, Robinson A, Soto Parra H, Mazières J, et al. A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Pembrolizumab Plus Chemotherapy in Patients With Metastatic Squamous NSCLC: Protocol-Specified Final Analysis of KEYNOTE-407. Journal of Thoracic Oncology 2020; 15:1657–1669.

[82] Paz-Ares L, Luft A, Vicente D, Tafreshi A, Gümüş M, Mazières J, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2018; 379:2040–2051.

Atezolizumab-Carboplatine-Paclitaxel-Bevacizumab J1= J22. [83]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Atezolizumab	Intraveineuse	1200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9% en 1h
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 3h puis rinçage SG
7	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 250 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
8	Thérapie Ciblée	Bevacizumab	Intraveineuse	7.5 mg/ KG	Dans 500 ml SS en 90 min C1 puis 60 min > C1 puis rinçage TA et BU avant, TA après Bevacizumab

[83] Socinski MA, Nishio M, Jotte RM, Cappuzzo F, Orlandi F, Stroyakovskiy D, et al. IMpower150 Final Overall Survival Analyses for Atezolizumab Plus Bevacizumab and Chemotherapy in First-Line Metastatic Nonsquamous NSCLC. Journal of Thoracic Oncology 2021; 16:1909–1924.

Atezolizumab-Carboplatine-Nab-Paclitaxel J1= J22. [84]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Nab-Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Atezolizumab	Intraveineuse	1200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9% en 1h
6	Chimiothérapie	Nab-Paclitaxel	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage
7	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 6.0	Dans 250 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
J8					
Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H0	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Nab-Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Nab-Paclitaxel	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage

J15

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Nab-Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Nab-Paclitaxel	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage

[84] West H, McCleod M, Hussein M, Morabito A, Rittmeyer A, Conter HJ, et al. Atezolizumab in combination with carboplatin plus nab-paclitaxel chemotherapy compared with chemotherapy alone as first-line treatment for metastatic non-squamous non-small-cell lung cancer (IMpower130): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology 2019; 20:924–937.

Cemiplimab-Cisplatine-Pemetrexed J1= J22. [85]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Cemiplimab	Intraveineuse	350.0 mg	Dans SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS en 1h puis rinçage SG
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h

[85] Gogishvili M, Melkadze T, Makharadze T, Giorgadze D, Dvorkin M, Penkov K, et al. Cemiplimab plus chemotherapy versus chemotherapy alone in non-small cell lung cancer: a randomized, controlled, double-blind phase 3 trial. Nat Med 2022; 28:2374–2380.

Cemiplimab-Carboplatine-Pemetrexed J1= J22. [85]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Immunothérapie	Cemiplimab	Intraveineuse	350.0 mg	Dans SS 0,9%

4	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[85] Gogishvili M, Melkadze T, Makharadze T, Giorgadze D, Dvorkin M, Penkov K, et al. Cemiplimab plus chemotherapy versus chemotherapy alone in non-small cell lung cancer: a randomized, controlled, double-blind phase 3 trial. Nat Med 2022; 28:2374–2380.

Cemiplimab-Carboplatine-Paclitaxel J1=J22. [85]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Cemiplimab	Intraveineuse	350.0 mg	Dans SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 3h puis rinçage SG
7	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 250 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[85] Gogishvili M, Melkadze T, Makharadze T, Giorgadze D, Dvorkin M, Penkov K, et al. Cemiplimab plus chemotherapy versus chemotherapy alone in non-small cell lung cancer: a randomized, controlled, double-blind phase 3 trial. Nat Med 2022; 28:2374–2380.

Cemiplimab-Cisplatine-Paclitaxel J1=J22. [85]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	5.0 mg	Un Cp 4h avant chimiothérapie
2	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
3	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
6	Immunothérapie	Cemiplimab	Intraveineuse	350.0 mg	Dans SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	Dans 500 ml SS en 3h puis rinçage SG
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h

[85] Gogishvili M, Melkadze T, Makharadze T, Giorgadze D, Dvorkin M, Penkov K, et al. Cemiplimab plus chemotherapy versus chemotherapy alone in non-small cell lung cancer: a randomized, controlled, double-blind phase 3 trial. Nat Med 2022; 28:2374–2380.

Nivolumab-Ipilimumab-Cisplatine-Pemetrexed J1= J43. [86]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

5	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	360 mg	Dans SS 0,9%
6	Immunothérapie	Ipilimumab	Intraveineuse	1 mg/Kg	
7	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS en 1h puis rinçage SG
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J22					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	360 mg	Dans SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS en 1h puis rinçage SG
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h

[86] Reck M, Ciuleanu T-E, Cobo M, Schenker M, Zurawski B, Menezes J, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab with two cycles of chemotherapy versus chemotherapy alone (four cycles) in advanced non-small-cell lung cancer: CheckMate 9LA 2-year update. ESMO Open 2021; 6:100273.

Nivolumab-Ipilimumab-Carboplatine-Pemetrexed J1= J43. [86]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	360 mg	Dans SS 0,9%
4	Immunothérapie	Ipilimumab	Intraveineuse	1 mg/ Kg	
5	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	360 mg	Dans SS 0,9%
4	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[86] Reck M, Ciuleanu T-E, Cobo M, Schenker M, Zurawski B, Menezes J, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab with two cycles of chemotherapy versus chemotherapy alone (four cycles) in advanced non-small-cell lung cancer: CheckMate 9LA 2-year update. ESMO Open 2021; 6:100273.

Nivolumab-Ipilimumab-Carboplatine-Paclitaxel J1= J43. [86]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	360 mg	Dans SS 0,9%
6	Immunothérapie	Ipilimumab	Intraveineuse	1 mg/Kg	
7	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 3h puis rinçage SG
8	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 250 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J22					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

5	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	360 mg	Dans SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 3h puis rinçage SG
7	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 250 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[86] Reck M, Ciuleanu T-E, Cobo M, Schenker M, Zurawski B, Menezes J, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab with two cycles of chemotherapy versus chemotherapy alone (four cycles) in advanced non-small-cell lung cancer: CheckMate 9LA 2-year update. ESMO Open 2021; 6:100273.

Durvalumab-Tremelimumab-Carboplatine-Nab-Paclitaxel J1= J22. [87]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Nab-Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Tremelimumab	Intraveineuse	75.0 mg	Dans SS 0,9%
6	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500 mg	Dans SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Nab-Paclitaxel	Intraveineuse	100.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage
8	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 6.0	Dans 250 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
J8					
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Nab-Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Nab-Paclitaxel	Intraveineuse	100.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage

J15					
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Nab-Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Nab-Paclitaxel	Intraveineuse	100.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage

[87] Johnson ML, Cho BC, Luft A, Alatorre-Alexander J, Geater SL, Laktionov K, et al. Durvalumab With or Without Tremelimumab in Combination With Chemotherapy as First-Line Therapy for Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer: The Phase III POSEIDON Study. JCO 2023; 41:1213–1227.

Durvalumab-Tremelimumab-Cisplatine-Pemetrexed J1= J22. [87]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Tremelimumab	Intraveineuse	75.0 mg	Dans SS 0.9%
6	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500 mg	Dans SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/M2	Dans 500 ml SS en 1h puis rinçage SG
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h

[87] Johnson ML, Cho BC, Luft A, Alatorre-Alexander J, Geater SL, Laktionov K, et al. Durvalumab With or Without Tremelimumab in Combination With Chemotherapy as First-Line Therapy for Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer: The Phase III POSEIDON Study. JCO 2023; 41:1213–1227.

Durvalumab-Tremelimumab-Carboplatine-Pemetrexed J1= J22. [87]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Immunothérapie	Tremelimumab	Intraveineuse	75.0 mg	Dans SS 0.9%
4	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500 mg	Dans SS 0,9%
5	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage

[87] Johnson ML, Cho BC, Luft A, Alatorre-Alexander J, Geater SL, Laktionov K, et al. Durvalumab With or Without Tremelimumab in Combination With Chemotherapy as First-Line Therapy for Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer: The Phase III POSEIDON Study. JCO 2023; 41:1213–1227.

Durvalumab-Tremelimumab-Cisplatine-Gemcitabine J1= J22. [87]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

5	Immunothérapie	Tremelimumab	Intraveineuse	75.0 mg	Dans SS 0.9%
6	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500 mg	Dans SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 500 ml SS ou SG en 30 min puis rinçage
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 500 ml SS ou SG en 30 min puis rinçage

[87] Johnson ML, Cho BC, Luft A, Alatorre-Alexander J, Geater SL, Laktionov K, et al. Durvalumab With or Without Tremelimumab in Combination With Chemotherapy as First-Line Therapy for Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer: The Phase III POSEIDON Study. JCO 2023; 41:1213–1227.

Durvalumab-Tremelimumab-Carboplatine-Gemcitabine J1= J22. [87]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	10.0 mg	Un Cp 4h avant Paclitaxel

3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Tremelimumab	Intraveineuse	75.0 mg	Dans SS 0.9%
6	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500 mg	Dans SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 100 ml SS 0.9% en 30 min
8	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 1h puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000.0 mg/M2	Dans 100 ml SS ou SG en 30 min

[87] Johnson ML, Cho BC, Luft A, Alatorre-Alexander J, Geater SL, Laktionov K, et al. Durvalumab With or Without Tremelimumab in Combination With Chemotherapy as First-Line Therapy for Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer: The Phase III POSEIDON Study. JCO 2023; 41:1213–1227.

Pembrolizumab J1= J22. [88] [89] [90]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9% en 30 min

[88] Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson AG, Hui R, Csőszi T, Fülöp A, et al. Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2016; 375:1823–1833.

[89] Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson AG, Hui R, Csőszi T, Fülöp A, et al. Updated Analysis of KEYNOTE-024: Pembrolizumab Versus Platinum-Based Chemotherapy for Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer With PD-L1 Tumor Proportion Score of 50% or Greater. J Clin Oncol 2019; 37:537–546.

[90] Herbst RS, Baas P, Kim D-W, Felip E, Pérez-Gracia JL, Han J-Y, et al. Pembrolizumab versus docetaxel for previously treated, PD-L1-positive, advanced non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-010): a randomised controlled trial. Lancet 2016; 387:1540–1550.

Atezolizumab J1= J22. [91] [92] [93]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Atezolizumab	Intraveineuse	1200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9% en 1h

[91] Herbst RS, Giaccone G, de Marinis F, Reinmuth N, Vergnenegre A, Barrios CH, et al. Atezolizumab for First-Line Treatment of PD-L1-Selected Patients with NSCLC. N Engl J Med 2020; 383:1328–1339.

[92] Spigel D, de Marinis F, Giaccone G, Reinmuth N, Vergnenegre A, Barrios CH, et al. LBA78 - IMpower110: Interim overall survival (OS) analysis of a phase III study of atezolizumab (atezo) vs platinum-based chemotherapy (chemo) as first-line (1L) treatment (tx) in PD-L1–selected NSCLC. Annals of Oncology 2019; 30:v915.

[93] Rittmeyer A, Barlesi F, Waterkamp D, Park K, Ciardiello F, von Pawel J, et al. Atezolizumab versus docetaxel in patients with previously treated non-small-cell lung cancer (OAK): a phase 3, open-label, multicentre randomised controlled trial. Lancet 2017; 389:255–265.

Cemiplimab J1= J22. [94]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Cemiplimab	Intraveineuse	350.0 mg	Dans SS 0,9%

[94] Sezer A, Kilickap S, Gümüş M, Bondarenko I, Özgüroğlu M, Gogishvili M, et al. Cemiplimab monotherapy for first-line treatment of advanced non-small-cell lung cancer with PD-L1 of at least 50%: a multicentre, open-label, global, phase 3, randomised, controlled trial. The Lancet 2021; 397:592–604.

Nivolumab J1= J15. [95] [96] [97] [98] [99]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	3.0 mg/ Kg	Dans SS 0,9%

[95] Carbone DP, Reck M, Paz-Ares L, Creelan B, Horn L, Steins M, et al. First-Line Nivolumab in Stage IV or Recurrent Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2017; 376:2415–2426.

[96] Borghaei H, Paz-Ares L, Horn L, Spigel DR, Steins M, Ready NE, et al. Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Non-squamous Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2015; 373:1627–1639.

[97] Brahmer J, Reckamp KL, Baas P, Crinò L, Eberhardt WEE, Poddubskaya E, et al. Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Squamous-Cell Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2015; 373:123–135.

[98] Borghaei H, Gettinger S, Vokes EE, Chow LQM, Burgio MA, De Castro Carpeno J, et al. Five-Year Outcomes From the Randomized, Phase III Trials CheckMate 017 and 057: Nivolumab Versus Docetaxel in Previously Treated Non–Small-Cell Lung Cancer. JCO 2021; 39:723–733.

[99] Spigel DR, McCleod M, Jotte RM, Einhorn L, Horn L, Waterhouse DM, et al. Safety, Efficacy, and Patient-Reported Health-Related Quality of Life and Symptom Burden with Nivolumab in Patients with Advanced Non–Small Cell Lung Cancer, Including Patients Aged 70 Years or Older or with Poor Performance Status (CheckMate 153). Journal of Thoracic Oncology 2019; 14:1628–1639.

Durvalumab-Tremelimumab J1= J22. [87]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Tremelimumab	Intraveineuse	75.0 mg	Dans SS 0.9%
2	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500 mg	Dans SS 0,9%

[87] Johnson ML, Cho BC, Luft A, Alatorre-Alexander J, Geater SL, Laktionov K, et al. Durvalumab With or Without Tremelimumab in Combination With Chemotherapy as First-Line Therapy for Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer: The Phase III POSEIDON Study. JCO 2023; 41:1213–1227.

Nivolumab-Ipilimumab J1= J43. [100] [101] [86]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	360 mg	Dans SS 0,9%
2	Immunothérapie	Ipilimumab	Intraveineuse	1 mg/Kg	Dans SS 0,9%
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J22					
1	Immunothérapie	Nivolumab	Intraveineuse	360 mg	Dans SS 0,9%

[100] Paz-Ares L, Ciuleanu T-E, Cobo M, Schenker M, Zurawski B, Menezes J, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab combined with two cycles of chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer (CheckMate 9LA): an international, randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology 2021; 22:198–211.

[101] Paz-Ares LG, Ramalingam SS, Ciuleanu T-E, Lee J-S, Urban L, Caro RB, et al. First-Line Nivolumab Plus Ipilimumab in Advanced NSCLC: 4-Year Outcomes From the Randomized, Open-Label, Phase 3 CheckMate 227 Part 1 Trial. Journal of Thoracic Oncology 2022; 17:289–308.

[86] Reck M, Ciuleanu T-E, Cobo M, Schenker M, Zurawski B, Menezes J, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab with two cycles of chemotherapy versus chemotherapy alone (four cycles) in advanced non-small-cell lung cancer: CheckMate 9LA 2-year update. ESMO Open 2021; 6:100273.