B - LES CANCERS PULMONAIRES À PETITES CELLULES

I- Stades Limités

RCC avec Etoposide-Cisplatine J1 à J3 J1=J22. [1] [2] [3] [4]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% 1L en 3h ou SG 5% 1L + 4gNacl et 2gKcl en 3h
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J3					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage

[1] Sun J-M, Ahn YC, Choi EK, Ahn M-J, Ahn JS, Lee S-H, et al. Phase III trial of concurrent thoracic radiotherapy with either first- or third-cycle chemotherapy for limited-disease small-cell lung cancer. Ann Oncol 2013; 24:2088–2092.

[2] Karam I, Jiang SY, Khaira M, Lee CW, Schellenberg D. Outcomes of Small Cell Lung Cancer Patients Treated With Cisplatin-Etoposide Versus Carboplatin-Etoposide. American Journal of Clinical Oncology 2015; 38:51–54.

[3] Pujol JL, Carestial, Daures JP. Is the case for cisplatin in the treatment of small cell lung cancer ?A meta analysis of randomized trials of a cisplatin containing regimen versus a regimen without thid alkylatoing agent. Br J cancer .2000; 83:8-15.

[4] Paesmans M, Mascaux C, Berghmans T, et al; Etoposide and cisplatin merit their key role in chemotherapy for small cell lung cancer : a meta analysis with a methodology assessment by the European lung cancer working party.Proc Am Soc Clin Oncol 1999;18:A1830.

RCC avec Etoposide-Cisplatine J1 à J5 J1=J29. [1] [2] [3] [4]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

5	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% 1L en 3h ou SG 5% 1L + 4gNacl et 2gKcl en 3h
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J4					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J5					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage

[1] Sun J-M, Ahn YC, Choi EK, Ahn M-J, Ahn JS, Lee S-H, et al. Phase III trial of concurrent thoracic radiotherapy with either first- or third-cycle chemotherapy for limited-disease small-cell lung cancer. Ann Oncol 2013; 24:2088–2092.

[2] Karam I, Jiang SY, Khaira M, Lee CW, Schellenberg D. Outcomes of Small Cell Lung Cancer Patients Treated With Cisplatin-Etoposide Versus Carboplatin-Etoposide. American Journal of Clinical Oncology 2015; 38:51–54.

[3] Pujol JL, Carestial, Daures JP. Is the case for cisplatin in the treatment of small cell lung cancer ?A meta analysis of randomized trials of a cisplatin containing regimen versus a regimen without thid alkylatoing agent. Br J cancer .2000; 83:8-15.

[4] Paesmans M, Mascaux C, Berghmans T, et al; Etoposide and cisplatin merit their key role in chemotherapy for small cell lung cancer : a meta analysis with a methodology assessment by the European lung cancer working party.Proc Am Soc Clin Oncol 1999;18:A1830.

RCC avec Etoposide-Carboplatine J1 à J5 J1=J29. [102][2]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage
4	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J4					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J5					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage

[2] Karam I, Jiang SY, Khaira M, Lee CW, Schellenberg D. Outcomes of Small Cell Lung Cancer Patients Treated With Cisplatin-Etoposide Versus Carboplatin-Etoposide. American Journal of Clinical Oncology 2015; 38:51–54.

RCC avec Etoposide-Carboplatine J1 à J3 J1=J22. [2]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage
4	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	50.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage

[2] Karam I, Jiang SY, Khaira M, Lee CW, Schellenberg D. Outcomes of Small Cell Lung Cancer Patients Treated With Cisplatin-Etoposide Versus Carboplatin-Etoposide. American Journal of Clinical Oncology 2015; 38:51–54.

Durvalumab consolidation apres RCC J1=J29. [5] [6]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500mg	Dans SS 0,9%

[5] Byers L, et al. Durvalumab with or without tremelimumab as consolidation therapy for limited-stage small-cell lung cancer (ADRIATIC): a phase III randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet Oncology.25(5). 567-577.

[6] Cheng Y, Spigel D, Cho BC,et al. Durvalumab after chemoradiotherapy in limited stage small cell lung cancer . N Engl J Med 2024; 39; 1313-1327.

II - Stades disséminés

Etoposide-Cisplatine J1 à J3 J1=J22. [3]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% 1L en 3h ou SG 5% 1L + 4gNacl et 2gKcl en 3h
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J3					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage

[3] Pujol JL, Carestia L, Daurès JP. Is there a case for cisplatin in the treatment of small-cell lung cancer? A meta-analysis of randomized trials of a cisplatin-containing regimen versus a regimen without this alkylating agent. Br J Cancer 2000; 83:8–15.

Etoposide - Carboplatine J1 à J3 J1=J22. [7] [2]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
4	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage
Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage

[7] Okamoto H, Watanabe K, Nishiwaki Y, Mori K, Kurita Y, Hayashi I, et al. Phase II study of area under the plasma-concentration-versus-time curve-based carboplatin plus standard-dose intravenous etoposide in elderly patients with small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1999; 17:3540–3545.

[2] Karam I, Jiang SY, Khaira M, Lee CW, Schellenberg D. Outcomes of Small Cell Lung Cancer Patients Treated With Cisplatin-Etoposide Versus Carboplatin-Etoposide. American Journal of Clinical Oncology 2015; 38:51–54.

Cisplatine-Irinotecan J1, J8 ; J1=J22. [8] [9] [10]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	5.0 mg	Un Cp 4h avant chimiothérapie
2	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
3	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	65.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en Y de l'acide folinique
7	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	400.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en Y de l'Irinotécan

8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	30.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	5.0 mg	Un Cp 4h avant chimiothérapie
2	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
3	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	65.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en Y de l'acide folinique
7	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	400.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en Y de l'Irinotécan
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	30.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl en 3h

[8] Noda K, Nishiwaki Y, Kawahara M, Negoro S, Sugiura T, Yokoyama A, et al. Irinotecan plus Cisplatin Compared with Etoposide plus Cisplatin for Extensive Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2002; 346:85–91.

[9]Hanna N, Bunn PA, Langer C, Einhorn L, Guthrie T, Beck T, et al. Randomized Phase III Trial Comparing Irinotecan/ Cisplatin With Etoposide/Cisplatin in Patients With Previously Untreated Extensive-Stage Disease Small-Cell Lung Cancer. JCO 2006; 24:2038–2043.

[10] Liu Z-L, Wang B, Liu J-Z, Liu W-W. Irinotecan plus cisplatin compared with etoposide plus cisplatin in patients with previously untreated extensive-stage small cell lung cancer: A meta-analysis. J Can Res Ther 2018; 14:1076.

CAV = Cyclophosphamide-Doxorubicine-Vincristine J1=J22. [11]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	Intraveineuse	800.0 mg/ M2	Dans 250 ml SG en 1h puis rinçage SG (J1)
4	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	50.0 mg/ M2	Dans 250 ml SG en 30 mn puis rinçage (J1)
5	Chimiothérapie	Vincristine	Intraveineuse	1.4 mg/ M2	Dans 500 ml de SS en 10 mn

[11] Von Pawel J, Schiller JH, Shepherd FA, Fields SZ, Kleisbauer JP, Chrysson NG, et al. Topotecan versus cyclophosphamide, doxorubicin, and vincristine for the treatment of recurrent small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1999; 17:658–667.

Paclitaxel J1=J8. [12] [13]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	5.0 mg	Un Cp 4h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	80.0 mg/ M2	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h

[12] Smit E, Fokkema E, Biesma B, Groen H, Snoek W, Postmus P. A phase II study of paclitaxel in heavily pretreated patients with small-cell lung cancer. Br J Cancer 1998; 77:347–351.

[13] Yamamoto N, Tsurutani J, Yoshimura N, Asai G, Moriyama A, Nakagawa K, et al. Phase II study of weekly paclitaxel for relapsed and refractory small cell lung cancer. Anticancer Res 2006; 26:777–781.

Topotecan J1 à J5 J1=J22. [14] [15] [11] [16]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Topotecan	Intraveineuse	1.5 mg/ M2	Dans 100 ml SG en 30 mn puis rinçage SG (VO possible)
Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Topotecan	Intraveineuse	1.5 mg/ M2	Dans 100 ml SG en 30 mn puis rinçage SG (VO possible)
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Topotecan	Intraveineuse	1.5 mg/ M2	Dans 100 ml SG en 30 mn puis rinçage SG (VO possible)
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**

J4					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Topotecan	Intraveineuse	1.5 mg/ M2	Dans 100 ml SG en 30 mn puis rinçage SG (VO possible)
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J5					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Topotecan	Intraveineuse	1.5 mg/ M2	Dans 100 ml SG en 30 mn puis rinçage SG (VO possible)

[14] Schiller JH, Kim K, Hutson P, DeVore R, Glick J, Stewart J, et al. Phase II study of topotecan in patients with extensive-stage small-cell carcinoma of the lung: an Eastern Cooperative Oncology Group Trial. J Clin Oncol 1996; 14:2345–2352.

[15] Blaise N, Monnet I, Greillier L, et al. Carboplatin plus etoposide versus topotecan as second line treatment for patients with sensitive relapse small cell lung cancer : an open label , multicentre, randomized, phase III trial/ Lancet Oncol 2020;21:1224-1233.

[11] Von Pawel J, Schiller JH, Shepherd FA, et al. Topotecan versus cyclophophamide, doxorubicin, and vincristine for the treatment of recurrent small cell lung cancer . J Clin Oncol 1999; 17:658-667.

[16] O'Brien ME, Ciuleanu TE, Tsekov H, et al. Phase III trial comparing supportive care alone with supportive care with oral topotecan in patients with relapse small cell lung cancer J Clin Oncol 2006; 24:5441-5447.

Topotecan J1=J8. [14] [15] [11] [16]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Topotecan	Intraveineuse	4.0 mg/ M2	Dans 250 ml SG en 30 mn puis rinçage

[14] Schiller JH, Kim K, Hutson P, DeVore R, Glick J, Stewart J, et al. Phase II study of topotecan in patients with extensive-stage small-cell carcinoma of the lung: an Eastern Cooperative Oncology Group Trial. J Clin Oncol 1996; 14:2345–2352.

[15] Blaise N, Monnet I, Greillier L, et al. Carboplatin plus etoposide versus topotecan as second line treatment for patients with sensitive relapse small cell lung cancer : an open label , multicentre, randomized, phase III trial/ Lancet Oncol 2020;21:1224-1233.

[11] Von Pawel J, Schiller JH, Shepherd FA, et al. Topotecan versus cyclophophamide, doxorubicin, and vincristine for the treatment of recurrent small cell lung cancer . J Clin Oncol 1999; 17:658-667.

[16] O'Brien ME, Ciuleanu TE, Tsekov H, et al. Phase III trial comparing supportive care alone with supportive care with oral topotecan in patients with relapse small cell lung cancer J Clin Oncol 2006; 24:5441-5447.

Lurbinectedine J1=J22. [17] [18]

Ordre	Type	Produit/ Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie Ciblée	Lurbinectedine	Intraveineuse	3.2 mg/ m2	En 60 min

[17] Trigo J, Subbiah V, Besse B, Moreno V, López R, Sala MA, et al. Lurbinectedin as second-line treatment for patients with small-cell lung cancer: a single-arm, open-label, phase 2 basket trial. The Lancet Oncology 2020; 21:645–654.

[18] Subbiah V, Paz Ares L, Besse B, et al. Antitumor activity of lurbinectedin in second line small cell lung cancer patients who are candidates for rechallenge with the first line treatment. Lung cancer 2020; 150: 90-96.

Temozolomide J1=J29. [19] [20]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Chimiothérapie	Temozolomide	Orale	200.0 mg/M2	1x /j pendant 5 jours

[19] Pietanza MC, Kadota K, Huberman K, Sima CS, Fiore JJ, Sumner DK, et al. Phase II Trial of Temozolomide in Patients with Relapsed Sensitive or Refractory Small Cell Lung Cancer, with Assessment of Methylguanine-DNA Methyltransferase as a Potential Biomarker. Clinical Cancer Research 2012; 18:1138–1145.

[20] Zauderer MG, Drilon A, Kadota K, Huberman K, Sima CS, Bergagnini I, et al. Trial of a 5-day dosing regimen of temozolomide in patients with relapsed small cell lung cancers with assessment of methylguanine-DNA methyltransferase. Lung Cancer 2014; 86:237–240.

Atezolizumab-Carboplatine-Etoposide J1 à J3 J1=J22. [21]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Immunothérapie	Atezolizumab	Intraveineuse	1200.0 mg	Dans 250 ml SS 0,9% en 1h
4	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
5	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M3	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage

[21] Liu SV, Reck M, Mansfield AS, Mok T, Scherpereel A, Reinmuth N, et al. Updated Overall Survival and PD-L1 Subgroup Analysis of Patients With Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer Treated With Atezolizumab, Carboplatin, and Etoposide (IMpower133). JCO 2021; 39:619–630.

Durvalumab-Carboplatine-Etoposide J1 à J3 J1=J22. [22] [23] [24]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	Orale	5.0 mg	Un Cp 4h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Omeprazole	Orale	20.0 mg	Un Cp le jour de la chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500 mg	Dans SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage

[22] Paz-Ares L, Dvorkin M, Chen Y, Reinmuth N, Hotta K, Trukhin D, et al. Durvalumab plus platinum–etoposide versus platinum–etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet 2019; 394:1929–1939.

[23] Goldman JW, Dvorkin M, Chen Y, Reinmuth N, Hotta K, Trukhin D, et al. Durvalumab, with or without tremelimumab, plus platinum–etoposide versus platinum–etoposide alone in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): updated results from a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology 2021; 22:51–65.

[24] Goldman JW, Garassino MC, Chen Y, Özgüroğlu M, Dvorkin M, Trukhin D, et al. Patient-reported outcomes with first-line durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomized, controlled, open-label, phase III study. Lung Cancer 2020; 149:46–52.

Durvalumab-Etoposide-Cisplatine J1 à J3 J1=J22. [22] [23] [24]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie

3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500 mg	Dans SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% 1L en 3h ou SG 5% 1L + 4gNacl et 2gKcl en 3h
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage

[22] Paz-Ares L, Dvorkin M, Chen Y, Reinmuth N, Hotta K, Trukhin D, et al. Durvalumab plus platinum–etoposide versus platinum–etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet 2019; 394:1929–1939.

[23] Goldman JW, Dvorkin M, Chen Y, Reinmuth N, Hotta K, Trukhin D, et al. Durvalumab, with or without tremelimum-ab, plus platinum–etoposide versus platinum–etoposide alone in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung

cancer (CASPIAN): updated results from a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology 2021; 22:51–65.

[24] Goldman JW, Garassino MC, Chen Y, Özgüroğlu M, Dvorkin M, Trukhin D, et al. Patient-reported outcomes with first-line durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomized, controlled, open-label, phase III study. Lung Cancer 2020; 149:46–52.

Durvalumab-Tremelimumab-Etoposide-Cisplatine J1 à J3 J1=J22. [22] [23] [24]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% + 4gNacl et 2gKcl
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Immunothérapie	Tremelimumab	Intraveineuse	75.0 mg	Dans SS 0,9%
6	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500 mg	Dans SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SS 0,9% en 1h puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% 1L en 3h ou SG 5% 1L + 4gNacl et 2gKcl en 3h
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie

2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage

[22] Paz-Ares L, Dvorkin M, Chen Y, Reinmuth N, Hotta K, Trukhin D, et al. Durvalumab plus platinum–etoposide versus platinum–etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet 2019; 394:1929–1939.

[23] Goldman JW, Dvorkin M, Chen Y, Reinmuth N, Hotta K, Trukhin D, et al. Durvalumab, with or without tremelimumab, plus platinum–etoposide versus platinum–etoposide alone in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): updated results from a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology 2021; 22:51–65.

[24] Goldman JW, Garassino MC, Chen Y, Özgüroğlu M, Dvorkin M, Trukhin D, et al. Patient-reported outcomes with first-line durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomized, controlled, open-label, phase III study. Lung Cancer 2020; 149:46–52.

Durvalumab-Tremelimumab-Carboplatine-Etoposide J1 à J3 J1=J22. [22] [23] [24]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Immunothérapie	Tremelimumab	Intraveineuse	75.0 mg	Dans SS 0,9%
4	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500 mg	Dans SS 0,9%
5	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 5.0	Dans 500 ml SG 5% en 30 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	Dans 500 ml de SG 5% en 1h puis rinçage

[22] Paz-Ares L, Dvorkin M, Chen Y, Reinmuth N, Hotta K, Trukhin D, et al. Durvalumab plus platinum–etoposide versus platinum–etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet 2019; 394:1929–1939.

[23] Goldman JW, Dvorkin M, Chen Y, Reinmuth N, Hotta K, Trukhin D, et al. Durvalumab, with or without tremelimumab, plus platinum–etoposide versus platinum–etoposide alone in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): updated results from a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology 2021; 22:51–65.

[24] Goldman JW, Garassino MC, Chen Y, Özgüroğlu M, Dvorkin M, Trukhin D, et al. Patient-reported outcomes with first-line durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomized, controlled, open-label, phase III study. Lung Cancer 2020; 149:46–52.

Durvalumab maintenance J1=J29. [22] [23] [24]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Durvalumab	Intraveineuse	1500mg	Dans SS 0,9%

[22] Paz-Ares L, Dvorkin M, Chen Y, Reinmuth N, Hotta K, Trukhin D, et al. Durvalumab plus platinum–etoposide versus platinum–etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet 2019; 394:1929–1939.

[23] Goldman JW, Dvorkin M, Chen Y, Reinmuth N, Hotta K, Trukhin D, et al. Durvalumab, with or without tremelimumab, plus platinum–etoposide versus platinum–etoposide alone in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): updated results from a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology 2021; 22:51–65.

[24] Goldman JW, Garassino MC, Chen Y, Özgüroğlu M, Dvorkin M, Trukhin D, et al. Patient-reported outcomes with first-line durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomized, controlled, open-label, phase III study. Lung Cancer 2020; 149:46–52.

Atezolizumab maintenance J1=J29. [21]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Atezolizumab	Intraveineuse	1200mg	Dans SS 0,9%

[21] Liu SV, Reck M, Mansfield AS, Mok T, Scherpereel A, Reinmuth N, et al. Updated Overall Survival and PD-L1 Subgroup Analysis of Patients With Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer Treated With Atezolizumab, Carboplatin, and Etoposide (IMpower133). JCO 2021; 39:619–630.