D- THYMOME- CARCINOME THYMIQUE

I- Stade Localisé résécable d'emblée:

RCC avec PE (Etoposide - Cisplatine) J1 = J21 [1]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
3	Pré-hydratation	Ondansetron	Intraveineuse	2000.0 ml	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120mg/ M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	500 ml SS 9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl)
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/ M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl)

[1] : Giaccone G, Ardizzoni A, Kirkpatrick A, et al. Cisplatin and etoposide combination chemotherapy for locally advanced or metastatic thymoma. A phase II study of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Lung Cancer Cooperative Group. J Clin Oncol 1996;14:814-820

II - Stade localement avancé potentiellement résécable:

CAP (CYCLOPHOSPHAMIDE,DOXORUBICINE,CISPLATINE) J1=J21: [2]

J1					
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	Per Os
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	Intraveineuse	500.0 mg/M2	ds 250 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage
6	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	60.0 mg/ M2	100 ml SS 9%
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	50.0 mg/ M2	500 ml SS 9%
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)

[2] : Loehrer PJ Sr, Kim K, Aisner SC, Livingston R, Einhorn LH, Johnson D, et al. Cisplatin plus doxorubicin plus cyclophosphamide in metastatic or recurrent thymoma: final results of an intergroup trial. Journal of Clinical Oncology 1994;12(6):1164-8.

III - Stade localement avancé non résécable:

RCC avec PE (Etoposide - Cisplatine) J1 = J21 [1]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	75.0 mg/M2	500 ml SS 9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/ M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl)

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl)

[1] : Giaccone G, Ardizzoni A, Kirkpatrick A, et al. Cisplatin and etoposide combination chemotherapy for locally advanced or metastatic thymoma. A phase II study of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Lung Cancer Cooperative Group. J Clin Oncol 1996;14:814-820

IV - Stade métastatique :

Thymome :

CAP (CYCLOPHOSPHAMIDE,DOXORUBICINE,CISPLATINE) J1=J21: [2]

Ordre	Type	Produit/ Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	Per Os
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylpredniso-lone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Cyclophospha-mide	Intraveineuse	500.0 mg/M2	ds 250 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage
6	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	60.0 mg/ M2	100 ml SS 9%
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	50.0 mg/ M2	500 ml SS 9%
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)

[2] : Loehrer PJ Sr, Kim K, Aisner SC, Livingston R, Einhorn LH, Johnson D, et al. Cisplatin plus doxorubicin plus cyclo-phosphamide in metastatic or recurrent thymoma: final results of an intergroup trial. Journal of Clinical Oncology 1994;12(6):1164-8.

Carcinome thymique :

Paclitaxel carboplatine (J1=J21) [3]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Anti Histaminiques H1	Orale	10 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 3 H puis rinçage
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 6	Dans 500 cc SG 5% en 30 min

[3] : Hirai F, Yamanaka T, Taguchi K, et al A multicenter phase II study of carboplatin and paclitaxel for advanced thymic carcinoma: WJOG4207L. Ann Oncol 2015;26:363-368.

Carboplatine, Paclitaxel,Ramucirumab J1=J21 [10]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Anti Histaminiques H1	Orale	10 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 3 H puis rinçage
6	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 6	Dans 500 cc SG 5% en 30 min
7	Thérapie ciblée	Ramucirumab	Intraveineuse	10 mg/kg	Dans SS 0.9 %

[10] Proto C, Ganzinelli M, Manglaviti S, et al. Efficacy and safety of ramucirumab plus carboplatin and paclitaxel in untreated metastatic thymic carcinoma: RELEVENT phase II trial (NCT03921671). Ann Oncol 2024;35:817-826.

Thymome et carcinome thymique :

ADOC (Doxorubicin Cisplatin, Vincristine, Cyclophosphamide) [6]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	Per Os
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Doxorubicin	Intraveineuse	40 mg/M2	100 ml SS 9%
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	50 mg/M2	500 ml SS 9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)

J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	Per Os
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	Per Os
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Vincristine	Intraveineuse	0.6 mg/M2	Dans 100 cc SS en 10 min puis rinçage
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	Per Os
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	Intraveineus	700 mg/M2	100 ml SS 9%

[6] Fornasiero A, Daniele O, Ghiotto C, et al. Chemotherapy for invasive thymoma. A 13-year experience. Cancer 1991;68:30-33.

Etoposide - Cisplatine J1 = J21 [1]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1 heure avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120mg/ M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	60.0 mg/M2	500 ml SS 9%
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL

6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl)
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
6	Chimiothéra-pie	Etoposide	Intraveineuse	120.0 mg/ M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rin-çage
7	Post-hydrata-tion	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl)

[1] : Giaccone G, Ardizzoni A, Kirkpatrick A, et al. Cisplatin and etoposide combination chemotherapy for locally advanced or metastatic thymoma. A phase II study of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Lung Cancer Cooperative Group. J Clin Oncol 1996;14:814-820

Etoposide, Ifosfamide, Cisplatine J1=J21 [5]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	Per Os
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	ds 250 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	500 ml SS 9%
8	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200 mg/M2	500 cc SS en 1 H puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	Per Os
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	ds 250 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage

7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	500 ml SS 9%
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200 mg/ M2	500 cc SS en 1 H puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	Per Os
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	75.0 mg/M2	ds 250 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	500 ml SS 9%
8	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200 mg/M2	500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	Per Os

3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	75.0 mg/M2	ds 250 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	500 ml SS 9%
8	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200 mg/M2	500 cc SS en 1 H puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)

[5] : Loehrer PJ Sr, Jiroutek M, Aisner S, et al. Combined etoposide, ifosfamide, and cisplatin in the treatment of patients with advanced thymoma and thymic carcinoma: an intergroup trial. Cancer 2001;91:2010-2015

CAP-GEM (Gemcitabine, Capecitabine) J1,J8 J1=J21 [4]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10 mg	IVL
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000 mg/ m2	250 cc SS 9% en 30 min puis rinçage

5	Chimiothérapie	Capecitabine	Orale	1300 mg/ M2	650 mg x 2 par jour pdt 14 J
Ordre	**Type**	**Produit/Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10 mg	IVL
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000 mg/ m2	250 cc SS 9% en 30 min puis rinçage

[4] Palmieri G, Buonerba C, Ottaviano M, et al. Capecitabine plus gemcitabine in thymic epithelial tumors: final analysis of a phase II trial. Future Oncol 2014;10:2141-2147

Pemetrexed J1= J21 [7]

Ordre	Type	Produit/ Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	Per Os
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Methylpredniso-lone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Pemetrexed	Intraveineuse	500 mg/M2	500 cc SS en 1 H puis rinçage

[7] Gbolahan OB, Porter RF, Salter JT, et al. A phase II study of pemetrexed in patients with recurrent thymoma and thymic carcinoma. J Thorac Oncol 2018;13:1940-1948.

Everolimus [8]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Everolimus	orale	10 mg	2 cp de 5 mg per os, en continu 1 h avant repas ou 2h après repas

[8] Zucali PA, De Pas TM, Palmieri G, et al. Phase II study of everolimus in patients with thymoma and thymic carcinoma previously treated with cisplatin-based chemotherapy. J Clin Oncol 2018;36:342-349.

Sunitinib [9]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Sunitinib	Orale	50 mg	per os par jour,1 h avant repas ou 2h après repas 4 semaines sur 6

[9] Thomas A, Rajan A, Berman A, et al. Sunitinib in patients with chemotherapy-refractory thymoma and thymic carcinoma: an open-label phase 2 trial. Lancet Oncol 2015;16:177-186.

Lenvatinib [11]

Ordre	Type	Produit/ Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Lenvatinib	Orale	24 mg	per os par jour,1 h avant repas ou 2h après repas

[11] Sato J, Satouchi M, Itoh S, et al. Lenvatinib in patients with advanced or metastatic thymic carcinoma (REMORA): a multicentre, phase 2 trial. Lancet Oncol 2020; 21:843-850.

Pembrolizumab J1=J21 [12]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	Intraveineuse	200 mg	Dans 250 cc de SS 0,9%

[12] Cho J, Kim HS, Ku BM, et al. Pembrolizumab for patients with refractory or relapsed thymic epithelial tumor: An open-label phase II trial. J Clin Oncol 2019;37:2162-2170

Avelumab + axitinib [13]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dosage	Observation
1	Immunothérapie	Avelumab	Intraveineuse	10 mg/ kg	Dans 250 cc de SS 0,9%
2	Thérapie ciblée	Axitinib	Orale	5 mg	per os par jour,1 h avant repas ou 2h après repas

[13]Conforti F, Zucali PA, Pala L, et al. Avelumab plus axitinib in unresectable or metastatic type B3 thymomas and thymic carcinomas (CAVEATT): a single-arm, multicentre, phase 2 trial. Lancet Oncol 2022;23:1287-1296