A- CANCERS DU REIN :

I. Stade localisé :

Pembrolizumab J1 = J21 [1]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	200 mg	Intraveineuse	IV dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes

[1] Choueiri TK, Tomczak P, Park SH, Venugopal B, Ferguson T, Chang YH, Hajek J, Symeonides SN, Lee JL, Sarwar N, ThieryVuillemin A, GrossGoupil M, Mahave M, Haas NB, Sawrycki P, Gurney H, Chevreau C, Melichar B, Kopyltsov E, Alva A, Burke JM, Doshi G, Topart D, Oudard S, Hammers H, Kitamura H, Bedke J, Perini RF, Zhang P, Imai K, WillemannRogerio J, Quinn DI, Powles T, for the KEYNOTE564 Investigators. *Adjuvant pembrolizumab after nephrectomy in renalcell carcinoma*. N Engl J Med. 2021 Aug 19; 385(8):683694. doi: 10.1056/NEJMoa210639

II. Stade avancé et métastatique :

Sunitinib [2]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Sunitinib	50.0 mg	Orale	per os par jour,1 h avant repas ou 2h après repas 4 semaines sur 6.

[2] STAEHLER, M., MOTZER, R. J., GEORGE, D. J., et al. Adjuvant sunitinib in patients with high- risk renal cell carcinoma: safety, therapy management, and patient-reported outcomes in the S-TRAC trial. Annals of Oncology, 2018, vol. 29, no 10, p. 2098-2104.

PAZOPANIB en continu [3]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Pazopanib	800.0 mg	Orale	800mg par jour en continu 1 h avant repas ou 2h après repas.

[3] MOTZER, Robert J., RUSSO, Paul, HAAS, Naomi, et al. Adjuvant pazopanib versus placebo after nephrectomy in patients with localized or locally advanced renal cell carcinoma: final overall survival analysis of the phase 3 PROTECT trial. European urology, 2021, vol. 79, no 3, p. 334-338.

EVEROLIMUS [4]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Everolimus	10.0 mg	Orale	2 cp de 5 mg per os, en continu 1 h avant repas ou 2h après repas

[4] PORTA, Camillo, CALVO, Emiliano, CLIMENT, Miguel A., et al. Efficacy and safety of everolimus in elderly patients with metastatic renal cell carcinoma: an exploratory analysis of the outcomes of elderly patients in the RECORD-1 Trial. European urology, 2012, vol. 61, no 4, p. 826-833.

SORAFENIB en continu [5]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Sorafenib	800.0 mg	Orale	cp à 200mg : 2 CP matin et 2CP soir avant le repas ou 2 h après avec un grand verre d'eau

[5] ESCUDIER, Bernard, EISEN, Tim, STADLER, Walter M., et al. Sorafenib in advanced clear-cell renal-cell carcinoma. New England Journal of Medicine, 2007, vol. 356, no 2, p. 125-134.

AXITINIB en continu [6]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Axitinib	10.0 Mg	Orale	1 cp 2x/jour per os en continu 1h avant repas ou 2h après repas

[6] MOTZER, Robert J., ESCUDIER, Bernard, TOMCZAK, Piotr, et al. Axitinib versus sorafenib as second-line treatment for advanced renal cell carcinoma: overall survival analysis and updated results from a randomised phase 3 trial. The Lancet Oncology, 2013, vol. 14, no 6, p. 552-562.

CABOZANTINIB en continu [7]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Cabozantinib	60.0 mg	Orale	1 cp de 60 mg ou 3 cp de 20 mg /jour per os en continu 1h avant repas ou 2h après repas

[7] Choueiri TK, Hessel C, Halabi S et al. Cabozantinib versus sunitinib as initial therapy for metastatic renal cell carcinoma of intermediate or poor risk (Alliance A031203 CABOSUN randomised trial): progression-free survival by independent review and overall survival update. Eur J Cancer 2018; 94: 115–125.

LENVATINIB + EVEROLIMUS J1=J28 [8]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Everolimus	5.0 mg	Orale	per os, en continu 1 h avant repas ou 2h après repas
2	Thérapie ciblée	Lenvatinib	18.0	Orale	Prendre à la même heure chaque jour, avec ou sans nourriture.

[8] Motzer R J, Hutson T E, Glen H, et al. Lenvatinib, everolimus, and the combination in patients with metastatic renal cell carcinoma: a randomised, phase 2, open-label, multicentre trial. Lancet Oncology. 2015;16(15):1473–1482.

Nivolumab + ipilimumab : Phase d'induction J1=J21 x 4 cycles [9]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Nivolumab	3 mg/kg (max :240 mg)	Intraveineuse	IV dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes
2	Immunothérapie	Ipilimumab	1 mg/kg	Intraveineuse	IV dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes

[9] Motzer RJ, Tannir NM, McDermott DF et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2018; 378(14): 1277–1290.

Nivolumab : Phase de maintenance J1=J14 [9]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Nivolumab	3 mg/kg (max :240 mg)	Intraveineuse	A commencer 21 jours apres la derniere cure d'induction : IV dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes

Motzer RJ, Tannir NM, McDermott DF et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2018; 378(14): 1277–1290.

Nivolumab : Phase de maintenance J1=J28 [9]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Nivolumab	6 mg/kg (max :480mg)	Intraveineuse	A commencer 6 semaines apres la derniere cure d'induction : IV dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes

Motzer RJ, Tannir NM, McDermott DF et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2018; 378(14): 1277–1290.

Pembrolizumab J1 = J21 - Axitinib en continu (J1=J28) [10]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	200 mg	Intraveineuse	IV dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes
2	Thérapie ciblée	Axitinib	10.0 mg	Orale	1 cp 2x/jour per os en continu 1h avant repas ou 2h après repas

[10] Rini BI, Plimack ER, Stus V, Gafanov R, Hawkins R, Nosov D, et al. Pembrolizumab plus axitinib versus sunitinib for advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med2019;380(12):1116— 27.

Pembrolizumab J1 = J21 - Lenvatinib en continu (J1=J21) [11]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	200 mg	Intraveineuse	IV dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes
2	Thérapie ciblée	Lenvatinib	20.0 mg	Orale	20 mg soit 2 cp de 10 mg ou 5 cp de 4 mg par jour

[11] Motzer R, Alekseev B, Rha SY, Porta C, Eto M, Powles T, et al. Lenvatinib plus pembrolizumab or everolimus for advanced renal cell carcinoma. N Engl J Med 2021;384(14):1289—300.

Nivolumab J1 et J15 - Cabozantinb en continu (J1=J28) [12]

Ordre	Type	Produit / protocole	Dose	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Nivolumab	240 mg	Intraveineuse	IV dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes
2	Thérapie ciblée	Cabozantinib	40.0 mg	Orale	1 cp de 40 mg ou 2 cp de 20 mg
J15					
1	Immunothérapie	Nivolumab	240 mg	Intraveineuse	IV dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes

[12]Choueiri TK, Powles T, Burotto M, Escudier B, Bourlon MT,Zurawski B, et al.Nivolumab plus cabozantinib versus sunitinib for advanced renal-cell carcinoma. N Engl JMed 2021;384(9):829—41..