B- TUMEURS GERMINALES DU TESTICULE

I. Stade localisé :

Carboplatine (1 cycle) [1]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	250ml de SS 0,9% sur 30 min
2	Pré-médication	Methylpredniso-lone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimio-thérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimio-thérapie
4	Chimiothérapie	Carboplatine	Intraveineuse	AUC 7.0	AUC 7 dans 250 cc SG en 60 min

[1] Oliver RTD, Mead GM, Rustin GJS, Joffe JK, Aass N, Coleman R, et al. Randomized trial of carboplatin versus radiotherapy for stage I seminoma:mature results on relapse and contralateral testis cancer rates in MRC TE19/EORTC 30982 study (ISRCTN27163214). J Clin Oncol 2011; 29:957–962

BEP (BLEOMYCINE-ETOPOSIDE-CISPLATINE) (1cycle) [2,3]:

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL

6	Chimiothérapie	Bleomycine	Intraveineuse	30.0 mg	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Chimiothérapie	Bleomycine	Intraveineuse	30.0 mg	dans 100 cc SS en bolus
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J15					
1	Chimiothérapie	Bleomycine	Intraveineuse	30.0 mg	dans 100 cc SS en bolus

[2] Karim S, Wei X, Leveridge MJ, Siemens DR, Robinson AG, Bedard PL, et al. Delivery of chemotherapy for testicular cancer in routine practice: A population-based study. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 2019;37:183.e17-183.e24.
[3] Alsdorf W, Seidel C, Bokemeyer C, Oing C. Current pharmacotherapy for testicular germ cell cancer. Expert Opin Pharmacother 2019; 20:837–850.

II. Stades avancés :

BEP (BLEOMYCINE-ETOPOSIDE-CISPLATINE) J1=J21. [2,3]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Bleomycine	Intraveineuse	30.0 mg	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/ M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL

6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/ M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/ M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/ M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/ M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Chimiothérapie	Bleomycine	Intraveineuse	30.0 mg	dans 100 cc SS en bolus

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J15					
1	Chimiothérapie	Bleomycine	Intraveineuse	30.0 mg	dans 100 cc SS en bolus

[2] Karim S, Wei X, Leveridge MJ, Siemens DR, Robinson AG, Bedard PL, et al. Delivery of chemotherapy for testicular cancer in routine practice: A population-based study. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 2019;37:183.e17-183.e24.
[3] Alsdorf W, Seidel C, Bokemeyer C, Oing C. Current pharmacotherapy for testicular germ cell cancer. Expert Opin Pharmacother 2019; 20:837–850.

EP (ETOPOSIDE-CISPLATINE) J1=J21. [4]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage

7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[5] McHugh DJ, Funt SA, Silber D, Knezevic A, Patil S, O'Donnell D, et al. Adjuvant Chemotherapy With Etoposide Plus Cisplatin for Patients With Pathologic StageII Nonseminomatous Germ Cell Tumors. J Clin Oncol 2020; 38:1332–1337

VIP (ETOPOSIDE-IFOSFAMIDE-CISPLATINE) J1=J21. [5]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	75.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1h
9	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage

10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	75.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1h
9	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	75.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1h
9	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	75.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1h
9	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	75.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1h
9	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
11	Soins de support	Filgrastim	Sous-cutanée	30.0 UNITE	1 injection par jour de J5 à J10

[5] Daugaard G, Skoneczna I, Aass N, De Wit R, De Santis M, Dumez H, et al. A randomized phase III study comparing standard dose BEP with sequential high-dose cisplatin, etoposide, and ifosfamide (VIP) plus stem-cell support in males with poor-prognosis germ-cell cancer. An intergroup study of EORTC, GTCSG, and Grupo Germinal (EORTC 30974). Annals of Oncology 2011; 22:1054–1061.

TIP (PACLITAXEL-IFOSFAMIDE-CISPLATINE) J1=J21. [6]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 3 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1h
9	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1h
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1h
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie

3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1h
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1h

8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
10	Soins de support	Filgrastim	Sous-cutanée	30.0 UNITE	1 injection par jour de J5 à J10

[6] Kondagunta GV, Bacik J, Donadio A, Bajorin D, Marion S, Sheinfeld J, et al. Combination of paclitaxel, ifosfamide, and cisplatin is an effective second-line therapy for patients with relapsed testicular germ cell tumors. J Clin Oncol 2005; 23:6549–6555

VeIP (VINBLASTINE-IFOSFAMIDE-CISPLATINE) J1=J21. [7]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Vinblastine	Intraveineuse	0.11 mg/KG	Dans 100 cc SS en 10 min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1h
9	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Vinblastine	Intraveineuse	0.11 mg/KG	Dans 100 cc SS en 10 min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1h
9	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1h
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1h
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1h
8	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
10	Soins de support	Filgrastim	Sous-cutanée	30.0 UNITE	1 injection par jour de J5 à J10

[7] Loehrer PJ, Lauer R, Roth BJ, Williams SD, Kalasinski LA, Einhorn LH. Salvage therapy in recurrent germ cell cancer: ifosfamide and cisplatin plus either vinblastine or etoposide. Ann Intern Med 1988; 109:540–546.

GetuG13 J1=J21. [8]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	175.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 3 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Bleomycine	Intraveineuse	30.0 mg	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
9	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
9	Soins de support	Filgrastim	Sous-cutanée	30.0 UNITE	De J6 à J7, J9, J11 à J14, J16 à J20
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Chimiothérapie	Bleomycine	Intraveineuse	30.0 mg	dans 100 cc SS en bolus
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J10					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	250ml de SS 0,9% sur 30 min

2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	130.0 mg/M2	dans 500 cc SG en 2h puis rinçage par 100 cc SG
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J15					
1	Chimiothérapie	Bleomycine	Intraveineuse	30.0 mg	dans 100 cc SS en bolus

[8] Fizazi K, Pagliaro L, Laplanche A, Fléchon A, Mardiak J, Geoffrois L, et al. Personalised chemotherapy based on tumour marker decline in poor prognosis germ-cell tumours (GETUG 13): a phase 3, multicentre, randomised trial. Lancet Oncol 2014; 15:1442–1450.

GEMOX J1=J21 [9]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10 mg	IVL
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000 mg/ m2	dans 250 cc SS 9% ou SG 5% en 30 min puis rinçage
5	Chimiothérapie	Oxaliplatine	Intraveineuse	130.0 mg/ M2	dans 500 cc SG en 2h puis rinçage par 100 cc SG

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000 mg/ m2	dans 250 cc SS 9% ou SG 5% en 30 min puis rinçage

[9] 15. Fizazi K, Gravis G, Flechon A, Geoffrois L, Chevreau C, Laguerre B, et al. Combining gemcitabine, cisplatin, and ifosfamide (GIP) is active in patients with relapsed metastatic germ-cell tumors (GCT): a prospective multicenter GETUG phase II trial. Ann Oncol 2014;25(5):987—91.

GEMCITABINE J1,J8,J15 + Paclitaxel J1,J8,J15 J1=J21 [9]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Anti Histaminiques H1	Orale	10 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000 mg/m2	dans 250 cc SS 9% ou SG 5% en 30 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	100 mg/ m2	Dans 250 cc SS 0.9% SG 5% en 60 min puis rinçage

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Prémédication	Anti Histaminiques H1	Orale	10 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000 mg/m2	dans 250 cc SS 9% ou SG 5% en 30 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	100 mg/ m2	Dans 250 cc SS 0.9% SG 5% en 60 min puis rinçage
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J15					
1	Prémédication	Anti Histaminiques H1	Orale	10 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	Intraveineuse	1000 mg/m2	dans 250 cc SS 9% ou SG 5% en 30 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	Intraveineuse	100 mg/ m2	Dans 250 cc SS 0.9% SG 5% en 60 min puis rinçage

[9] 15. Fizazi K, Gravis G, Flechon A, Geoffrois L, Chevreau C, Laguerre B, et al. Combining gemcitabine, cisplatin, and ifosfamide (GIP) is active in patients with relapsed metastatic germ-cell tumors (GCT): a prospective multicenter GETUG phase II trial. Ann Oncol 2014;25(5):987—91.