C-CANCER DE LA VESSIE

I- Stade Localisé

RCC avec 5 FLUOROURACIL- Cisplatine J1=J21(1)

Ordre	Type	Produit/Protocole	Doses	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	1 heure avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans SS 0,9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours (j1j2j3j4j5)
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2l à passer en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	1 heure avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intravei-neuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Cisplatine	80 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SS en 10 min puis rinçage
6	Post hydratation	Chlorure De Sodium	1000 ml	Intraveineuse	1l à passer en 3h

1. Zietman AL, Shipley WU, Kaufman DS, Zehr EM, Heney NM, Althausen AF, et al. A phase I/II trial of transurethral surgery combined with concurrent cisplatin, 5-fluorouracil and twice daily radiation followed by selective bladder preservation in operable patients with muscle invading bladder cancer. J Urol. nov 1998;160(5):1673-7.

MVAC dose dense J1=J15. (2)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-Médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4 g NACL et 2 g KCL)
2	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Methotrexate	30.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SS en 30 min puis rinçage
5	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
J8					
1	Pré-Médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2l à passer en 6h
2	Pré-Médication	Aprepitant	125.0 mg	Per os	1h avant chimiotérapie
3	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Vinblastine	3 mg/M2	Intraveineuse	Dans 100 cc SS en 10 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Doxorubicine	30.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 cc SS en 10 min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	70 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SS en 10 min puis rinçage
8	Post hydratation	Chlorure De Sodium	1000 ml	Intraveineuse	1l à passer en 3h
9	Soins des supports	Filgrastim	30.0 Unités	Sous cutanée	1 injection ss-cutanée par jour de j5 à j10

2. Neoadjuvant chemotherapy with dose dense MVAC is associated with improved survival after radical cystectomy compared to other cytotoxic regimens: A tertiary center experience - PubMed [Internet]. [cité 25 juill 2025]. Disponible sur: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34731219/

Gemcitabine -Cisplatine J1=J28. (3)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-Hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2l à passer en 6h
2	Pré-Médication	Aprepitant	125.0 mg	Per os	1h avant chimiotérapie
3	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 CC SS ou SG en 30 min
6	Chimiothérapie	Cisplatine	70 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SS en 10 min puis rinçage
7	Post hydratation	Chlorure De Sodium	1000 ml	Intraveineuse	1l à passer en 3h
J8					
1	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 CC SS ou SG en 30 min
J15					
1	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 CC SS ou SG en 30 min

3. Cognetti F, Ruggeri EM, Felici A, Gallucci M, Muto G, Pollera CF, et al. Adjuvant chemotherapy with cisplatin and gemcitabine versus chemotherapy at relapse in patients with muscle-invasive bladder cancer submitted to radical cystectomy: an Italian, multicenter, randomized phase III trial. Ann Oncol. mars 2012;23(3):695-700.

Gemcitabine -Cisplatine J1=J21 (4)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-Hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2l à passer en 6h
2	Pré-Médication	Aprepitant	125.0 mg	Per os	1h avant chimiotérapie
3	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimio-thérapie
4	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimio-thérapie
5	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 CC SS ou SG en 30 min
6	Chimiothérapie	Cisplatine	70 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SS en 10 min puis rinçage
7	Post hydratation	Chlorure De Sodium	1000 ml	Intraveineuse	1l à passer en 3h
J8					
1	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimio-thérapie
2	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimio-thérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 CC SS ou SG en 30 min

4. Hussain SA, Stocken DD, Riley P, Palmer DH, Peake DR, Geh JI, et al. A phase I/II study of gemcitabine and fractionated cisplatin in an outpatient setting using a 21-day schedule in patients with advanced and metastatic bladder cancer. Br J Cancer. 31 août 2004;91(5):844-9.

Gemcitabine -Cisplatine – Durvalumab J1=J21. (5)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Immunothérapie	Durvalumab	1500mg	Intraveineuse	Dans dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes, IVL 30min
2	Pré-Hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2l à passer en 6h
3	Pré-Médication	Aprepitant	125.0 mg	Per os	1h avant chimiotérapie
4	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
6	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 CC SS ou SG en 30 min
7	Chimiothérapie	Cisplatine	70 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SS en 10 min puis rinçage
8	Post hydratation	Chlorure De Sodium	1000 ml	Intraveineuse	1l à passer en 3h
J8					
1	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000 mgM2	Intraveineuse	Dans 250 CC SS ou SG en 30 min

5.Perioperative Durvalumab with Neoadjuvant Chemotherapy in Operable Bladder Cancer | New England Journal of Medicine [Internet]. [cité 25 juill 2025]. Disponible sur: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2408154

Nivolumab pdt 1 an (6)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Nivolumab	240 mg	Intraveineuse	Dans dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes, IVL 30min

6. Bajorin DF, Witjes JA, Gschwend JE, Schenker M, Valderrama BP, Tomita Y, et al. Adjuvant Nivolumab versus Placebo in Muscle-Invasive Urothelial Carcinoma. N Engl J Med. 3 juin 2021;384(22):2102-14.

Pembrolizumab J1=J21. Pdt 1 an (7)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	200 mg	Intraveineuse	Dans dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes, IVL 30min

7. Apolo AB, Ballman KV, Sonpavde G, Berg S, Kim WY, Parikh R, et al. Adjuvant Pembrolizumab versus Observation in Muscle-Invasive Urothelial Carcinoma. N Engl J Med. 2 janv 2025;392(1):45-55.

II -Stade Localement avancé ou métastatique

MVAC dose dense J1=J15. (8) (9)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-Médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4 g NACL et 2 g KCL)
2	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Methotrexate	30.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SS en 30 min puis rinçage
5	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
J8					
1	Pré-Médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2l à passer en 6h
2	Pré-Médication	Aprepitant	125.0 mg	Per os	1h avant chimio-térapie
3	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Vinblastine	3 mg/M2	Intraveineuse	Dans 100 cc SS en 10 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Doxorubicine	30.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 cc SS en 10 min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	70 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SS en 10 min puis rinçage

8	Post hydratation	Chlorure De Sodium	1000 ml	Intraveineuse	1l à passer en 3h
9	Soins des Supports	Filgrastim	30.0 Unités	Sous cutanée	1 injection ss-cutanée par jour de j5 à j10

8. Sternberg CN, de Mulder PH, Schornagel JH, Théodore C, Fossa SD, van Oosterom AT, et al. Randomized phase III trial of high-dose-intensity methotrexate, vinblastine, doxorubicin, and cisplatin (MVAC) chemotherapy and recombinant human granulocyte colony-stimulating factor versus classic MVAC in advanced urothelial tract tumors: European Organization for Research and Treatment of Cancer Protocol no. 30924. J Clin Oncol. 15 mai 2001;19(10):2638-46.

9. Sternberg CN, de Mulder P, Schornagel JH, Theodore C, Fossa SD, van Oosterom AT, et al. Seven year update of an EORTC phase III trial of high-dose intensity M-VAC chemotherapy and G-CSF versus classic M-VAC in advanced urothelial tract tumours. Eur J Cancer. janv 2006;42(1):50-4.

Gemcitabine -Carboplatine J1=J21 (10)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-Médication	Aprepitant	125.0 mg	Per os	1h avant chimiotérapie
2	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 CC SS ou SG en 30 min
5	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5	Intraveineuse	Dans 250 cc SG en 30 min puis rinçage
J8					
1	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 CC SS ou SG en 30 min

J15					
1	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	1000 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 CC SS ou SG en 30 min

10. von der Maase H, Hansen SW, Roberts JT, Dogliotti L, Oliver T, Moore MJ, et al. Gemcitabine and cisplatin versus methotrexate, vinblastine, doxorubicin, and cisplatin in advanced or metastatic bladder cancer: results of a large, randomized, multinational, multicenter, phase III study. J Clin Oncol. sept 2000;18(17):3068-77.

Paclitaxel weekly J1,J8,J15. (11)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Omeprazole	20mg	Per os	1 cp le jour de la chimio
4	Pré-médication	Anti-Histaminique	1O mg	Per os	1cp 4h avant Paclitaxel
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	80.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 500 cc SS en 60 min puis rinçage
J8					
1	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Omeprazole	20mg	Per os	1 cp le jour de la chimio
4	Pré-médication	Anti-Histaminique	1O mg	Per os	1cp 4h avant Paclitaxel

5	Pré-Médication	Paclitaxel	80.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 500 cc SS en 60 min puis rinçage
J15					
1	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Omeprazole	20mg	Per os	1 cp le jour de la chimio
4	Pré-médication	Anti-Histaminique	1O mg	Per os	1cp 4h avant Paclitaxel
5	Pré-Médication	Paclitaxel	80.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 500 cc SS en 60 min puis rinçage

11. Joly F, Houédé N, Noal S, Chevreau C, Priou F, Chinet-Charrot P, et al. Do patients with advanced urothelial carcinoma benefit from weekly paclitaxel chemotherapy? A GETUG phase II study. Clin Genito-urin Cancer. août 2009;7(2):E28-33.

Enfortumab vedotin – Pembrolizumab J1=J21 .(12)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Anticorps monoclonal conjugué	Enfortumab Vedotin	1,25 mg/kg	Intraveineuse	IVL 30min
2	Immunothérapie	Pembrolizumab	200mg	Intraveineuse	Dans dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes, IVL 30min
J8					
1	Anticorps monoclonal conjugué	Enfortumab Vedotin	1,25 mg/kg	Intraveineuse	IVL 30min

12. Powles T, Valderrama BP, Gupta S, Bedke J, Kikuchi E, Hoffman-Censits J, et al. Enfortumab Vedotin and Pembrolizumab in Untreated Advanced Urothelial Cancer. N Engl J Med. 7 mars 2024;390(10):875-88.

Avelumab J1=J14 (13)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Avelumab	10m/ kg	Intraveineuse	Dans dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes, IVL 30min

13. Avelumab Maintenance Therapy for Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma | New England Journal of Medicine [Internet]. [cité 25 juill 2025]. Disponible sur: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002788

Atezolizumab J1=J21 (14)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Atezolumab	1200 mg	Intraveineuse	Dans 250 cc SS 0,9 % IVL 1h

14. Balar AV, Galsky MD, Rosenberg JE, Powles T, Petrylak DP, Bellmunt J, et al. Atezolizumab as first-line treatment in cisplatin-ineligible patients with locally advanced and metastatic urothelial carcinoma: a single-arm, multicentre, phase 2 trial. Lancet. 7 janv 2017;389(10064):67-76.

Pemrolizumab J1=J21 (15)

Ordre	Type	Produit/Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	200 mg	Intraveineuse	Dans dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes, IVL 30min

15. Powles T, Csőszi T, Özgüroğlu M, Matsubara N, Géczi L, Cheng SYS, et al. Pembrolizumab alone or combined with chemotherapy versus chemotherapy as first-line therapy for advanced urothelial carcinoma (KEYNOTE-361): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. juill 2021;22(7):931-45.

Nivolumab J1=J14. (16)

Ordre	Type	Produit/Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Nivolumab	240 mg	Intraveineuse	Dans dans 100 ml de SG 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes, IVL 30min

16. Sharma P, Retz M, Siefker-Radtke A, Baron A, Necchi A, Bedke J, et al. Nivolumab in metastatic urothelial carcinoma after platinum therapy (CheckMate 275): a multicentre, single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol. mars 2017;18(3):312-22.

Enfortumab Vedotin J1,J8,J15 ; J1=J28 . (17)

Ordre	Type	Produit/Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Anticorps monoclonal conjugué	Enfortumab Vedotin	1,25 mg/kg	Intraveineuse	IVL 30min

17. Yu EY, Petrylak DP, O'Donnell PH, Lee JL, van der Heijden MS, Loriot Y, et al. Enfortumab vedotin after PD-1 or PD-L1 inhibitors in cisplatin-ineligible patients with advanced urothelial carcinoma (EV-201): a multicentre, single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol. juin 2021;22(6):872-82.

Saticuzumab govitecan J1,J8; J1=J21 . (18)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Pré-médication	Anti-Histaminique	10mg	Per os	1cp
2	Pré-médication	Paracetamol	1g	Per os	30 à 60 min avant
3	Pré-médication	METHYLPREDNISOLONE	120 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant

4	Anticorps conjugué	Satizumab govitecan	10 mg/ kg	Intraveineuse	Dans 250 mL de chlorure de sodium 0,9%, à administrer durant 3 heures pour 1ere perfusion à administrer sur 1 à 2 heures pour perfusions suivantes

18. Tagawa ST, Balar AV, Petrylak DP, Kalebasty AR, Loriot Y, Fléchon A, et al. TROPHY-U-01: A Phase II Open-Label Study of Sacituzumab Govitecan in Patients With Metastatic Urothelial Carcinoma Progressing After Platinum-Based Chemotherapy and Checkpoint Inhibitors. J Clin Oncol. 1 août 2021;39(22):2474-85.