D- LE CANCER DE LA PROSTATE

I- Stade Localise haut risque et très haut risque et localement avancé

GOSERELINE trimestriel (1) (2–4)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Hormonothérapie	Gosereline	10,8 mg	Intra-musculaire	1 injection intra-musculaire chaque 3 mois

Triptoreline trimestriel J1=J21 . (1) (2–4)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Hormonothérapie	Triptoreline	11,25 mg	Intramusculaire	1 injection intra-musculaire chaque 3 mois

1. Bolla M, Van Tienhoven G, Warde P, Dubois JB, Mirimanoff RO, Storme G, et al. External irradiation with or without long-term androgen suppression for prostate cancer with high metastatic risk: 10-year results of an EORTC andomized study. Lancet Oncol. Nov 2010;11(11):1066-73.

2. Widmark A, Klepp O, Solberg A, Damber JE, Angelsen A, Fransson P, et al. Endocrine treatment, with or without radiotherapy, in locally advanced prostate cancer (SPCG-7/SFUO-3): an open andomized phase III trial. Lancet. 24 janv 2009;373(9660):301-8.

3. Pilepich MV, Winter K, Lawton CA, Krisch RE, Wolkov HB, Movsas B, et al. Androgen suppression adjuvant to definitive radiotherapy in prostate carcinoma—long-term results of phase III RTOG 85-31. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1 avr 2005;61(5):1285-90.

4. Warde P, Mason M, Ding K, Kirkbride P, Brundage M, Cowan R, et al. Combined androgen deprivation therapy and radiation therapy for locally advanced prostate cancer: a andomized, phase 3 trial. Lancet. 17 déc 2011;378(9809):2104-11.

Abiraterone (5)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Hormonothérapie	Abiraterone Acetate	1000 mg	Voie orale	4 cp de 250mg 1x/jr, 2h à distance du repas pendant 30 jours
2	Pré-médication	Prednisone	10 mg	Voie orale	1cp de 5mg 2x/j en continu

5. James ND, de Bono JS, Spears MR, Clarke NW, Mason MD, Dearnaley DP, et al. Abiraterone for Prostate Cancer Not Previously Treated with Hormone Therapy. N Engl J Med. 27 juill 2017 ;377(4) :338-51.

II- Stade Métastatique

Docetaxel J1=J21. (6,7)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Omeprazole	40mg	Intraveineuse	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
4	Pré-médication	Prednisone	5mg	Voir orale	1cp 2x/j en continu
5	Chimiothérapie	Docetaxel	75 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SS 0,9% en 1 heure

6. Tannock IF, de Wit R, Berry WR, Horti J, Pluzanska A, Chi KN, et al. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. N Engl J Med. 7 oct 2004;351(15):1502-12.
7. van Soest RJ, de Wit R. Irrefutable evidence for the use of docetaxel in newly diagnosed metastatic prostate cancer: results from the STAMPEDE and CHAARTED trials. BMC Med. 22 déc 2015;13:304.

Docetaxel J1=J15. (8)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Omeprazole	40mg	Intraveineuse	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
4	Pré-médication	Prednisone	5mg	Voir orale	1cp 2x/j en continu
5	Chimiothérapie	DOcetaxel	50 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SS 0,9% en 1 heure

8. Martinez-Recio S, Perez-Wert JP, Martinez-Fdez S, Jimenez-Bou D, Ruiz-Gutierrez I, Peña J, et al. Comparison of 2-Weekly and 3-Weekly Dosing of Docetaxel in Metastatic Prostate Cancer. Clinical Genitourinary Cancer. 1 août 2022;20(4):363-70.

Cabazitaxel 25 J1=J21. (9)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Omeprazole	40mg	Intraveineuse	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
4	Pré-médication	Prednisone	5mg	Voie orale	1cp 2x/j en continu
5	Chimiothérapie	Cabazitaxel	20 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SS 0,9% en 1 heure

9. de Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M, Hansen S, Machiels JP, Kocak I, et al. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomised open-label trial. Lancet. 2 oct 2010;376(9747):1147-54.

Cabazitaxel 20 J1=J21. (10)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Omeprazole	40mg	Intraveineuse	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
4	Pré-médication	Prednisone	5mg	Voie orale	1cp 2x/j en continu
5	Chimiothérapie	Cabazitaxel	20 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SS 0,9% en 1 heure

10. Eisenberger M, Hardy-Bessard AC, Kim CS, Géczi L, Ford D, Mourey L, et al. Phase III Study Comparing a Reduced Dose of Cabazitaxel (20 mg/m2) and the Currently Approved Dose (25 mg/m2) in Postdocetaxel Patients With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer-PROSELICA. J Clin Oncol. 1 oct 2017;35(28):3198-206.

Docetaxel + Abiraterone + castration (11)

Ordre	Type	Produit/Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Omeprazole	40mg	Intraveineuse	SS 0,9% ou SG 5% (+4gNacl et 2gKcl)
4	Pré-médication	Prednisone	5mg	Voir orale	1cp 2x/j en continu
5	Chimiothérapie	Docetaxel	75 mg/M2	Intraveineuse	Dans 250 cc SS 0,9% en 1 heure
6	Hormonothérapie	Gosereline Ou Triptoreline	10,8 mg ou 11,25	Intra-musculaire	1 injection intra-musculaire chaque 3 mois
7	Hormonothérapie	Abiraterone Acetate	1000 mg	Voie orale	4 cp de 250mg 1x/jr, 2h à distance du repas pendant 30 jours

11. Fizazi K, Foulon S, Carles J, Roubaud G, McDermott R, Fléchon A, et al. Abiraterone plus prednisone added to androgen deprivation therapy and docetaxel in de novo metastatic castration-sensitive prostate cancer (PEACE-1): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study with a 2 × 2 factorial design. The Lancet. 30 avr 2022;399(10336):1695-707.

Abiraterone . (12)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Hormonothérapie	Abiraterone Acetate	1000 mg	Voie orale	4 cp de 250mg 1x/jr, 2h à distance du repas pendant 30 jours
2	Pré-médication	Prednisone	10 mg	Voie orale	1cp de 5mg 2x/j en continu

12. Fizazi K, Tran N, Fein L, Matsubara N, Rodriguez-Antolin A, Alekseev BY, et al. Abiraterone plus Prednisone in Metastatic, Castration-Sensitive Prostate Cancer. N Engl J Med. 27 juill 2017;377(4):352-60.

Bicalutamide 150 . (13)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Hormonothérapie	Bicalutamide	150 mg	Voie orale	3 cp de 50mg 1x/jr pendant 30 jours

13. Tyrrell CJ, Kaisary AV, Iversen P, Anderson JB, Baert L, Tammela T, et al. A randomised comparison of « Casodex » (bicalutamide) 150 mg monotherapy versus castration in the treatment of metastatic and locally advanced prostate cancer. Eur Urol. 1998;33(5):447-56.

Enzalutamide J1=J21 . (14) (15) (16)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Hormonothérapie	Enzalutamide	160 mg	Voie orale	4 cp de 40mg 1x/jr, 2h à distance du repas pendant 30 jours

14. Sweeney CJ, Martin AJ, Stockler MR, Begbie S, Cheung L, Chi KN, et al. Testosterone suppression plus enzalutamide versus testosterone suppression plus standard antiandrogen therapy for metastatic hormone-sensitive prostate cancer (ENZAMET): an international, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. avr 2023;24(4):323-34.
15. Armstrong AJ, Szmulewitz RZ, Petrylak DP, Holzbeierlein J, Villers A, Azad A, et al. ARCHES: A Randomized, Phase III Study of Androgen Deprivation Therapy With Enzalutamide or Placebo in Men With Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer. J Clin Oncol. 10 nov 2019;37(32):2974-86.
16. Hussain M, Fizazi K, Saad F, Rathenborg P, Shore N, Ferreira U, et al. Enzalutamide in Men with Nonmetastatic, Castration-Resistant Prostate Cancer. N Engl J Med. 28 juin 2018;378(26):2465-74.

Olaparib (17)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Olaparib	600mg	Voie orale	Cp de 150mg, 2cp 2x/jr pdt 30 jours en continu

17. de Bono J, Mateo J, Fizazi K, Saad F, Shore N, Sandhu S, et al. Olaparib for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. N Engl J Med. 28 mai 2020;382(22):2091-102.

Talazoparib + enzalutamide (18)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Talazoparib	0,5 mg	Voie orale	1Cp 1x/jr en continu
2	Hormonothérapie	Enzalutamide	160 mg	Voie orale	4 cp de 40mg 1x/jr, 2h à distance du repas pendant 30 jours

18. Fizazi K, Azad AA, Matsubara N, Carles J, Fay AP, De Giorgi U, et al. First-line talazoparib with enzalutamide in HRR-deficient metastatic castration-resistant prostate cancer: the phase 3 TALAPRO-2 trial. Nat Med. janv 2024;30(1):257-64.

Olaparib + Abiraterone (19)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Olaparib	600mg	Voie orale	2Cp de 150 mg 2x/jr en continu
2	Hormonothérapie	Abiraterone	1000 mg	Voie orale	4 cp de 250 mg 1x/jr 2h avant le repas ou 1h apres le repas , en continu

19. Abiraterone and Olaparib for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer | NEJM Evidence [Internet]. [cité 27 juill 2025]. Disponible sur: https://evidence.nejm.org/doi/full/10.1056/EVIDoa2200043

Niraparib + abiraterone (20,21)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Niraparib	200mg	Voie orale	1p 1x/jr en continu
2	Hormonothérapie	Abiraterone	1000 mg	Voie orale	4 cp de 250 mg 1x/jr 2h avant le repas ou 1h apres le repas , en continu

20. Chi KN, Rathkopf D, Smith MR, Efstathiou E, Attard G, Olmos D, et al. Niraparib and Abiraterone Acetate for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. JCO. 20 juin 2023;41(18):3339-51.
21. Attard G, Agarwal N, Graff JN, Sandhu S, Efstathiou E, Özgüroğlu M, et al. Phase 3 AMPLITUDE trial: Niraparib (NIRA) and abiraterone acetate plus prednisone (AAP) for metastatic castration-sensitive prostate cancer (mCSPC) patients (pts) with alterations in homologous recombination repair (HRR) genes. JCO. 10 juin 2025;43(17_suppl):LBA5006-LBA5006.

Triptoreline mensuel J1=J21 . (22)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Hormonothérapie	Triptoreline	3,75 mg	Intra-musculaire	1 injection intra-musculaire chaque 28 jours

22. Botto H, Rouprêt M, Mathieu F, Richard F. [Multicentre randomized trial comparing triptorelin medical castration versus surgical castration in the treatment of locally advanced or metastatic prostate cancer]. Prog Urol. avr 2007;17(2):235-9.

Triptoreline trimestriel J1=J21 . (23)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Hormonothérapie	Triptoreline	11,25 mg	Intra-musculaire	1 injection intra-musculaire chaque 3 mois

23. Bouchot O, Soret JY, Jacqmin D, Lahlou N, Roger M, Blumberg J. Three-month sustained-release form of triptorelin in patients with advanced prostatic adenocarcinoma: results of an open pharmacodynamic and pharmacokinetic multicenter study. Horm Res. 1998;50(2):89-93.

GOSERELINE mensuel J1=J21 . (24)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Hormonothérapie	Gosereline	3,6 mg	Intra-musculaire	1 injection intra-musculaire chaque 28 jours

24.Peeling WB. Phase III studies to compare goserelin (Zoladex) with orchiectomy and with diethylstilbestrol in treatment of prostatic carcinoma. Urology. mai 1989;33(5 Suppl):45-52.

GOSERELINE trimestriel J1=J21 . (25)

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Hormonothérapie	Gosereline	10,8 mg	Intra-musculaire	1 injection intra-musculaire chaque 3 mois

25. Fontana D, Mari M, Martinelli A, Boccafoschi C, Magno C, Turriziani M, et al. 3-month formulation of goserelin acetate (« Zoladex » 10.8-mg depot) in advanced prostate cancer: results from an Italian, open, multicenter trial. Urol Int. 2003;70(4):316-20.