

แบบประเมิน NPI-Q thai

วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 14:20 นาฬิกา

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย นายปฏิพาน เปี่ยมไพบูรณ์ อายุ 36 ปี HN 0054008

สิทธิการรักษา ไม่มีสิทธิ(ชำระเงิน)

อาการสำคัญ ผู้ป่วยใหม่ พุดบ่นคนเดียว เดินเรื่อยเปื่อย หงุดหงิด กระวนกระวาย นอนไม่หลับ เป็นก่อนมา 1 อาทิตย์ ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน ผู้ป่วยใหม่ 1 ปี เสพยาบ้า กลับจากทำงานต่างประเทศ เริ่มมีอาการ เรื่อยเปื่อย พุดบ่นคนเดียว ไม่นอน รักษาคลินิก อาการทุเลา มีอาการมาเรื่อยๆ 1 อาทิตย์ ก่อนมา พุดบ่นคนเดียว เดินเรื่อยเปื่อย หงุดหงิด กระวนกระวาย นอนไม่หลับ ต้องการพบแพทย์ ประวัติการใช้สารเสพติด เคยเสพยาบ้าเล็ก 1 ปี , สุบุนหรือจิต GAF=71-80คะแนน

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ไม่มี

1. ความคิดหงุดหงิด : ท่านคิดว่าผู้ป่วยมีความเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริงมั๊ย? ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยพุดบ่นอยู่ๆว่าจะมีคนมาคอยทำร้ายหรือขโมยของจากกระเป๋า หรือผู้ป่วยพุดว่าคนในบ้านไม่ใช่คนเดิมที่เขารู้จักหรือบ้านที่ผู้ป่วยอยู่ไม่ใช่หลังเดิมที่เขาเคยอยู่ โดยไม่ใช่แค่คิดสงสัย แต่ผู้ป่วยมั่นใจว่าสิ่งที่คิดเป็นจริง

น้อย : คือมีความคิดหลงผิดแต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยและไม่ทำให้ผู้ป่วยวิตก

ความทุกข์ใจของผู้ดูแลระดับ : 1

2. ประสาทหลอน : ผู้ป่วยเห็นภาพที่ไม่มีอยู่จริงหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริง เช่น ภาพหลอน, หูแว่วหรือไม่ ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ป่วยที่กักตักผิดๆเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยพุดว่าเพื่อหรือญาติยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่เพิ่งเสียชีวิตไปเร็วๆนี้

ปานกลาง : มีประสาทหลอนที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน

ความทุกข์ใจของผู้ดูแลระดับ : 2

3. กระสับกระส่าย/ก้าวร้าว : มีบางครั้งผู้ป่วยปฏิเสธที่จะร่วมมือหรือไม่ยอมให้ผู้อื่นช่วยเหลือ หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือไม่

รุนแรง : มีพฤติกรรมกระสับกระส่าย/ก้าวร้าวจนเป็นปัญหา อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น จำเป็นต้องใช้ยาควบคุมอาการ

ความทุกข์ใจของผู้ดูแลระดับ : 4

4. ซึมเศร้า/ละเหี่ยใจ : ผู้ป่วยมีท่าทีหรือเคยพุดว่าเศร้าหรือหดหูหรือไม่

น้อย : คือมีความคิดหลงผิดแต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยและไม่ทำให้ผู้ป่วยวิตก

ความทุกข์ใจของผู้ดูแลระดับ : 3

5. ความวิตกกังวล : ผู้ป่วยมีลักษณะวิตกกังวล หงุดหงิด ตื่นกลัวโดยไม่มีเหตุผล ผู้ป่วยดูเหมือนมีอาการถึงเคลียดหรือหยุกหยิกอยู่ไม่สุข หรือตื่นกลัวเมื่ออยู่ห่างจากท่านหรือไม่

น้อย : มีความทุกข์ใจจากความวิตกกังวล โดยวิธีเบี่ยงเบนความสนใจหรือให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วย

ไม่มี

6. อารมณ์ร้ายแรงเกินเหตุ/คร่ำใจ : ผู้ป่วยดูว่าเรงหรือแสดงออกว่ามีความสุขมากเกินไปหรือไม่ ทั้งนี้ไม่ใช่ความสุขตามธรรมดาเมื่อได้เจอเพื่อนฝูง ครอบครัวหรือเมื่อได้รับของขวัญ แต่หมายถึงมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเกินกว่าที่เคยเป็นหรือในขณะที่ยังไม่ได้รับรู้สักไปด้วย

รุนแรง : อารมณ์ร้ายแรงเกินเหตุเห็นได้ชัดเจน โดยผู้ป่วยมีอาการเบิกบานเกินเหตุและมักหัวเราะกับสิ่งต่างๆตลอดเวลา

ความทุกข์ใจของผู้ดูแลระดับ : 5

7. ความเฉยเมยไม่สนใจสิ่งรอบตัว/ไร้อารมณ์ : ผู้ป่วยขาดความสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัว ทั้งในกิจกรรมต่างๆหรือขาดแรงจูงใจในการเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ หรือมีลักษณะเฉยเมยไม่แสดงอารมณ์หรือไม่

ปานกลาง : สังเกตเห็นความเฉยเมยได้ชัดเจน โดยอาจตอบสนองเมื่อผู้ดูแลชักชวน ผู้ป่วยจะตอบสนองต่อเหตุการณ์สำคัญเท่านั้น เช่นญาติหรือคนในครอบครัวมาเยี่ยม

ความทุกข์ใจของผู้ดูแลระดับ : 3

8. ความไม่ยับยั้งชั่งใจ : ผู้ป่วยดูเหมือนทำอะไรหมั่นพันเล่นโดยไม่คิด ผู้ป่วยพุดหรือทำอะไรที่ปกติแล้วจะไม่พุดหรือทำในสิ่งที่ไม่ควรในที่สาธารณะ ผู้ป่วยทำในสิ่งที่หน้าอับอายต่อท่านหรือคนอื่นหรือไม่

น้อย : สังเกตเห็นความไม่ยับยั้งชั่งใจได้ แต่มักตอบสนองต่อการเบี่ยงเบนความสนใจหรือคำแนะนำ

ความทุกข์ใจของผู้ดูแลระดับ : 1

9. อารมณ์หงุดหงิด/อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย : ผู้ป่วยหงุดหงิดง่ายหรือทำให้โกรธได้ง่าย ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงเร็วหรือไม่มีอารมณ์ทน ทั้งนี้ไม่ใช่ความหงุดหงิดจากความจำเลื่อมที่ลงหรือไม่สามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้ แต่เป็นอารมณ์หงุดหงิดขาดความอดทน หรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วผิดปกติไปจากคนเดิม

ปานกลาง : สังเกตเห็นอารมณ์หงุดหงิดหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน และผู้ดูแลมีความลำบากในการควบคุมพฤติกรรม

ความทุกข์ใจของผู้ดูแลระดับ : 3

10. พฤติกรรมแปลก : ผู้ป่วยเดินไปเดินมา ทำอะไรซ้ำๆ เช่น เปิดตู้เสื้อผ้า หรือเปิดลิ้นชักซ้ำแล้วซ้ำอีก จับคำสั่งของซ้ำๆหรือเกาะกุมซ้ำๆหรือไม่

น้อย : พฤติกรรมแปลกผิดสังเกตเห็นได้ แต่รบกวนชีวิตประจำวันเล็กน้อย

ไม่มี

11. การนอนหลับ/ปัญหาพฤติกรรมช่วงกลางคืน : ผู้ป่วยมีปัญหาในการนอนหลับหรือไม่ โดยไม่ได้หมายถึงการตื่นเพื่อเข้าห้องน้ำหรือครั้ง2ครั้งแล้วนอนหลับต่อได้เอง แต่ผู้ป่วยตื่นขึ้นมากลางดึก หรือเดินไปเดินมา ลุกขึ้นแต่งตัว หรือรบกวนการนอนของคนอื่นตอนกลางคืนหรือไม่

รุนแรง : มีพฤติกรรมผิดปกติตอนกลางคืนหลายอย่าง ทำให้ผู้ป่วยทุกข์ใจอย่างมากและรบกวนการนอนของผู้ดูแลอย่างมาก

ความทุกข์ใจของผู้ดูแลระดับ : 5

12. ความอยากอาหารและการกินที่ผิดปกติ : ผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงของความอยากอาหาร น้ำหนัก นิสัยการรับประทานอาหารหรือประเภทของอาหารที่เคยชอบหรือไม่(ไม่รวมถึงผู้ป่วยที่กินเองไม่ได้และต้องป้อนอาหาร)

ปานกลาง : มีความเปลี่ยนแปลงในความอยากอาหารหรือนิสัยการกิน และทำให้น้ำหนักตัวผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ความทุกข์ใจของผู้ดูแลระดับ : 1

พยาบาลผู้ซักประวัติ.....

(ฐานพงศ์ ตีอุดมจันทร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเครื่องคอมพิวเตอร์
วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 14:20 นาที