Estratégia Concursos

# Aula 11

*DataPrev - Passo Estratégico de Raciocínio Lógico - 2024 (Pós-Edital)*

Autor:
**Allan Maux Santana**

23 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

# Índice

1) Probabilidade - FGV ..... 3



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

# PROBABILIDADE (FGV)

## Sumário

*O que é mais cobrado dentro do assunto* ..... 2

*Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque* ..... 2

*Probabilidade* ..... 2

Tipos de Probabilidades ..... 7

*Teorema de Bayes* ..... 7

*Pegadinhas Estratégicas* ..... 8

*Questões estratégicas* ..... 10

*Questões FGV* ..... 10

*Lista de Questões Estratégicas* ..... 16

*Questões FGV* ..... 16

*Gabarito - FGV* ..... 18



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

## O que é mais cobrado dentro do assunto

Vamos analisar agora como se comporta a incidência dos sub assuntos da nossa aula de hoje. Assim, você será melhor direcionado nos seus estudos, vejam:

| Probabilidade | Grau de incidência |
|---|---|
| PROBLEMAS INTRODUTÓRIOS DE PROBABILIDADE | *46,9%* |
| PROBABILIDADE DA INTERSERCÇÃO | *15,5%* |
| CÁLCULO DE PROBABILIDADE USANDO ANÁLISE COMBINATÓRIA | *13,3%* |
| PROBABILIDADE DA UNIÃO | *13,3%* |
| PROBABILIDADE CONDICIONAL | *6,6%* |
| PROBABILIDADE DO EVENTO COMPLEMENTAR | *4,4%* |
| *TOTAL* | *100,00%* |

# ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

## Probabilidade

Fala, gente, beleza?

Estamos aqui diante de um assunto que muitas vezes exige do candidato um nível um pouco mais aguçado de interpretações, mas que, ao mesmo, também, é o assunto que possui as questões mais fáceis de serem resolvidas.

Se você é um aluno iniciante da matemática, fique bem atento aos conceitos básicos da Probabilidade, pois eles poderão garantir umas questões a mais em seu certame, ok?

Faça o básico nesse conteúdo, quando as questões são muito difíceis há um nivelamento pra baixo no nível do conteúdo, visto que, muito possivelmente, até o candidato que sabe bastante do assunto poderá errar a questão.



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira




*Os candidatos focam suas preocupações em decorar as fórmulas desse assunto, que não são poucas, mas e se eu lhe disser que vamos resolver todas as questões sem fórmulas, você ficará mais feliz? ;)*

*Então, é isso que vamos fazer. Carga máxima!! Sua hora vai chegar!!*

Precisamos saber o conceito matemática de probabilidade que será representado por uma fração, vejam:

Qual a Probabilidade de sair o número 4 no lançamento de um dado?

Sua resposta é, ou não, intuitiva?

$$= \frac{1}{6} =$$

De imediato, temos a resposta na nossa cabeça. Basicamente, *Probabilidade* é:

$$P(E) = \frac{O\ que\ Você\ Quer\ Aconteça}{Diante\ do\ que\ Pode\ Acontecer}$$

Considerando que devemos usar os nomes técnicos das coisas, logo:

$$P(E) = \frac{EVENTO}{ESPAÇO\ AMOSTRAL}$$

| *EVENTO* | *ESPAÇO AMOSTRAL* |
|---|---|
| É o conjunto formado por aquilo que você quer que aconteça | É o conjunto formado por tudo aquilo que possa acontecer |

Fica mais fácil de entender assim né?

Rsrsrs... tamos cheios de linguagens técnicas rebuscadas que somente os autores entendem... ;)

Sim, a última coisa que vocês precisam saber eu até já falei na aula de Análise Combinatória, mas vamos lembrar:




11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira




Nas questões de ***Análise Combinatória*** e ***Probabilidade*** vale o seguinte:

O uso do conectivo ***"e"*** será substituído por uma operação de ***multiplicação***.

O uso do conectivo ***"ou"*** será substituído por uma operação de ***adição***.




Pegando o mesmo exemplo sobre o lançamento do dado, para entendermos o uso dos conectivos:

Se eu perguntasse a probabilidade de sair um número par ***OU*** ímpar?

- Sair par: *1/2*
- Sair ímpar: *1/2*
- Sair par *OU* ímpar: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ = 1= 100%.

Agora, se a perguntasse fosse: em dois lançamentos consecutivos de um dado, qual a probabilidade de sair par no primeiro lançamento *e* ímpar no segundo?

- Sair par: *1/2*
- Sair ímpar: *1/2*
- Sair par *E* ímpar: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ *= 25%*

Vamos, agora, dar um exemplo que envolve logo tudo o que falei acima, ok?

Se você entender direitinho, acabou o assunto. Caso contrário, passem para as Questões Estratégicas para dar uma treinada nas questões mais simples, beleza?



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira




*EXEMPLO 01:*

*Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região; caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva na região.*

*Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva?*

*Comentários:*

Vejam que não iremos usar fórmulas. Bastará apenas usar o conceito de probabilidade e os conectivos.

| | ATRASAR | NÃO ATRASAR |
|---|---|---|
| CHOVER | 50% | 50% |
| NÃO CHOVER | 25% | 75% |

*Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva na região.*

Sabe-se que existe a probabilidade de *30% de chover*, logo *70% de não chover*.

*PERGUNTA DA QUESTÃO*

*Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva?*

Percebam que o atraso existe chovendo ou não chovendo, ou seja:



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Temos **duas** situações:

Chove (30%) **e** (MULTIPLICA) ele atrasa (50%) C/ a chuva **ou** (SOMA) Não chove (70%) e (MULTIPLICA) ele atrasa (25%) S/ chuva.

$$= \frac{30}{100} \cdot \frac{50}{100} + \frac{70}{100} \cdot \frac{25}{100} =$$

$$= 0,15 + 0,175 =$$

$$= 0,325 =$$

$$= 32,5\% =$$

*EXEMPLO 02:*

*Numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante uma hora, e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente; a probabilidade de acusar a cor verde é de $\frac{2}{3}$ e a de acusar a cor vermelha é de $\frac{1}{3}$. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Qual a probabilidade de que esta pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde?*

*Comentários:*

Gente, observem logo que ele não falou que seria exatamente "apenas" um sinal em específico, mas que seria exatamente um sinal na cor verde.
Isso impacta diretamente no resultado da questão.

Percebam se ele pedisse a **probabilidade de o 1° sinal ser verde**, teríamos o seguinte:

$$= \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^9 =$$

$$= \frac{2}{3^{10}} =$$

No entanto, qualquer (desde que seja apenas 01) um dos dez sinais pode estar verde, logo devemos multiplicar a resposta acima por 10, vejam:



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$= \frac{2}{3^{10}} \cdot 10 =$$

## Tipos de Probabilidades

Tem uma fórmula para cada tipo, mas não precisa decorar, conforme falei antes, ok?




| PROBABILIDADES | | |
|---|---|---|
| CONDICIONAL | DA INTERSERCÇÃO | DA UNIÃO |
| *Determinada condição que é conhecida à priori, isto é, antes de se calcular a probabilidade do evento* | *P/ termos a probabilidade da interseção, devemos apenas isolar o termo presente na fórmula da Probabilidade Condicional* | *Basta usarmos aqui a ideia da união entre dois conjuntos, conforme aprendemos na aula de Teoria dos Conjuntos* |
| $P(A\|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ | $P(A \cap B) = P(A\|B) \cdot P(B)$ | $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ |

Vamos fazer todas as questões a seguir sem o uso dessas danadas ai de cima, ok?

E, por fim, a Probabilidade de determinado Evento acontecer sempre estará no intervalo de 0 a 1, ok?

Sendo 1, teremos o Evento chamado de Certo.

Sendo 0, o Evento será impossível.

## Teorema de Bayes

O *Teorema de Bayes* é uma aplicação da probabilidade condicional, bastante utilizado em questões que tratam de ***margem de erro*** em um resultado ou ***valores de falso positivo***.



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Assim, o **Teorema de Bayes** busca conciliar essa probabilidade a priori com a ***probabilidade condicional***.

Portanto, não precisamos entender o Teorema de Bayes como se fosse um novo assunto, podemos utilizar, também, a mesma ideia da resolução pela probabilidade condicional, utilizando a multiplicação, quando do uso do conectivo "e".

## PEGADINHAS ESTRATÉGICAS

*Querido aluno, cada assertiva abaixo contém uma "casca de banana" – será que você vai escorregar em alguma? (rs)*

*A ideia aqui é induzi-lo levemente a cometer erros, não com o intuito de desanimá-lo, mas para que você aumente a retenção do conteúdo estudado!*

*Vamos lá?*

*1.* Sabe-se que a probabilidade tem como finalidade o estudo da possibilidade ou chance de acontecer um determinado evento. Para calcular a probabilidade de ocorrência de um evento X, em um determinado evento aleatório, considerando que cada elemento não possui a mesma chance de acontecer, basta determinar fração entre os resultados possíveis pelos resultados favoráveis.

Esse item foi colocado apenas para conceituar a probabilidade. A probabilidade tem como finalidade o estudo da possibilidade ou chance de ocorrer um determinado evento. E para calcular a probabilidade de um evento qualquer X, em um experimento aleatório, considerando que cada elemento possui a mesma chance de acontecer, basta determinar a fração entre os resultados favoráveis pelos resultados possíveis.

A probabilidade tem valor máximo de 100% quando o evento é certo e zero quando o evento é impossível. Desta forma, ela só pode assumir valores entre 0 e 1 ($0 \leq P(X) \leq 1$).

*2.* Dizemos que dois eventos são mutuamente excludentes quando a chance de ocorrência ou não ocorrência de um deles não afeta a probabilidade de outro. Além disso, a soma de dois eventos nesse tipo de probabilidade é sempre igual a zero.



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Nesse item, houve uma troca de conceitos, pois será um evento independente. Além disso, a soma das probabilidades de dois eventos mutuamente excludentes é sempre igual a 1.

Pessoal, resolvemos fazer um resumo dos tipos de probabilidade para este item. É muito importante ter essas probabilidades e fórmulas na mente na hora da prova.

1) Probabilidade da intersecção – quando a chance de ocorrência conjunta de dois ou mais eventos. Nesse caso, os eventos serão ligados pelo convectivo "e".

$$P(A\ e\ B) = P(A).P(B|A)$$

Sendo P(B|A) a probabilidade de ocorrer o evento B sabendo que o evento A já ocorreu.

2) Probabilidade de eventos interdependentes – dois eventos (A e B) são considerados independentes quando a chance de ocorrência ou não ocorrência de um deles não afeta a probabilidade de ocorrência do outro. Essa probabilidade é dada pela multiplicação das probabilidades de cada evento.

$$P(A\ e\ B) = P(A).P(B)$$

3) Probabilidade de eventos mutuamente excludentes – dois eventos (A e B) são considerados mutuamente excludentes (exclusivos) se eles não podem ocorrer simultaneamente. Desta forma, se dois eventos são mutualmente excludentes termos o seguinte:

- P(A|B) = 0 → probabilidade de A ocorrer dado que B ocorreu é 0;
- P(B|A) = 0 → probabilidade de B ocorrer dado que A ocorreu é 0;
- P(A e B) = 0 → probabilidade de A e B ocorrerem simultaneamente é 0;
- P(A) + P(B) = 1 → a soma das probabilidades de A e B será sempre 100%.

4) Probabilidade da união e dois eventos – quando dois eventos estão ligados entre si pelo conectivo "ou".

$$P(A\ ou\ B) = P(A) + P(B) - P(A\ e\ B)$$

Se A e B forem mutualmente excludentes a probabilidade da união fica reduzida a:

$$P(A\ ou\ B) = P(A) + P(B)$$

Pois, como vimos P(A e B) é igual a zero para eventos mutuamente excludentes.

5) Probabilidade do evento complementar – dois eventos são complementares quando, simultaneamente, a união dos dois eventos resulta no espaço amostral, e eles são mutuamente excludentes. De forma geral é representado por uma barra em cima da letra.

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

Na resolução das questões, quando aparece a expressão "pelo menos 1" é mais fácil calcular a probabilidade do evento complementar.

6) probabilidade Condicional – quando se deseja calcular a probabilidade de um evento A, dado que o evento B ocorreu. Essa probabilidade é representada por P(A|B).



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$P(A|B) = \frac{P(A\ e\ B)}{P(B)}$$

Quando os eventos A e B são independentes, a probabilidade de o evento A ocorrer dado que ocorreu B, será sempre igual a P(A), pois A não depende de B. O contrário é verdadeiro.

$$P(A|B) = P(A)$$

$$P(B|A) = P(B)$$

# QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.




## *Questões FGV*

*Q.01 (Pref. Angra dos Reis / Especialista em Desportos/ 2019)*

*Peter é um ótimo lançador de dardos. A cada lançamento, a probabilidade de Peter acertar o alvo é de 90% e independe de Peter ter acertado ou não o alvo em lançamentos anteriores. Após fazer dois lançamentos em sequência, a probabilidade de Peter ter acertado o alvo nos dois lançamentos é de*

*(a) 180%*

*(b) 90%*

*(c) 81%*

*(d) 72%*



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

(e) 60%


*Comentários:*

*De cara, a gente exclui, de imediato, a alternativa "A", ok?*




***Não há como a probabilidade de determinado evento acontecer ser superior a 100%.***

*Pessoal, aprendemos, na parte teórica do assunto, várias fórmulas para solução das questões de Probabilidade, mas o que vale, na prática, é o seguinte:*




*Após fazer dois lançamentos em sequência, a probabilidade de Peter ter acertado o alvo nos dois lançamentos é de:*

*Acima temos a pergunta da questão, ok?*

*Percebam que Peter deverá acertar o alvo no Primeiro E Segundo lançamentos, ok?*

*Como sabemos que a probabilidade de ele acertar cada lançamento é de 90%, logo:*

$$\frac{90}{100} \cdot \frac{90}{100}$$

*81%*

*Gabarito: C*

*Q.02 (Assembleia Legislativa de RO / Analista Legislativo / 2018)*

*Uma moeda é lançada quatro vezes. A probabilidade de saírem mais caras do que coroas é de:*

*(a) 4/16*

*(b) 5/16*



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

(c) 6/16

(d) 7/16

(e) 8/16

Comentários:

Num total de 04 lançamentos, a probabilidade de saírem **mais caras do que coroas** acontece quando:

1. Saírem 03 caras (C) + 01 coroa (K):

$$\frac{1}{2}.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{16}$$

Mas, vejam que essa probabilidade pode acontecer da seguinte forma:

(C, C, C, K)

(C, C, K, C)

(C, K, C, C)

(K, C, C, C)

Logo, a probabilidade de saírem 03 caras + 01 coroa será de:

$$4 \cdot \frac{1}{16}$$

$$\frac{4}{16}$$

2. Saírem 04 caras:

$$\frac{1}{2}.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{16}$$

Percebam que deve acontecer uma situação OU a outra, logo devemos somar as probabilidades, ok?

$$= \frac{4}{16} + \frac{1}{16} =$$

$$= \frac{5}{16} =$$

Gabarito: B

Q.03 (Assistente / SEFAZ-AM / 2022)



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

*Em uma urna há 5 bolas iguais, cada uma com uma letra da sigla SEFAZ. Todas as bolas têm letras diferentes entre si.*

*Retiram-se, aleatoriamente, 2 bolas da urna.*

*A probabilidade de que tenham sido retiradas as 2 vogais é de*

a) *1/5*
b) *2/5*
c) *3/5*
d) *3/10*
e) *1/10*

*Comentários:*

*Na primeira retirada: 2/5*

*Na segunda retirada: 1/4*

*Como é uma retirada e outra, devemos multiplicar as frações, logo:*

$$= \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} =$$

$$= \frac{1}{10} =$$

*Gabarito: E*

*Q.04 (Soldado / PM-RJ / 2024)*

*Em uma urna A há 6 bolas iguais numeradas de 1 a 6 e em uma urna B há 7 bolas, também iguais, numeradas de 7 a 13. Retira-se aleatoriamente uma bola de cada urna.*

*A probabilidade de a soma dos números das bolas sorteadas ser maior do que 16 é:*

a) *6/13;*
b) *5/14;*
c) *1/6;*
d) *1/7;*
e) *2/21.*

*Comentários:*



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A ideia é sempre separarmos as informações do texto da questão, assim podemos focar apenas no que nos interessa, vejamos:




- ***Urna "A":*** 6 bolas numeradas de 1 a 6;
- ***Urna "B":*** 7 bolas numeradas de 7 a 13;
- Qual a probabilidade de a soma das bolas sorteadas ***ser maior do que 16***, retirando-se aleatoriamente 1 bola de cada urna?

Vamos definir, de imediato, logo o nosso espaço amostral:

Nosso ***espaço amostral será definido através do PFC*** (princípio fundamental da contagem) visto em nossa aula de análise combinatória.

Como na urna "A" há ***6 bolas*** e na "B" ***7,*** logo o conjunto formado por todas as possibilidades que podem acontecer será dado por:

$$= 6 \cdot 7 =$$

$$= 42 \text{ possibilidades} =$$

Agora, meus amigos, vamos lembrar qual foi o pedido do nosso enunciado:

*A probabilidade de a soma dos números das bolas sorteadas ser maior do que 16 é?*

Então, temos que determinar o seguinte:

A maior soma possível será 19, acontecendo a retirada da bola 6 da urna "A" e da 13 da urna "B". Nessa linha, a menor soma desejada será 17, portanto, iremos definir o nosso problema da seguinte forma:

*URNA A: {1, 2, 3, 4, 5, 6}*

*URNA B: {7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}*

- *Soma 17: {(4,13), (5, 12), (6, 11)}, temos 3 possibilidades*
- *Soma 18: {(5, 13), (6, 12)}, temos 2 possibilidades*
- *Soma 19: {(6, 13)}, apenas 1 possibilidade*

Nosso Evento será dado pela soma das possibilidades encontradas acima que será igual 6.

A probabilidade pedida será de 6/42, ***simplificando a fração por 6, nosso gabarito será 1/7***.



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

*Gabarito: D*

*Q.05 (Analista / ALES-SC / 2024)*

*Em uma bandeja há 10 empadas, todas com mesma aparência, sendo 3 de frango e as demais de palmito. Carla retira, ao acaso, duas empadas dessa bandeja.*

*A probabilidade de que as duas empadas retiradas sejam de sabores diferentes é:*

a) *1/2*
b) *2/5*
c) *3/8*
d) *5/12*
e) *7/15*

*Comentários:*




- ***Empadas de frango:*** 3
- ***Empadas de palmito:*** 7
- ***Qual a probabilidade de as duas empadas serem de sabores diferentes?***

Vamos definir nosso espaço amostral através de uma ***combinação de 10 agrupadas 2 a 2***, vimos esse tópico em nossa aula de Análise Combinatória.

$$C_{10,2} = 45$$

Portanto, existem ***45 possibilidades*** de agruparmos 2 empadas dentre as 10 disponíveis.

Vamos pensar no nosso evento que é termo sabores distintos, através do PFC, temos que:

Na retirada da empada de frango são 3 possibilidades, e na de palmito temos 7, logo nosso evento será dado por:

$$= 3 \cdot 7 =$$

$$= 21 \text{ possibilidades} =$$

Nossa probabilidade será de 21/45, simplificando por 3 ambos os termos:



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

= 7/15 =

*Gabarito: E*

# LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

## Questões FGV

*Q.01 (FGV / Pref. Angra dos Reis / Especialista em Desportos/ 2019)*

*Peter é um ótimo lançador de dardos. A cada lançamento, a probabilidade de Peter acertar o alvo é de 90% e independe de Peter ter acertado ou não o alvo em lançamentos anteriores. Após fazer dois lançamentos em sequência, a probabilidade de Peter ter acertado o alvo nos dois lançamentos é de*

*(a) 180%*

*(b) 90%*

*(c) 81%*

*(d) 72%*

*(e) 60%*

*Q.02 (FGV / Assembleia Legislativa de RO / Analista Legislativo / 2018)*

*Uma moeda é lançada quatro vezes. A probabilidade de saírem mais caras do que coroas é de:*

*(a) 4/16*

*(b) 5/16*

*(c) 6/16*

*(d) 7/16*

*(e) 8/16*

*Q.03 (FGV / ASSISTENTE / SEFAZ-AM / 2022)*

*Em uma urna há 5 bolas iguais, cada uma com uma letra da sigla SEFAZ. Todas as bolas têm letras diferentes entre si.*

*Retiram-se, aleatoriamente, 2 bolas da urna.*

*A probabilidade de que tenham sido retiradas as 2 vogais é de*

*a) 1/5*



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) 2/5

c) 3/5

d) 3/10

e) 1/0

Q.04 (Soldado / PM-RJ / 2024)

Em uma urna A há 6 bolas iguais numeradas de 1 a 6 e em uma urna B há 7 bolas, também iguais, numeradas de 7 a 13. Retira-se aleatoriamente uma bola de cada urna.

A probabilidade de a soma dos números das bolas sorteadas ser maior do que 16 é:

a) 6/13;

b) 5/14;

c) 1/6;

d) 1/7;

e) 2/21.

Q.05 (Analista / ALES-SC / 2024)

Em uma bandeja há 10 empadas, todas com mesma aparência, sendo 3 de frango e as demais de palmito. Carla retira, ao acaso, duas empadas dessa bandeja.

A probabilidade de que as duas empadas retiradas sejam de sabores diferentes é:

a) 1/2

b) 2/5

c) 3/8

d) 5/12

e) 7/15



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

# Gabarito - FGV

GABARITO



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| C | B | E | D | E |



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
# PIRATARIA É CRIME.

**Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.**

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



**Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.**