

Table S22: Number of epitope-specific (KO-GT8++) responders by treatment and time point, with accompanying Wilson score confidence intervals

Visit	DPBS sucrose	20 µg eOD-GT8 60mer and AS01B	100 µg eOD-GT8 60mer and AS01B
Wk3 (V05)	0 of 6 = 0.0% (0.0%, 39.0%)	12 of 16 = 75.0% (50.5%, 89.8%)	13 of 16 = 81.2% (57.0%, 93.4%)
Wk4 (V06)	0 of 12 = 0.0% (0.0%, 24.2%)	18 of 18 = 100.0% (82.4%, 100.0%)	18 of 18 = 100.0% (82.4%, 100.0%)
Wk8 (V07)	0 of 12 = 0.0% (0.0%, 24.2%)	18 of 18 = 100.0% (82.4%, 100.0%)	17 of 17 = 100.0% (81.6%, 100.0%)
Wk9 (V07A)	0 of 12 = 0.0% (0.0%, 24.2%)	18 of 18 = 100.0% (82.4%, 100.0%)	17 of 17 = 100.0% (81.6%, 100.0%)
Wk10 (V08)	0 of 12 = 0.0% (0.0%, 24.2%)	17 of 17 = 100.0% (81.6%, 100.0%)	17 of 17 = 100.0% (81.6%, 100.0%)
Wk11 (V09)	0 of 5 = 0.0% (0.0%, 43.4%)	12 of 14 = 85.7% (60.1%, 96.0%)	10 of 14 = 71.4% (45.4%, 88.3%)
Wk16 (V10)	0 of 12 = 0.0% (0.0%, 24.2%)	18 of 18 = 100.0% (82.4%, 100.0%)	16 of 16 = 100.0% (80.6%, 100.0%)