机制线索与尚未接上的环节

六组 rep1 × 100 ns ｜ 本图汇总结构观察，不宣称选择性已增强

N84V：观察到 ascr18 锚定和较小移动，位点到锚定的联系未建立

84 位附近的局部堆积

N84V–ascr18：84—Gly171 约4.33 Å

WT–ascr18：约9.26 Å

两组在起点已存在距离差异

尚缺的联系

84 位如何影响 Phe186 / Arg189？

未发现符合本次定义的两步近接路径

未检验更长或水介导路径

已观察到的配体锚定

Arg189—羧酸端：100%近接

任一几何氢键：93.6%

锚定在 t=0 已存在；核心拟合 RMSD 1.70 Å

V368R：局部重排可见；不能据此认定 ascr3 选择性增强

Arg368—Asp70 发生分化

ascr18：带电端距离约2.74 Å

几何氢键占有率92.6%

ascr3：带电端距离约6.49 Å，氢键0%

空间联系与时间顺序

368—Lys364—Arg345—配体

ascr3 联合近接60.5%；WT为44.3%

带电端分离约8.0 ns；锚定约8.6 ns

尚未获得的结论

WT同样具有Arg345锚定

缺少“突变→选择性增强”的归因证据

不能将近接图解释为因果传递通路

数值为50–100 ns描述；接触≤4 Å，两步蛋白近接边≤4.5 Å。不同母体/lid/pose，单条轨迹；线段不表示因果。