

25-2 DSL 정규 세션

Mathematics for ML 과제



- ☑ 본 과제는 학회 정규 세션 「Mathematics for Machine Learning」의 내용을 다루며, 개념의 적용과 실제 활용 사례에 대한 이해를 돕기 위해 기획되었습니다. 해당 과제는 평가를 위한 것이 아니므로, 주어진 힌트(💡)를 적극 활용하시고 학회원 간 토론 및 Slack 질의응답을 적극 활용하여 해결해주시요. 단, 답안 표절이나 LLM의 남용은 금지합니다.
- ☑ 각 문제에서 요구하는 방법에 맞게 해결하며, 서술형 문제들은 따로 작성하시어 .pdf 파일로 답안을 작성하여 제출해 주십시오.
- ☑ 7/30 (수) 23 시 59 분까지 Github 에 .pdf 파일을 제출해 주십시오. Github 에 제출하는 방법을 모른다면 학술부 (강승우, 조지성, 한연주)로 문의 주시기 바랍니다.

문제 1 Entropy and Mutual Information

다음은 어느 드라마의 한 장면 중 일부입니다.

“...지는 분은 물론 벌칙이 있습니다. 아마 영화에서 보신 적이 있으실 겁니다, 러시안룰렛이라고. 이 권총에 총알 하나를 넣고 닫습니다. 그리고 지는 분 쪽으로 방아쇠를 당길 겁니다. 죽을 확률이 1/6, 살 확률은 5/6. 생각보다 나쁘지 않죠? (중략) ...조금 지루한 감이 없지 않아 있네요. 그럼 이제 확률을 뒤집어 볼까요? 권총에 총알 다섯 개를 넣고 닫습니다. 확률은 1/6, 죽을 확률은 5/6. 자, 다시 시작하겠습니다.”

그러나 사실은 두 상황 모두 엔트로피의 측면에서의 지루함, 즉 불확실성은 같습니다! 총알이 발사될 확률이 각각 1/6, 5/6 인 베르누이 분포를 따르기 때문에, 엔트로피의 정의를 따라 계산하면 같은 값이 나오는 것이죠.

이 문제에서는 이처럼 주어진 사건들이 이산적인 경우 엔트로피의 성질을 알아보고, 직접 계산해보며 엔트로피와 Mutual Information 이 가진 의미를 알아보고자 합니다.

1-1 💡: 주사위를 던졌을 때 나오는 눈의 사건을 X 라 하고, 각 눈이 나올 확률을 p_i ($0 \leq p_i \leq 1$, $\sum_{i=1}^6 p_i = 1$) 이라 할 때, 아래의 조건에서 주사위의 엔트로피 $H(X)$ 를 각각 구하세요. $H(X)$ 는 언제 최대가 되는지 간단한 이유 (내지는 직관)와 함께 서술하세요.

💡 엔트로피의 정의: $H(X) = \sum_{x \in X} p(x) \log_2 \{1/p(x)\} = \sum_{x \in X} -p(x) \log_2 \{p(x)\}$

1) 공정한 주사위 (모든 $p_i = 1/6$)

$$H(X) = - \sum_{i=1}^6 \frac{1}{6} \log_2 \frac{1}{6} = 6 \cdot \frac{1}{6} \log_2 6 = \log_2 6 \approx 2.585 \text{ bits}$$

2) 모든 눈이 6 인 주사위

$$p_6 = 1, p_i = 0 \text{ (for } i \neq 6) \Rightarrow H(X) = -1 \log_2 1 = 0$$

3) 짝수 눈이 나올 확률이 홀수 눈이 나올 확률의 2 배인 주사위 (짝수 각각 및 홀수 각각의 확률은 동일)

$$3 \cdot 2p + 3 \cdot p = 9p = 1 \Rightarrow p = \frac{1}{9} \quad H(X) = - \left(3 \cdot \frac{1}{9} \log_2 \frac{1}{9} + 3 \cdot \frac{2}{9} \log_2 \frac{2}{9} \right) = + \left(\frac{1}{3} \log_2 9 + \frac{2}{3} \log_2 \frac{9}{2} \right) = \frac{1}{3} \log_2 9$$

4) 1 이 나올 확률이 0.5, 나머지 눈이 나올 확률이 각각 0.1 인 주사위

$$H(X) = - (0.5 \log_2 0.5 + 5 \cdot 0.1 \log_2 0.1) = + (1.05 + 0.5 \log_2 10) \approx 2.16 \text{ bits}$$

$$+ \frac{2}{3} (\log_2 9 - 1) - \left(\frac{2}{3} + \log_2 9 \right) \text{ bits}$$

1-2 🍌: 임의의 이산확률변수 X 에 대하여 X 가 가질 수 있는 값의 집합을 $\mathcal{X}$ 라 합시다. 예를 들어, 동전을 1 회 던졌을 때의 $\mathcal{X} = \{Head, Tail\}$ 로 $|\mathcal{X}| = 2$ 입니다. 이때 엔트로피 $H(X)$ 가 가질 수 있는 값의 범위가 $0 \leq H(X) \leq \log_2 |\mathcal{X}|$ 임을 증명하세요.

- 💡 좌측 부등식의 경우, 확률 값의 성질을 활용해 증명 가능합니다.
- 💡 우측 부등식의 경우, 아래의 Jensen's Inequality를 활용해 증명 가능합니다.
 - Jensen's Inequality: $\mathbb{E}[f(X)] \geq f(\mathbb{E}[X])$ for a convex f , and $\mathbb{E}[f(X)] \leq f(\mathbb{E}[X])$ for a concave f
 - (Bonus Question: Jensen's Inequality는 어떻게 증명할까요? Hint: 수학적 귀납법으로 $n=2$ 부터...!)

i) $0 \leq H(X)$

if $p_i = 1, p_j = 0$
 $H(X) = -(1 \log_2 1 + 0 \log_2 0) = 0$

ii) $H(X) \leq \log_2 |\mathcal{X}|$

$H(X) = -\sum p_i \log_2 p_i = \mathbb{E}[-\log_2 p(X)] \quad (\because f(p) = -\log_2 p \text{ convex})$
 $\mathbb{E}[-\log_2 p] \leq -\log_2 \mathbb{E}[p]$
 $\leq -\log_2 \left(\sum p_i\right)$ 균등분포여야 최대.

$p(X) = \frac{1}{|\mathcal{X}|} \rightarrow H(X) = -\sum \frac{1}{|\mathcal{X}|} \log_2 \frac{1}{|\mathcal{X}|} = \log_2 |\mathcal{X}|$

1-3 🍌: 어떤 지역 주민들의 흡연 여부 (X)와 폐암 발병 여부 (Y)에 대한 설문 조사를 실시하여 다음과 같은 결합 확률 분포를 얻었다고 가정합니다. 여기서 $X = 1$ 은 폐암 발병, $X = 0$ 은 폐암 미발병을 의미하며, $Y = 1$ 은 흡연, $Y = 0$ 은 비흡연을 의미합니다. 아래 질문에 답해주세요.

$P(X, Y)$	$Y = 0$ (비흡연)	$Y = 1$ (흡연)
$X = 0$ (폐암 미발병)	0.45	0.15
$X = 1$ (폐암 발병)	0.1	0.3

$p(X=0) = 0.6$
 $p(X=1) = 0.4$

$p(Y=0) = 0.55$

$p(Y=1) = 0.45$

1) 폐암 발병 여부 X 와 흡연 여부 Y 의 엔트로피 $H(X)$, $H(Y)$ 를 계산하시오.

$H(X) = -(0.6 \log_2 0.6 + 0.4 \log_2 0.4) \approx 1.974 \text{ bits}$ $H(Y) = -(0.55 \log_2 0.55 + 0.45 \log_2 0.45) \approx 0.991 \text{ bits}$

2) X 와 Y 의 결합 엔트로피 $H(X, Y)$ 를 계산하시오.

$H(X, Y) = -(0.45 \log_2 0.45 + 0.15 \log_2 0.15 + 0.1 \log_2 0.1 + 0.3 \log_2 0.3) \approx 1.983 \text{ bits}$

3) 흡연 여부 Y 에 대한 정보가 주어졌을 때, 폐암 발병 여부 X 의 조건부 엔트로피 $H(X | Y)$ 를 계산하시오.

$H(X|Y) = H(X, Y) - H(Y) \approx 0.992 \text{ bits}$

4) 폐암 발병 여부 X 와 흡연 여부 Y 의 Mutual Information $I(X; Y)$ 를 계산하시오.

$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) \approx 0.199 \text{ bits}$

5) 4)의 결과로 나온 $I(X; Y)$ 의 의미를 통계적 관점에서 간략하게 해석하고,

$I(X; Y)$ 값이 0 일 경우와, $H(X)$ 와 같을 경우 각각 어떤 의미를 갖는지 설명하시오.

- 💡 엔트로피 계산 시 $\log$ 의 밑은 2로 계산하면 됩니다.
- 💡 단위는 비트(bits)를 이용하며, $\log$ 계산 값은 근사치로만 이용하시면 됩니다.

0.199 bits 만큼 $H(X|Y)$ 를 줄여 폐암 발병 여부 (X)에 대한 예측력이 생김
 $I(X; Y) = 0$ 이면 두 변수 독립,
 $I(X; Y) = H(X)$ 이면 두 변수 완전히 연관되어 있음

문제 2 | SVD and Data Compression

선형대수학은 머신러닝과 딥러닝의 원리를 수학적으로 분석하는 과정에서 사용되는 핵심적인 내용 중 하나로, 그 중에서도 가장 중요한 개념은 바로 SVD (Singular Value Decomposition, 특이값 분해) 입니다. SVD 를 이해하기 위해 우선 고유값과 고유벡터를 활용한 대각화 (Diagonalization)에 대해 알아보겠습니다.

2-1 📌: 대각화 (Diagonalization)의 정의와 계산 과정은 다음과 같습니다.

💡 정의: 임의의 정방행렬 A 를 고유값과 고유벡터를 통해 대각행렬의 형태로 선형 변환하는 과정이며, 이를 수식으로 표현하면 $D = P^{-1}AP$ 를 만족하는 대각행렬 D 를 찾는 것입니다. 만약 A 가 n 개의 독립인 고유벡터를 가지고 있다면 (= 가역이라면) A 는 대각화 가능하며, 이때 대각행렬의 원소는 A 의 고유값으로 구성됩니다.

💡 과정:

- 1) A 에 대한 고유값과 이에 대응하는 고유벡터를 찾은 후 각각 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 으로 놓습니다.
- 2) 고유벡터로 구성된 행렬 $P = [p_1, p_2, \dots, p_n]$ 을 만들고 $D = P^{-1}AP$ 을 구합니다.

다음 정방행렬을 대각화했을 때 나오는 대각행렬 D 와 고유벡터 행렬 P 를 각각 구하세요.

(I) 대각화

$$\begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ -1 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} \begin{matrix} (2-\lambda) \cdot ((2-\lambda)(1-\lambda)-0) \\ = (2-\lambda)^2(1-\lambda)=0 \\ \therefore \lambda=2, 1 \end{matrix} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(II) 고유벡터

$$\begin{matrix} \textcircled{1} \lambda=2 \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \textcircled{2} \lambda=1 \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad \therefore P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2-2 📌: (Optional) 대칭행렬이 직교대각화(Orthogonal Diagonalization)가 가능하다는 것은 필요충분조건이며, 이는 대칭행렬의 중요한 성질 중 하나입니다. 이를 증명하시오.

💡 직교대각화의 정의는 다음과 같습니다.

'정사각행렬 A 가 주어져있을 때, $P^{-1}AP = P^TAP$ 가 대각행렬이 되게 만드는 P 가 존재한다면, A 를 직교대각화 가능하다고 하고, P 가 A 를 직교대각화 한다고 한다.'

💡 직교대각화 -> 대칭행렬을 증명하는 과정은 위의 정의를 이용하면 됩니다.

💡 대칭행렬 -> 직교대각화를 증명하기 위해서는 아래의 내용들을 증명하면 됩니다.

- 1) 모든 성분이 실수인 대칭행렬은 실수 고유값만을 갖는다. (해당 내용은 그냥 이용해도 무방)
- 2) $n \times n$ 행렬 A 가 직교대각화 가능하다는 말은 A 가 서로 정규직교하는 n 개의 고유벡터들을 가진다는 말과 동치이다. -> 즉, 서로 다른 고유값에 대응하는 고유벡터들은 항상 서로 직교한다.
- 3) 각 고유값에 대해 대수적 중복도와 기하적 중복도가 항상 일치한다.

2-3 📌: 특이값 분해 (SVD, Singular Value Decomposition)은 대각화와 달리 모든 크기의 행렬에 대해 적용이 가능하며, 그 계산 과정은 다음과 같습니다.

- 💡 1) 항상 대칭 행렬을 이루는 두 행렬 $B^T B, B B^T$ 를 계산하고, 이들의 고유값을 계산해 특이값 σ 와 고유벡터를 통해 직교대각화하여 $B^T B = V D V^T, B B^T = U D U^T$ 를 구합니다.
2) 0 이 아닌 특이값들을 내림차순으로 나열하여 Σ 를 구성하고, 이들을 모두 활용해 $A = U \Sigma V^T$ 를 구합니다.

계산 방법에 대한 구체적인 과정은 다음의 영상 자료 ([링크](#))를 반드시 참고하여 문제를 풀어주세요.

다음 행렬에 특이값 분해를 적용하였을 때 나오는 행렬 U, Σ, V^T 를 각각 구하세요.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B^T B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 0 \rightarrow \sigma_1 = \sqrt{2}, \sigma_2 = 1$$

$$w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad w_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad v_3 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$u_1 = \frac{1}{\sigma_1} B w_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$u_2 = \frac{1}{\sigma_2} B w_2 = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow V = [u_1 \ u_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$B B^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1 \rightarrow \sigma_1 = \sqrt{3}, \sigma_2 = 1$$

$$w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad w_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$u_1 = \frac{1}{\sigma_1} B^T v_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

$$u_2 = \frac{1}{\sigma_2} B^T v_2 = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$\hat{u}_2 = e_3 - \left(\frac{u_1 \cdot e_3}{u_1 \cdot u_1} u_1 + \frac{u_2 \cdot e_3}{u_2 \cdot u_2} u_2 \right) = e_3 - (u_1 \cdot e_3) u_1 - (u_2 \cdot e_3) u_2$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

$$u_3 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/3 \end{bmatrix} \quad V = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{6} & 0 & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

$$B^T = V \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

문제 3 Optimization Theory

최적화는 다양한 분야에서 많이 쓰이는 개념이지만, 특히 머신러닝에서는 최적의 정답을 찾기 위해 필수적으로 사용되는 개념입니다. 정규세션으로 이를 간단하게 배워보았고, 직접 수식으로 문제를 풀어보며 해당 개념을 익히고자 합니다.

3-1 📌: 정규세션에서 살펴본 것과 같이, Logistic Regression 의 목적함수는 아래와 같습니다.

$$\min_w \sum_{i=1}^m \{-y^{(i)} \log(\hat{y}^{(i)}) - (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{y}^{(i)})\}$$

최적해를 구하기 위해서는 먼저 내부의 목적 함수가 convex function 인지 여부를 판단해야 합니다. 내부 목적 함수 $-y^{(i)} \log(\hat{y}^{(i)}) - (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{y}^{(i)})$ 가 convex function 임을 보이세요.

- 💡 $y^{(i)}$ 을 Logistic Function 식을 활용하면 $\hat{y}^{(i)} = \frac{1}{1+e^{-w^T x^{(i)}}}$ 과 같이 표현할 수 있습니다.
- 💡 목적 함수를 두 부분으로 나누어서 각각 Convex 하다는 것을 증명하면 됩니다.
- 💡 convexity 를 증명하기 위해서는 w 에 대해 2 번 미분하여, 0 보다 크다는 것을 보이면 됩니다.

$$L(w) = -y^{(i)} \log(\hat{y}^{(i)}) - (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{y}^{(i)})$$

$$\nabla_w L(w) = (\hat{y} - y) x$$

$$\nabla_w^2 L(w) = \hat{y} (1 - \hat{y}) x x^T \geq 0$$

3-2 📌: Minimization 에 대한 Gradient Descent Algorithm 은 아래와 같습니다.

$$\min_{x \in X} f(x)$$

$$x_{t+1} = x_t - \gamma \nabla_x f(x_t)$$

$\nabla_x f(x_t)$: $f(x_t)$ 에 대해서 x_t 지점에서 미분한 값

다음과 같은 Loss function 과 시작점에서 $t = 2$ 일 때 나오는 값, 즉 x_2 의 값을 구하세요.

$$f(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + x$$

$$x_0 = 1, \quad \gamma = 0.2$$

$$f'(x) = 4x^3 - 6x^2 - 6x + 1$$

$$x_{t+1} = x_t - \gamma f'(x_t)$$

$$t=0, \quad x_0=1$$

$$f'(1) = 4 - 6 - 6 + 1 = -7$$

$$x_1 = x_0 - 0.2(-7) = 2.4$$

$$t=1, \quad x_1=2.4$$

$$f'(2.4) = 4(2.4)^3 - 6(2.4)^2 - 6(2.4) + 1 = 7.336$$

$$x_2 = x_1 - 0.2(7.336) = 0.9328$$

$$\therefore x_2 \approx 0.9328$$

3-3 📌: 라그랑주 승수법은 아래와 같습니다.

💡 라그랑주 승수(Lagrange Multiplier)는 제약 조건이 있는 최적화 문제를 제약 조건이 없는 문제로 변환하여 최적해를 찾기 위한 보조 변수를 말합니다. 제약 조건이 없을 때는 단순히 $\nabla f(x)=0$ 으로 최적점을 찾을 수 있지만, 제약조건 $g(x)$ 가 있을 때는 최적해는 제약을 만족하면서 $f(x)$ 를 최소화하는 지점이 되어야 합니다. 이를 위해 제약 조건과 목적함수를 결합한 새로운 함수 (lagrangian)을 만들고, 그 stationary point 를 찾아서 목적함수 최적화와 제약 만족을 동시에 달성할 수 있습니다.

제약 조건이 있는 최적화 문제:

$$\min_x f(x) \quad \text{subject to } g(x) = 0$$

→ 이를 다음과 같은 Lagrangian 함수로 바꿉니다:

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda \cdot g(x)$$

25-2 Mathematics for ML #2 세션 자료 中

사진의 λ 가 라그랑주 승수입니다. 제약조건을 penalty 처럼 반영하여 이를 만족시키는 해를 찾아낼 수 있습니다.

다음 조건을 만족하는 $f(x, y)$ 의 최솟값을 라그랑주 승수법을 이용해 구하세요.

$$\min f(x, y) = x^2 + y^2 \quad \text{s.t. } x + y \geq 2$$

1) 주어진 목적 함수와 제약 조건을 이용하여 lagrangian $L(x, y, \lambda)$ 을 설정하세요.

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(2 - x - y)$$

2) $L(x, y, \lambda)$ 을 각 변수에 대해 편미분하고, 그 값이 0 이 되는 stationary point 조건을 제시하세요.

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x - \lambda = 0 \Rightarrow 2x = \lambda \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - \lambda = 0 \Rightarrow 2y = \lambda \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 2 - x - y = 0 \Rightarrow x + y = 2$$

3) 위에서 얻은 조건들을 만족하는 x, y, λ 의 값을 계산하세요.

$$x = \frac{\lambda}{2} \quad y = \frac{\lambda}{2} \quad \boxed{\lambda = 2 \quad x = 1 \quad y = 1}$$

4) 구한 $f(x, y)$ 값을 목적함수 $f(x, y)$ 에 대입하여 최솟값을 계산하세요.

$$f(x, y) = x^2 + y^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

Reference

- 24-1 기초과제 2 (10 기 신재우)
- 24-2 기초과제 (11 기 김현진, 김정우)
- 25-1 Mathematics for ML 과제 (12 기 김민규)
- Information Theory for Data Science, Prof. Son, Fall 2024, Yonsei Univ.

Data Science Lab

담당자: 13 기 조지성
xiwang01@yonsei.ac.kr