Idiochelys fitzingeri




Groupe	Espèce éteinte de tortue marine
Période de vie	Jurassique supérieur (Tithonien), il y a environ 150 millions d'années
Milieu de vie	Lagune, eau peu profonde
Informations diverses	Cette tortue fossile est connue surtout par sa carapace. Comme les tortues actuelles, elle respirait à l'air libre mais passait une grande partie de son temps dans l'eau.

Ankylophorus similis



Groupe	Espèce éteinte de poisson à nageoires rayonnées
Période de vie	Jurassique supérieur (Kimméridgien), il y a environ 150 millions d'années
Milieu de vie	Lagune tropicale peu profonde
Informations diverses	Les écailles se voient encore très bien sur le fossile : elles formaient une véritable armure. Les anciens échantillons de musée portent parfois un autre nom : « *Pholidophorus similis* ».

Atoposaurus jourdani




Groupe	Espèce éteinte de petits reptiles crocodyliformes
Période de vie	Jurassique supérieur (Kimméridgien à Tithonien), il y a environ 150 millions d'années
Milieu de vie	Bords de lagune, zones calmes, chaudes et humides
Informations diverses	Malgré son apparence, il est plus proche des crocodiles que des lézards. Ce reptile semi-aquatique mesurait au maximum une vingtaine de centimètres. Contrairement à d'autres membres de sa famille, le genre Atoposaurus se distinguait par l'absence de plaques osseuses protectrices sur son dos.

Belemnobatis sismondae



Groupe	Espèce éteinte de raie
Période de vie	Jurassique supérieur (Kimméridgien), il y a environ 150 millions d'années
Milieu de vie	Environnement marin, peu profond et chaud
Informations diverses	Comme chez les raies actuelles, les nageoires pectorales formaient un large disque. Cette raie au corps aplati vivait au fond de l'eau. Sa forme l'aidait à se déplacer près du sol et à surprendre ses proies.

Belonostomus tenuirostris



Échantillon : Musée des Confluences, Lyon

Groupe	Poisson fossile à nageoires rayonnées
Période de vie	Jurassique supérieur (Kimméridgien), il y a environ 150 millions d'années
Milieu de vie	Lagune et mer peu profonde
Informations diverses	Tenuirostris, signifie « au rostre fin ». Ce poisson très allongé, se caractérise par un rostre très long et pointu. Ce spécimen mesurait environ 33 cm de long.

Pentasteria lithographica



Groupe	Espèce fossile d'étoile de mer appartenant à la famille des Astropectinidés
Période de vie	Jurassic supérieur (Kimméridgien terminal Tithonien inférieur), il y a environ 150 millions d'années
Milieu de vie	Milieu marin chaud, peu profond et calme
Informations diverses	Les étoiles de mer n'ont pas de cerveau central, mais elles sont capables de se déplacer et de se nourrir efficacement

Diadematacea sp.



Groupe	Fossile d'oursin
Période de vie	Jurassique inférieur (200 millions d'années) à aujourd'hui
Milieu de vie	Fond marin ou zone lagunaire peu profonde et chaude
Informations diverses	Cet oursin portait de longues épines. Comme les oursins actuels, il se déplaçait lentement sur le fond et se nourrissait de petits débris ou d'algues.

Eryon arctiformis



Groupe	Espèce éteinte de crustacé décapode de la famille des Eryonidés
Période de vie	Jurassique supérieur, il y a environ 150 millions d'années
Milieu de vie	Des lagunes tropicales et des mers peu profondes
Informations diverses	Eryon était un crustacé à carapace plate vivant près du fond. Il fouillait probablement les sédiments pour trouver sa nourriture.

Crocodilaemus robustus



Groupe	Espèce éteinte de petit crocodile semi-aquatique appartenant à la famille des Pholidosauridés
Période de vie	Jurassique supérieur (Kimméridgien), il y a environ 150 millions d'années
Milieu de vie	Lagune tropicale peu profonde, chaude et sèche
Informations diverses	Ce reptile ressemblait à un petit crocodile cuirassé. Ses plaques osseuses protégeaient son dos et son corps semblait bien adapté à une vie amphibie.

Cycadopteris jurensis



Groupe	Espèce de fougère à graines
Période de vie	Jurassique supérieur, il y a environ 150 millions d'années
Milieu de vie	Milieu terrestre
Informations diverses	Ses frondes ressemblent fortement à celles des fougères classiques avec des folioles disposées le long d'un axe principal, mais la plante produisait de véritables graines et possédait une cuticule coriace


Pagiophyllum sp.



Échantillon : Musée des Confluences, Lyon

Groupe	Conifères
Période de vie	Du Carbonifère au Crétacé, il y a environ 300 à 66 millions d'années.
Milieu de vie	Lagunes tropicales et environnements côtiers
Informations diverses	Pagiophyllum est conifères fossiles caractérisé par un feuillage écailleux et épaissi. Il pouvait s'adapter aussi bien aux milieux tropicaux arides qu'à des zones plus tempérées et humides.

Euposaurus thiollierei



Groupe	Espèce éteinte de reptile lépidosaurien
Période de vie	Jurassique supérieur (Kimméridgien), il y a environ 150 millions d'années
Milieu de vie	Terres et plages environnants les lagunes
Informations diverses	Le seul fossile de cet animal ayant été trouvé à Cerin (dans l'Ain), cet animal s'appelait autrefois : *Euposaurus cirinensis*. Les petits reptiles sont rarement conservés entiers : ce fossile de Cerin est donc tout à fait remarquable.

Solanocrites thiollierei



Groupe	Espèce éteinte de comatule appartenant à la classe des crinoïdes
Période de vie	Du Jurassique supérieur au Crétacé, il y a environ 150 à 66 millions d'années.
Milieu de vie	Mers chaudes, peu profondes et agitées
Informations diverses	Elle utilisait de petits crampons préhensiles articulés (appelés cirres) pour s'agripper temporairement aux roches ou au substrat. En position ancrée, elle déployait ses bras dans le courant pour capturer le plancton et les particules organiques en suspension.

Zamites fenoanis



Groupe	Arbuste fossile éteint de la famille des Bennettitales
Période de vie	Jurassique supérieur (Tithonien), vers 150 Ma
Milieu de vie	Rives et îlots émergés
Informations diverses	Cette belle empreinte de feuille montre que la végétation était bien présente autour des lagunes. Les plantes fossiles sont essentielles pour reconstituer les paysages du passé.