

## Mathematics (2) Assignment

### 25-2 기초 데이터 분석 및 실습

#### Problem 1.

벡터  $x = (2, 1, 0), y = (1, -2, 1)$ 에 대해

1.  $\langle x, y \rangle$ 를 계산하시오.  $2 \cdot 1 + 0 = 0$ .
2. 두 벡터는 직교하는가?  $00$
3. 두 벡터 사이 각도를  $w$ 라고 할 때,  $\cos w$ 를 구하시오.  $0$ .

$$\cos w = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|} = 0.$$

#### Problem 2.

벡터 집합  $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ 에 대해 Gram-Schmidt 과정을 적용하여 직교정규 기저를 구하시오.

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad a_2 = a_2 - (q_1^T a_2) q_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

#### Problem 3.

데이터 벡터  $y = (1, 2, 2)^T$ 와 기저  $u_1 = (1, 0, 0)^T, u_2 = (0, 1, 1)^T$ 가 Span하는 부분공간  $U$ 가 있다.

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad \hat{y} = Q(Q^T Q)^{-1} Q^T y = Q Q^T y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

1.  $y$ 를  $U$  위로 직교투영한 벡터  $\hat{y}$ 를 구하시오.
2. 잔차  $r = y - \hat{y}$ 가  $U$ 에 직교함을 보이시오.  $r \cdot \hat{y} = 0, \quad u_1 \cdot r = u_2 \cdot r = 0.$
3. 이 과정을 "최소제곱 회귀"의 관점에서 해석하시오.

$$\min \|Ux - y\| \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

#### Problem 4.

다변수 함수  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ 에 대하여,

1.  $\nabla f(x, y)$ 를 구하시오.
2. 점  $(1, 2)$ 에서의 그래디언트를 구하고, 해당 벡터가 의미하는 바를 설명하시오.
3. 방향벡터  $u = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ 에 대한 방향도함수를 구하시오.

$$1. \nabla f = \langle 2x+y, x+2y \rangle$$

$$2. \nabla f(1, 2) = \langle 4, 5 \rangle \quad (4, 5) \text{ 방향의 가장 빠른 증가}$$

$$D_u f = \nabla f \cdot u = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle 2x+y, x+2y \rangle \cdot \langle 1, 1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (3x+3y)$$

### Problem 5.

1. 함수  $f(x) = e^x$ 를  $a = 0$ 에서 2차 테일러 다항식으로 근사하시오.
2. 함수  $g(x, y) = x^2 + y^2$ 를  $(0, 0)$ 에서 2차 테일러 전개로 근사하시오.
3. 이러한 근사가 경사하강법(gradient descent)과 뉴턴 방법(Newton's method)에서 어떻게 활용되는지 찾고 서술하시오.

$$1) f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)x^n}{n!} \quad e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

$$2) g(x, y) \approx g(a, b) + \nabla g \begin{bmatrix} x-a \\ y-b \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x-a & y-b \end{bmatrix} H_g(a, b) \begin{bmatrix} x-a \\ y-b \end{bmatrix}$$

$$H_g = \begin{bmatrix} g_{xx} & g_{xy} \\ g_{yx} & g_{yy} \end{bmatrix}, \quad g(x, y) = 0 + 0 \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} H_g(0, 0) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x^2 + y^2$$

3) 어떤 함수  $f$ 를 최소로 만드는  $x, y, \dots$ 를 찾을 때 그레디언트  $f$  방향의 반대 방향으로 이동하는 방법이 경사하강법이라고 한다. 이때  $f$ 가 복잡할수록 그레디언트  $f$ 를 구하는게 힘들니 1차 근사를 통해 방향을 알아낸다고 한다. 뉴턴 방법은 어떤 함수에 대한 방정식  $f = 0$ 의 해를 수치적으로 찾을 때 쓰인다고 한다. 역시  $f$ 가 복잡할수록 미분하는데 비용이 많이 드니깐 근사로 식을 단순하게 만들어 계산한다고 한다.