

Mathematics (2) Assignment

25-2 기초 데이터 분석 및 실습

Problem 1.

벡터 $x = (2, 1, 0), y = (1, -2, 1)$ 에 대해

1. $\langle x, y \rangle$ 를 계산하시오. $\langle x, y \rangle = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + 0 \cdot 1 = 0$
2. 두 벡터는 직교하는가? $\langle x, y \rangle$ 가 0이므로 두 벡터는 직교한다.
3. 두 벡터 사이 각도를 w 라고 할 때, $\cos w$ 를 구하시오.

$$\cos w = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} = \frac{0}{\|x\| \|y\|} = 0$$

Problem 2.

벡터 집합 $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ 에 대해 Gram-Schmidt 과정을 적용하여 직교정규 기저를 구하시오.

$$u_1 = v_1 = (1, 1, 0) \quad e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0) \quad u_2 = v_2 - \text{proj}_{u_1}(v_2)$$

$$v_2 = (1, 0, 1) \quad \text{proj}_{u_1}(v_2) = \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 0)$$

Problem 3.

$$u_2 = (1, 0, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1) \quad e_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1) = (\frac{1}{2\sqrt{3}}, -\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$$

데이터 벡터 $y = (1, 2, 2)^T$ 와 기저 $u_1 = (1, 0, 0)^T, u_2 = (0, 1, 1)^T$ 가 Span하는 부분공간 U 가 있다. $\langle u_1, u_2 \rangle = 0$ 이므로, u_1, u_2 는 서로 직교한다.

1. y 를 U 위로 직교투영한 벡터 \hat{y} 를 구하시오. $\hat{y} = (1, 0, 0)^T + (0, 2, 2)^T = (1, 2, 2)^T = y$
2. 잔차 $r = y - \hat{y}$ 가 U 에 직교함을 보이시오. $r = y - \hat{y} = (1, 2, 2)^T - (1, 2, 2)^T = (0, 0, 0)^T$
3. 이 과정을 "최소제곱 회귀"의 관점에서 해석하시오.
 최소제곱 회귀는 $\|y - \hat{y}\|^2$ 를 0으로 만드는 $\hat{y} \in U$ 를 찾는 과정이다.
 이때 회귀선의 잔차가 잔차 $r = y - \hat{y}$ 가 U 의 모든 벡터에 직교한다는 것인데,
 이 경우 $r = (0, 0, 0)^T$ 이므로, 최소제곱 회귀는 0이 된다.

Problem 4.

다변수 함수 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ 에 대하여,

1. $\nabla f(x, y)$ 를 구하시오. $\nabla f(x, y) = (2x+y, x+2y)$
2. 점 $(1, 2)$ 에서의 그래디언트를 구하고, 해당 벡터가 의미하는 바를 설명하시오.
3. 방향벡터 $u = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ 에 대한 방향도함수를 구하시오.

$$2. \nabla f(1, 2) = (4, 5)$$

$\nabla f(1, 2)$ 는 점 $(1, 2)$ 에서 f 의 값이 가장 빠르게 증가하는 방향을 나타낸다.

$$\|\nabla f(1, 2)\| = \sqrt{16+25} = \sqrt{41} \text{은 해당 방향으로의 최대 변화율이 된다.}$$

$$3. D_u f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \vec{u}$$

$$= (2x+y, x+2y) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$$

$$= \frac{2x+y}{\sqrt{2}} + \frac{x+2y}{\sqrt{2}} = \frac{3x+3y}{\sqrt{2}}$$

$$D_u f(1, 2) = \frac{3+6}{\sqrt{2}} = \frac{9}{\sqrt{2}}$$

Problem 5.

1. 함수 $f(x) = e^x$ 를 $a = 0$ 에서 2차 테일러 다항식으로 근사하시오.
2. 함수 $g(x, y) = x^2 + y^2$ 를 $(0, 0)$ 에서 2차 테일러 전개로 근사하시오.
3. 이러한 근사가 경사하강법(gradient descent)과 뉴턴 방법(Newton's method)에서 어떻게 활용되는지 찾고 서술하시오.

$$1. P_2(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2$$

$$f(x) = e^x, f'(x) = e^x, f''(x) = e^x$$

$$f(0) = 1, f'(0) = 1, f''(0) = 1$$

$$\therefore P_2(x) = 1 + 1(x-0) + \frac{1}{2}(x-0)^2 \\ = 1 + x + \frac{1}{2}x^2$$

$$2. P_2(x, y) \approx g(a, b) + \nabla g(a, b) \cdot (x-a, y-b) + \frac{1}{2} [x-a, y-b] H_g(a, b) [x-a, y-b]^T$$

$$a=0, b=0 \text{ 때 } \underline{\underline{!}}$$

$$g(0,0) = 0$$

$$\nabla g(x, y) = (2x, 2y) \Rightarrow \nabla g(0,0) = (0,0)$$

$$g_{xx} = 2, g_{xy} = 0, g_{yy} = 2$$

$$\Rightarrow H_g(0,0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$P_2(x, y) = 0 + (0,0) \cdot (x,y) + \frac{1}{2} [x,y] \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} [2x \ 2y] \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$= x^2 + y^2$$

3. 경사 하강법은 1차 테일러 근사는 사용하며, 현재 위치 x_k 에서 함수를 선형으로 근사한다. 이 선형 근사 함수에서 가장 빠르게 감소하는 방향($-\nabla f(x_k)$ 방향)으로 일정한 α (학습률)만큼 이동한다.

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k)$$

뉴턴 방법은 2차 테일러 근사는 사용하며, 현재 위치 x_k 에서 함수를 2차 함수로 근사한다.

경사를 따라 조금씩 이동하는 방식이 아니라, 근사된 2차 함수의 최소 지점으로 한 번에 접근하는 방식이다.

해당 최소 지점은 근사 함수의 2차 미분값을 0으로 만드는 지점이다.

$$x_{k+1} = x_k - [H_f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k)$$