

3.9.1

Sterblichkeitsrate infolge von Verschmutzung der Raum- und Außenluft
Feinstaubbedingte Krankheitslast (als Summe aller Erkrankungen)

Jahr	Attributable Todesfälle zurückzuführen auf eine langfristige Exposition mit Feinstaub (PM _{2,5}) in der Bevölkerung ab 25 Jahren (KI; obere/untere Schätzer)	DALYs zurückzuführen auf eine langfristige Exposition mit Feinstaub (PM _{2,5}) in der Bevölkerung ab 25 Jahren (KI; obere/untere Schätzer)
2010	14 073 - 28 060	265 001 - 511 500
2011	13 788 - 27 425	258 661 - 498 293
2012	11 547 - 23 593	215 693 - 427 840
2013	12 388 - 25 127	231 097 - 454 891
2014	11 395 - 23 131	216 255 - 426 240
2015	10 836 - 22 316	202 522 - 405 713
2016	10 147 - 20 950	191 515 - 385 072
2017	10 261 - 21 223	190 766 - 384 495
2018	10 390 - 21 466	194 265 - 391 112

Datenquelle: Umweltbundesamt (UBA)

Geographische Abdeckung: Deutschland

Einheit: Anzahl, DALY

Anmerkung: KI: Konfidenzintervall.

Der obere und untere Schätzer stellen die Unsicherheit der Berechnung basierend auf dem Relativen Risiko dar.

Anzahl attributabler Todesfälle: Anzahl der krankheitsspezifischen Todesfälle zurückzuführen auf eine langfristige Feinstaubbelastung.

Disability-Adjusted Life Years (DALYs): Anzahl der krankheitsspezifisch durch Mortalität und Morbidität verlorenen Lebensjahre zurückzuführen auf eine langfristige Feinstaubbelastung (PM_{2,5}).

Copyright: © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangaben gestattet.