SDG Ziel 3	Gesundheit und Wohlergehen
SDG Unterziel 3.4	Bis 2030 die vorzeitige Sterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen fördern
SDG Indikator 3.4.1	Sterblichkeitsrate infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems, bösartigen Neubildungen, Diabetes mellitus oder chronischen Atemwegserkrankungen
Zeitreihe	Sterblichkeitsrate infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems, bösartigen Neubildungen, Diabetes mellitus oder chronischen Atemwegserkrankungen

1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe
   - Stand der nationalen Metadaten: 16. Juli 2026
   - Nationale Daten: https://sdg-indikatoren.de/3-4-1
   - Definition: Die Zeitreihe stellt die Wahrscheinlichkeit dar, im Alter von 30 bis unter 70 Jahren an a) Krankheiten des Kreislaufsystems, b) bösartigen Neubildungen, c) Diabetes mellitus oder d) chronischen Atemwegserkrankungen zu sterben.

     Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage der ICD-10-Codes. Die ICD-10 ist die 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. In ihrer deutschen Modifikation (ICD-10-GM) dient sie als amtliche Klassifikation zur Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung in Deutschland.

     Folgende ICD-10-Codes werden berücksichtigt:
     I00-I99: a) Krankheiten des Kreislaufsystems
     C00-C97: b) Bösartige Neubildungen
     E10-E14: c) Diabetes mellitus
     J30-J98: d) Chronische Atemwegserkrankungen

   - Disaggregation: Geschlecht, Art der Erkrankung

2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten
   - Stand der UN-Metadaten: Dezember 2024
   - UN-Metadaten: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-04-01.pdf
   - Die Zeitreihe entspricht den UN-Metadaten.

3. Beschreibung der Daten
   - Die Anzahl der Sterbefälle stammt aus der Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes und basiert auf der Auswertung der von Ärztinnen und Ärzten ausgestellten Todesbescheinigungen.

Für die Berechnung werden die Daten der zurückgerechneten Durchschnittsbevölkerung des Statistischen Bundesamtes verwendet. Für das Jahr 2010 basiert sie auf dem Zensus 2011 sowie den Wanderungs-, Geburten- und Sterbestatistiken; für die Jahre 2012 bis 2021 erfolgte die Berechnung entsprechend auf Grundlage des Zensus 2022.

4. Link zur Datenquelle
   - GBE – Tabelle: Sterbefälle, Sterbeziffern [Einstellungen: Hierarchie: ICD-10 A00-T98 (3-Steller); ICD10: C00-C97, E10-E14, I00-I99, J30-J98; Alter: 30 bis unter 35 Jahre, ..., 65 bis unter 70 Jahre]: https://www.gbe-bund.de/gbe/isgbe.fundstellen?p_uid=gast&p_aid=99629820&p_sprache=D&p_thema_id=3900&p_action=TRT#wrap
   - Durchschnittliche Bevölkerung: GENESIS online 12411-0041: https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12411-0041
   - Rückgerechnete und fortgeschriebene Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2022: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/_inhalt.html#sprg233540

5. Metadaten zur Datenquelle
   - Qualitätsbericht – Todesursachenstatistik: https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Gesundheit/todesursachen.pdf

6. Aktualität und Periodizität
   - Aktualität: t + 8,5 Monate
   - Periodizität: Jährlich

7. Berechnungsmethode
   - Maßeinheit: Prozent
   - Berechnung:

$$\text{Sterblichkeitsrate} = 1 - \prod_{x = 30;35;40;...65} (1 - q_x)$$

Mit:
Sterbewahrscheinlichkeit je Altersgruppe x = q_x

$$q_x = \frac{5 \cdot {}^{D_x}/_{N_x}}{1 + 2{,}5 \cdot {}^{D_x}/_{N_x}}$$

Mit:
Dx = Bevölkerung Altersgruppe x
Nx = Todesfälle Altersgruppe x