

SDG Ziel 3 Gesundheit und Wohlergehen

SDG Unterziel 3.4 Bis 2030 die vorzeitige Sterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen fördern

SDG Indikator 3.4.1 Sterblichkeitsrate infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems, bösartigen Neubildungen, Diabetes mellitus oder chronischen Atemwegserkrankungen

Zeitreihe Sterblichkeit im Alter von 30 bis unter 70 Jahren

1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe

- Stand der nationalen Metadaten: 30. April 2026
- Nationale Daten: <https://sdg-indikatoren.de/3-4-1>
- Definition: Die Zeitreihe stellt die Anzahl der Sterbefälle im Alter von 30 bis unter 70 Jahren in 1 000 dar.

Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage der ICD-10-Codes. Die ICD-10 ist die 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. In ihrer deutschen Modifikation (ICD-10-GM) dient sie als amtliche Klassifikation zur Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung in Deutschland. Folgende ICD-10-Codes werden berücksichtigt:

- a) Krankheiten des Kreislaufsystems: **I00-I99**
- b) Bösartige Neubildungen: **C00-C97**
- c) Diabetes mellitus: **E10-E14**
- d) Chronische Atemwegserkrankungen **J30-J98**

- Disaggregation: Geschlecht, Art der Erkrankung

2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten

- Stand der UN-Metadaten: Dezember 2024
- UN-Metadaten: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-04-01.pdf>
- Die Zeitreihe entspricht nicht den UN-Metadaten, bietet aber zusätzliche Informationen.

Sie enthält nur die Anzahl der an den genannten Krankheiten verstorbenen Personen in einer bestimmten Altersklasse. Demgegenüber erfassen die UN-Metadaten die Sterbewahrscheinlichkeit im Alter zwischen 30 und 70 Jahren, die mithilfe von Sterbetafeln berechnet wird. Diese Wahrscheinlichkeit ist definiert als der prozentuale Anteil der 30-jährigen Personen, die vor Vollendung des 70. Lebensjahres an den genannten Krankheiten sterben würden.

3. Beschreibung der Daten

- Die Anzahl der Sterbefälle stammt aus der Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes und basiert auf der Auswertung der von Ärztinnen und Ärzten ausgestellten Todesbescheinigungen.

4. Link zur Datenquelle

- GBE – Tabelle: Sterbefälle, Sterbeziffern [Einstellungen: Hierarchie: ICD-10 A00-T98 (3-Steller); ICD10: COO-C97, E10-E14, I00-I99, J30-J98; Alter: 30 bis unter 35 Jahre, ..., 65 bis unter 70 Jahre]:
https://www.gbe-bund.de/gbe/isgbe.fundstellen?p_uid=gast&p_aid=99629820&p_sprache=D&p_thema_id=3900&p_action=TRT#wrap

5. Metadaten zur Datenquelle

- Qualitätsbericht – Todesursachenstatistik:
<https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Gesundheit/todesursachen.pdf>

6. Aktualität und Periodizität

- Aktualität: t + 8,5 Monate
- Periodizität: Jährlich

7. Berechnungsmethode

- Maßeinheit: Anzahl in 1 000
- Berechnung:

$$\text{Sterblichkeit im Alter von 30 bis unter 70 Jahren}_i = \frac{\sum_k \text{Sterbefälle im Alter von 30 bis unter 70 Jahren infolge einer Krankheit mit zugeordneter ICD}_{ki} [\text{Anzahl}]}{1\,000}$$

Mit: $i \in \{\text{Krankheiten des Kreislaufsystems; Bösartige Neubildungen; Diabetes mellitus; Chronische Atemwegserkrankungen}\}$

$k_{\text{Krankheiten des Kreislaufsystems}} \in \{I00; \dots; I99\}$

$k_{\text{Bösartige Neubildungen}} \in \{C00; \dots; C97\}$

$k_{\text{Diabetes mellitus}} \in \{E10; \dots; E14\}$

$k_{\text{Chronische Atemwegserkrankungen}} \in \{J30; \dots; J98\}$