

3.13 Malignes Melanom der Haut

Tabelle 3.13.1
Übersicht über die wichtigsten epidemiologischen Maßzahlen für Deutschland, ICD-10 C43

Inzidenz	2021		2022		2023	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Neuerkrankungen	12.350	13.790	12.810	14.230	12.960	14.470
rohe Neuerkrankungsrate ¹	29,3	33,6	30,4	34,7	30,7	35,3
standardisierte Neuerkrankungsrate ^{1, 2}	20,7	22,3	21,0	22,9	21,1	22,9
mittleres Erkrankungsalter ³	63	68	64	69	64	69
Mortalität	2021		2022		2023	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Sterbefälle	1.236	1.692	1.293	1.853	1.318	1.851
rohe Sterberate ¹	2,9	4,1	3,1	4,6	3,1	4,5
standardisierte Sterberate ^{1, 2}	1,4	2,4	1,5	2,6	1,5	2,6
mittleres Sterbealter ³	78	76	78	77	78	76
Prävalenz und Überlebensraten		5 Jahre	10 Jahre		25 Jahre	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Prävalenz	55.700	58.600	100.400	100.600	185.500	164.300
absolute Überlebensrate (2021 – 2023) ⁴	86	78	77	63		
relative Überlebensrate (2021 – 2023) ⁴	96	94	96	95		

¹ je 100.000 Personen ² altersstandardisiert nach alter Europabevölkerung ³ Median ⁴ in Prozent

Epidemiologie

Das maligne Melanom gehört zu den aggressivsten Formen des Hautkrebses mit hohem Metastasierungspotenzial und trat im Jahr 2023 in Deutschland bei rund 27.430 Personen auf, darunter 12.960 Frauen. Die altersstandardisierte Erkrankungsrate ist seit 1999 bei beiden Geschlechtern angestiegen wohingegen sich die Sterberate kaum verändert hat. Frauen erkranken im Mittel mit 64 Jahren und damit früher als Männer, deren durchschnittliches Erkrankungsalter bei 69 Jahren liegt. 67 % der Melanome mit dokumentiertem UICC-Stadium werden im Frühstadium diagnostiziert. Die häufigste Lokalisation bei weiblichen Patienten ist an den unteren Extremitäten zu beobachten, während bei männlichen Patienten überwiegend der Rumpf betroffen ist. Das superfiziell spreitende Melanom, die häufigste Form des malignen Melanoms, weist bei frühzeitiger Diagnose und geringer Tumordicke eine günstige Prognose auf, während das noduläre Melanom aufgrund seines raschen invasiven Wachstums mit einer ungünstigeren Prognose assoziiert ist. Die derzeitigen relativen 5-Jahres-Überlebensraten beim malignen Melanom der Haut betragen in Deutschland 96 % für Frauen und 94 % für Männer.

Risikofaktoren und Früherkennung

Wichtigster exogener Risikofaktor für ein malignes Melanom ist die ultraviolette (UV-)Strahlung, vor allem die wiederkehrende intensive Sonnenbelastung. Dies gilt sowohl für die natürliche Strahlung durch die Sonne als auch für künstliche UV-Strahlung zum Beispiel im Solarium. Sonnenbrände vor allem in jungen Jahren erhöhen das Risiko.

Zu den wichtigsten angeborenen Risikofaktoren gehören bereits bei der Geburt vorhandene, besonders große Pigmentmale (»Leberflecken«) und ein heller Hauttyp. Wenn man selbst schon einmal an einem Melanom erkrankt war, erhöht sich das Risiko, ein weiteres Melanom zu bekommen. Ist mindestens ein Verwandter ersten Grades an einem malignen Melanom erkrankt, kann dies auf ein familiär erhöhtes Risiko durch ererbte Mutationen hindeuten. Abhängig von der Art der Mutation und dem betroffenen Gen kann das Risiko für ein Melanom unterschiedlich stark erhöht sein. Ein bedeutsamer Risikofaktor ist auch die Anzahl gutartiger Pigmentmale, die im Laufe des Lebens aufgetreten sind, sowie das Vorkommen atypischer (dysplastischer) Pigmentmale.

Das gesetzliche Krebsfrüherkennungsprogramm sieht für Frauen und Männer ab dem Alter von 35 Jahren alle zwei Jahre eine Hautuntersuchung durch eine Ärztin oder einen Arzt (u. a. Dermatologe oder Hausarzt mit entsprechender Fortbildung) vor.

Abbildung 3.13.1a

Altersstandardisierte Neuerkrankungs- und Sterberaten nach Geschlecht, ICD-10 C43, Deutschland 1999 – 2023
je 100.000 (alter Europastandard)




Abbildung 3.13.1b

Absolute Zahl der Neuerkrankungs- und Sterbefälle nach Geschlecht, ICD-10 C43, Deutschland 1999 – 2023




Abbildung 3.13.2

Altersspezifische Neuerkrankungsraten nach Geschlecht, ICD-10 C43, Deutschland 2021 – 2023
je 100.000




Abbildung 3.13.3

Verteilung der malignen Melanome der Haut nach Körperregion und Geschlecht, ICD-10 C43, Deutschland 2021 – 2023




Abbildung 3.13.4

Prozentuale Verteilung der UICC-Stadien bei Erstdiagnose nach Geschlecht, ICD-10 C43, Deutschland 2021 – 2023

(oben: inkl. fehlender Angaben und DCO-Fälle; unten: nur gültige Werte)




Abbildung 3.13.5

Relatives 5-Jahres-Überleben nach Histologie und Geschlecht, ICD-10 C43, Deutschland 2021 – 2023




Abbildung 3.13.6

Relatives 5-Jahres-Überleben nach UICC-Stadium (8. Auflage TNM) und Geschlecht, ICD-10 C43, Deutschland 2021 – 2023




Abbildung 3.13.7

Altersstandardisierte Neuerkrankungsraten für Erwachsene über 20 Jahre in Deutschland nach NUTS-2-Regionen und Geschlecht, ICD-10 C43, 2021 – 2023
je 100.000 (alter Europastandard)




Abbildung 3.13.8

Altersstandardisierte Sterberaten in Deutschland nach NUTS-2-Regionen und Geschlecht, ICD-10 C43, 2020 – 2022
je 100.000 (alter Europastandard)

