

Obtención de la Transformada Z por Integral de Convolución

La evaluación de la integral de convolución en el semiplano izquierdo permite disponer de la transformada Z de una función de TD a partir de la transformada de Laplace de función de tiempo continuo correspondiente. Para esto se considera:

$$F(z) = \sum \left\{ \text{residuos de } \frac{F(s) z}{z - e^{Ts}} \text{ en los polos de } F(s) \right\}$$

Si el polo p_i es simple, entonces el residuo es:

$$K_i = \lim_{s \rightarrow p_i} \left\{ (s - p_i) F(s) \frac{z}{z - e^{Ts}} \right\}$$

Si el polo p_i es múltiple (de grado n_i) entonces:

$$K_i = \lim_{s \rightarrow p_i} \left\{ \frac{1}{(n_i - 1)!} \frac{d^{n_i-1}}{ds^{n_i-1}} \left[(s - p_i)^{n_i} F(s) \frac{z}{z - e^{Ts}} \right] \right\}$$

EJEMPLO

Calcule la transformada z de la función escalón $x(t) = u(t)$

Sabemos que $x(s) = \frac{1}{s}$

Luego

$$x(z) = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \left[(s - 0) \frac{1}{s} \frac{z}{z - e^{Ts}} \right] \right\} = \frac{z}{z - 1}$$

Que coincide con el valor que se puede obtener de la tabla.