

Contents

0.1	Úvod	1
0.2	Počítačom asistované dokazovanie	1
0.3	Prirodzená intuicionistická logika	1
0.3.1	Prirodzená dedukcia	1
0.3.2	Intuicionizmus	3
0.4	Lambda kalkulus	4
0.5	Typovo jednoduchý λ -calculus	6
0.6	Curry-Howardov izomorfizmus	7
0.7	Lean-theorem-prover	8
0.7.1	Constructing proof	8
0.7.2	Forward proofs	8
0.7.3	Backward proofs	8

0.1 Úvod

0.2 Počítačom asistované dokazovanie

0.3 Prirodzená intuicionistická logika

0.3.1 Prirodzená dedukcia

Theorem 1. *Majme spočítateľnú množinu \mathcal{X} výrokových premenných. Množina \mathcal{A} tvorenú formulami alebo výrokmi.*

$$A, B ::= X | A \implies B | A \wedge B | A \vee B | \neg A | \top | \perp \quad (1)$$

Kde $X \in \mathcal{X}$ reprezentuje výrovkovú premennú, a $A, B \in \mathcal{A}$ výrok.

Theorem 2. *precedencia*

Theorem 3. *Kontextom(systém predpokladov) rozumieme zoznam výrokov značených*

$$\Gamma = P_1, \dots, P_n \quad (2)$$

Theorem 4. *Dokazateľnosťou nazývame dvojicu*

$$\Gamma \vdash A \quad (3)$$

Theorem 5. *Dedukčné pravidlo*

$$\frac{\Gamma_1 \vdash A_1 \quad \dots \quad \Gamma_n \vdash A_n}{\Gamma \vdash A} \quad (4)$$

Ako sa vola horna časť a dolná časť "zlomku". dedukčný spôsob zhora dole. induktívny zdola hore.

Theorem 6. *čo je introduction čo je elimination príklad a že to je dokazom možno podľa 2.2.5*

Theorem 7. *elimination cuts because they correspond to beta-reduction a pozrieť čo robia beta-redukcie*

Prirodzená dedukcia

$$\frac{}{\Gamma, A, \Gamma' \vdash A} \text{ (ax)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma : B} (\Rightarrow_E)$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma : B} \Rightarrow_I$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma : A} (\wedge_E^l)$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma : B} (\wedge_E^r)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B} (\wedge_I)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \vee B \quad \Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C} (\vee_E)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B} (\vee_I^l)$$

$$\frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} (\vee_E^r)$$

$$\frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} (\perp_E)$$

$$\frac{\Gamma \vdash \neg A \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash \perp} (\neg_E)$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \perp \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash \neg A} (\neg_I)$$

V prípade že tieto pravidlá čítame zhora nadol hovoríme o dedukcii. Ak čítame pravidlá zdola nahor hovoríme o indukčnom spôsobe.

Theorem 8. *Fragmentom intuicionistickej logiky nazývame, systém ktorý dostaneme ak ho obmedzíme len na niektoré z predchádzajúcich pravidiel.*

Theorem 9. *Implikačným fragmentom intuicionistickej logiky dostaneme v prípade ak formuly budú tvorené gramatikou*

$$A, B ::= X | A \Rightarrow B \quad (5)$$

a pravidlami (ax), (\Rightarrow_E), (\Rightarrow_I)

V prípade že chceme aby výrokove formuly korešpondovali s typmi. Ich booleova reprezentácia s hodnotami 1,0 je nahradená otázkou existencie prvkov v množine. V prípade implikácie o existencii funkcie v množine. Funkcie v programoch ale môžu mať pri rovnakých vstupoch a výstupoch mať rôznu výpočtovú zložitosť. Dôvod prečo by sme sa mali pozerať na dôkazy (podľa publikácie Gir11) v troch rovinách.

- 1. Booleovský - tvrdenia sú booleovské hodnoty, zaujímame sa o dokázateľnosť tvrdenia
- 2. Existenčný - tvrdenia sú množiny, aké funkcie môžu byť
- 3. Úmyselný/Zámerový(Intentional) - zaujímame sa o zložitosť vytvoreného dôkazu a ako sa zjednoduší cez (cut elimination)

0.3.2 Intuicionizmus

Jedným zo smerov matematickej filozofie týkajúcej sa rozvoja teórie je konštruktivizmus. Konštruktivizmus hovorí o potrebe nájsť alebo zostrojiť matematický objekt k tomu aby bola dokázaná jeho existencia. Jeden z motivačných príkladov takéhoto prístupu je možnosť dokázania pravdivosti výroku $p \vee \neg p$ cez dôkaz sporom $\neg p$ ktorý nehovorí ako zostrojiť objekt p len o jeho existencii. Tento smer tvorí viacero "škôl" okrem iných finitizmus, predikativizmus, intuicionizmus. Intuicionizmus je teda konštruktívny prístup k matematike v duchu Brouwera(1881-1966) a Heytinga(1898-1980). Filozofickým základom tohto prístupu princíp že matematika je výtvorom mentálnej činnosti a nepozostáva z výsledkov formálnej manipulácie symbolov ktoré sú iba sekundárne. Jedným z princípov intuicionizmus je odmietnutie tvrdenia postulátu klasickej logiky a to zákona vylúčenia tretieho.

$$p \vee \neg p \tag{6}$$

Dôvodom je z konštruktívneho pohľadu nezmyselnosť uvažovania nad pravdivosťou výroku nezávisle od uvažovaného tvrdenia. Výrok je teda pravdivý ak existuje dôkaz o jeho pravdivosti a nepravdivé ak existuje dôkaz ktorý vedie k sporu.

- konjunkcii $p \wedge q$ ako o výroku hovoriacom o existencii dôkazov p a zároveň q ,
- disjunkcii $p \vee q$ ako existencii konštrukcii dôkazu jedného z výrokov p, q ,
- $p \implies q$ je metóda(funkcia) transformácie každej konštrukcie p k dôkazu q ,
- neexistencie dôkazu nepravdivého tvrdenia, iba dôkazu ktorý vedie k sporu $p \implies \perp$
- konštrukcia $\neg p$ je metóda ktorá vytvorí každú konštrukciu p na neexistujúci objekt

konjunkcii $A \wedge B$ ako $A \times B$ $A \vee B$ ako $A \sqcup B$ disjunktne zjednotenie $\neg A = A \implies \perp$ existencie kontrapríkladu

Formalizovanie dôkazu

Dôkaz z teórie usporiadania. Tak ako je Program = Proof

Otázka ohľadom konzistentnosti dôkazu.

Otázka kontrola typov by mala byť rozhodnuteľná.

Definícia formuly, postupnosti, kontextu, fragmentov ktoré navazujú na typovy lambda calculus

0.4 Lambda kalkulus

Theorem 10. *Majme nekonečnú množinu $\mathcal{X} = x, y, z, \dots$ ktorých elementy nazývame premenné. Množinu Λ tvorenú λ -termínmy je potom generovaná nasledovnou gramatikou:*

$$t, u ::= x | tu | \lambda x. t \quad (7)$$

Význam jednotlivých termínov je

- x - je premennou
- tu - je aplikáciou termínu t s argumentom u
- $\lambda x. t$ je abstrakciou t nad x

Príklady lambda termínov:

$$tx \quad (8)$$

$$(\lambda y. \lambda x. ty) \quad (9)$$

$$(\lambda y. yx)(\lambda x. x) \quad (10)$$

Aplikácia λ -termínov je implicitne aplikovaná zľava.

$$tuv = (tu)v \quad (11)$$

Pri výraze

$$\lambda x. tx = \lambda x. (tx) \quad (12)$$

je precedencia aplikácie vyššia ako abstrakcia.

A abstrakciu s tromi argumentmi je možné prepísať do troch po sebe nasledujúcich.

$$\lambda xyz. t = \lambda x. \lambda y. \lambda z. t \quad (13)$$

Theorem 11. *Premenná x sa vo výraze*

$$\lambda x. t \quad (14)$$

abstrakciou viaže na termín t . O premennej x hovoríme že je viazaná. O premenných ktoré nie sú viazané sú voľné.

$$\begin{aligned} VP(x) &= x \\ VP(\lambda x.t) &= VP(t) \setminus \{x\} \\ VP(tv) &= VP(t) \cup VP(v) \end{aligned}$$

Theorem 12. *Premenovaním nazývame nahradenie voľných premenných v termíne.*

$$t\{y/x\} \tag{15}$$

V termíne t je premenovaná premenná x za y .

α -ekvivalencia

Theorem 13. *O výrazov hovoríme že sú alfa-ekvivalentné ak sa výrazy rovnajú až na premenovanie.*

Theorem 14. *O substitúcii hovoríme pri nahradení jednej premenej druhou.*

$$t[y/x] \tag{16}$$

Nahradenie je silnejšie a vieme nahradiť aj premenné viazané abstrakciou.

β -redukcia

$$\frac{}{(\lambda x.t)u \rightarrow_{\beta} t[u/x]} \quad (\beta_s)$$

$$\frac{t \rightarrow_{\beta} t'}{(\lambda x.t)u \rightarrow_{\beta} t[u/x]} \quad (\beta_{\lambda})$$

$$\frac{t \rightarrow_{\beta} t'}{tu \rightarrow_{\beta} t'u} \quad (\beta_l)$$

$$\frac{u \rightarrow_{\beta} u'}{tu \rightarrow_{\beta} tu'} \quad (\beta_r)$$

$$\frac{\frac{\frac{}{(\lambda y.y)x \rightarrow_{\beta} x} \quad (\beta_s)}{(\lambda y.y)xz \rightarrow_{\beta} xz} \quad (\beta_l)}{\lambda x.(\lambda y.y)xz \rightarrow_{\beta} \lambda x.xz} \quad (\beta_{\alpha}) \tag{17}$$

Theorem 15. *Definujme rekurziu volania funkcie nasledovne*

$$f^0 x = x \tag{18}$$

$$f^n x = f(f^{n-1} x) \tag{19}$$

$$\tag{20}$$

Potom Churchove číslo c_n je λ -termín

$$c_n = \lambda s. \lambda z. s^n(z) \tag{21}$$

Prirodzené čísla je potom definovať

$$0 = \lambda f x.x$$

$$1 = \lambda f x.f x$$

$$1 = \lambda f x.f(f x)$$

$$2 = \lambda f x.f(f(f x))$$

$$succ(n) = (\lambda n f x.f(n f x))(\lambda f x.f^n x)$$

$$\rightarrow_\beta \lambda f x.f((\lambda f x.f^n x) f x)$$

$$\rightarrow_\beta \lambda f x.f((\lambda x.f^n x) x)$$

$$\rightarrow_\beta \lambda f x.f(f^n x)$$

$$= \lambda f x.f^{n+1} x$$

$$= n + 1$$

Operáciu sčítania je potom možné definovať vykonať

Theorem 16. $f_+ = \lambda x.\lambda y.\lambda s.\lambda z.xs(ysz)$

Podobným spôsobom môžeme vytvoriť

Theorem 17.

$$True = \lambda xy.x False = \lambda xy.y \quad (22)$$

$$if = \lambda bxy.bxy \quad (23)$$

$$\begin{aligned} if True tu &= (\lambda bxy.bxy)(\lambda xy.x)tu \rightarrow_\beta (\lambda xy.(\lambda xy.x)xy)tu \\ &\rightarrow_\beta (\lambda y.(\lambda xy.x)ty)u \\ &\rightarrow_\beta (\lambda xy.x)tu \\ &\rightarrow_\beta (\lambda y.t)u \\ &\rightarrow_\beta t \end{aligned}$$

Theorem 18. *Jednoduchý λ kalkulus je ekvivalentný výpočtovej sile turingovho stroja. Bez dôkazu*

0.5 Typovo jednoduchý λ -calculus

Typový lambda calculus je rozšírením jednoduchého o typy

Theorem 19. *Majme množinu U spočítateľnú nekonečnú abecedu obsahujúcu typové premenné. Potom množina Π obsahuje reťazce jednoduchých typov ktoré su generované gramatikou:*

$$\Pi ::= U | (\Pi \rightarrow \Pi) \quad (24)$$

Theorem 20. *Kontextom rozumieme množinu C tvoriacu*

$$x_1 : \tau_1, \dots, x_n : \tau_n \quad (25)$$

kde $\tau_1, \dots, \tau_n \in \Pi$ a $x_1, \dots, x_n \in C$ Koobor kontextu je množina obsahujúca

$$\text{domain}(\Gamma) = x_1, \dots, x_n \quad (26)$$

Oboor kontextu je množina obsahujúca

$$\text{range}(\Gamma) = \tau \in \Pi | (x : \tau) \in \Gamma \quad (27)$$

Príklady generované gramatikou

- $\vdash \lambda x.x : \sigma \rightarrow \sigma$
- $\vdash \lambda x.\lambda y.x : \sigma \rightarrow \tau \rightarrow \sigma$
- $\vdash \lambda x.\lambda y.\lambda z.xz(yz) : (\sigma \rightarrow \tau \rightarrow \rho) \rightarrow (\rho \rightarrow \tau) \rightarrow \sigma \rightarrow \rho$

Theorem 21. *Postupnosť je trojica značená*

$$\Gamma \vdash t : A \quad (28)$$

tvorená kontextom Γ , λ -termínom t a typom A .

Termín t je typu A ak v kontexte Γ ak je postupnosť derivovateľná pomocou pravidiel:

- ax: v kontexte x je typu A
- \xrightarrow{I} : ak je x typu A , t je typu B , potom funkcia $\lambda x.t$ ktorá asociuje x t je typu $A \rightarrow B$
- \xrightarrow{E} : daná je funkcia t je typu $A \rightarrow B$ a argument u je typu A , výsledok aplikácia tu je typu B

$$\frac{}{\Gamma \vdash x : \Gamma(x)} \text{ ax}$$

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash t : B}{\Gamma \lambda x^A.t : A \rightarrow B} \xrightarrow{I}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash u : A}{\Gamma \vdash tu : B} \xrightarrow{E}$$

0.6 Curry-Howardov izomorfizmus

Intuinstická logika	Typovo jednoduchý λ kalkulus
termín	dôkaz
typová premenná	propozičná premenná

0.7 Lean-theorem-prover

0.7.1 Constracting proof

0.7.2 Forward proofs

`assume`

`calc`

`fix`

`have`

`let`

`show`

0.7.3 Backward proofs

`cc`

`clear`

`exact`

`induction`

`intro`

`refl`

`refl`

`Inductive types`