

BİREYSELLEŐTİRİLMİŐ DİRENÇ ANTRENMANI

Kanıtı Dayalı Hipertrofi Programı

5 gün · Çekiő / İtiő / Bacak / Çekiő / İtiő
187 cm · 94 kg · 4 günlük hafta yedeđi ile

Bu belge neyi içerir?

- Haftanın 5 antrenman günü (1 tam bacak) + 4 günlük yedek
- Her hareketin programa alınma gerekçesi ve kanıt derecesi
- Orijinal programdan çıkarılan teknikler ve nedenleri
- Beslenme, adım sayısı, ilerleme ve 8 haftalık takip notları
- Numaralı kaynakça (kılavuz, meta-analiz, RCT, EMG/biyomekanik)

1. Bu belge nasıl okunmalı?

Kanıt hiyerarşisi · sınırlar · güvenlik

Güvenlik uyarısı

Bu bir antrenman rehberidir, tıbbi teşhis veya tedavi değildir. Bel, diz, omuz, göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi veya bilinen hastalığın varsa önce hekime danış. Fotoğraftan yağ yüzdesi, hormon bozukluğu veya jinekomasti teşhisi konmaz.

Kusursuz program iddiası yoktur. ACSM 2026, direnç antrenmanında asıl sıçramanın 'hiç yapmamaktan düzenli yapmaya' geçişte olduğunu; ekipman türü, karmaşık periyodizasyon ve her sette tükenişin ortalama yetişkinde sonucu tutarlı değiştirmedini belirtir [1,30]. Bu dosya, senin fotoğrafındaki boşluklara (bel çevresi, lat genişliği, yan omuz, bacak/kalça) ve keyif aldığın sırt-biceps gününe göre ilkeleri bireyselleştirir.

Kanıt dereceleri (her hareketin altında yazılıdır):

- A — Kılavuz, sistematik derleme veya meta-analiz (hacim, sıklık, ROM, protein, aktivite).
- B — Hipertrofiyi MRI/ultrason ile ölçen randomize veya çapraz-kol çalışma.
- C — EMG veya biyomekanik. Kasın o anda 'yandığını' gösterir; büyüyeceğini kanıtlamaz.
- D — Klinik pratik veya dolaylı çıkarım. Yetersizse metinde açıkça yazılır.

EMG çalışması (ör. incline press, lateral raise, pulldown tutuşu) hangi başın daha aktif göründüğünü söyler. Büyüme iddiası için mümkün olduğunca MRI/ultrason RCT'si kullanıldı (triceps overhead [11], seated leg curl [12], hip thrust vs squat [13], baldır uzun kas boyu [10]).

2. Fotoğrafa göre hedef

Neden bu split, neden bu öncelikler

Ön/yan/arka karelerde duran taban: trapez, kolda ve göğüste eski antrenman izi, kullanılabilir omuz iskeleti. Görüntüyü yöneten unsur bel çevresi yumuşak dokusu. Kas olarak geride kalanlar: lat genişliği, yan deltoid, bacak ve kalça, üst sırt kalınlığı. Biceps görsel darboğaz değil. Boy 187 cm, kilo 94 kg (BMI ≈ 26,9). Protein ve enerji hedefleri bölüm 12'de bu sayılara göredir.

Öncelik	Neden (fotoğraf)	Programdaki cevap	Ana kaynak
Bacak + kalça	Şort hattı dolgun değil; orijinal programda yok	Bacak 1 tam gün (hacim o seansa yığılır)	[1,13,24]
Yan omuz	Omuz-bel oranı dar	8 doğrudan lateral set + press	[2,16]
Lat / V kesiti	Arkadan sırt ve bel yakın genişlikte	Pulldown tam ROM + 3 row (bar, destekli, DB)	[9,17]
Bel çevresi	Yandan karın önde	Açık + adım; crunch ile yakılmaz	[23,24]
Bel güvenliği	Pelvis önde, cheat row riski	Destekli + DB row; barbell RIR 2-3, cheat yok	[14,6]

Neden 5 gün ve neden tek bacak günü? Hedefin 5 salon günü; bacağı 1 güne sığdırabiliyorsun. Üst vücut (sırt, göğüs, yan omuz) böylece haftada 2 kez uyarılır [4,5]. Bacak 1x kalır — bu, ACSM/DSÖ'nün ≥2 gün tercihinine göre ikinci plandadır [1,24]. Telafi: o tek seansa ~12-16 ağır alt vücut seti yığmak. Hacim eşitlenince sıklığın kendisi sihir değildir [5]; 1 dolu bacak günü, 0 bacak gününden kat kat iyidir ve 4 üst + 1 bacak, orijinal 4x üst şablonundan daha dengelidir. 2. bir bacak günü ileride (ör. 6. ay) eklenebilir.

Gün	Odak	Örnek yerleşme
1 Sırt & biceps A	Pulldown, barbell/DB/destekli row, curl	Pazartesi
2 Göğüs & omuz A	Incline, düz press, lateral, pec deck, overhead tri	Salı
3 Bacak	Squat, press, curl, extension, hyper	Çarşamba
4 Sırt & biceps B	V-bar, seated row, DB row, hammer	Perşembe
5 Göğüs & omuz B	Press, shoulder press, lateral 4, pec deck 3	Cuma
—	İstirahat + yürüme (7-10 bin adım)	Cmt-Paz

4 günlük hafta: Gün 5'i (göğüs & omuz B) iptal et, yerine 'Üst karma'yı koy (bölüm 9 salon kartı). Bacak gününü asla kesme. Tutarlı 6 gün, tutarlı 4-5 günden kötüdür [1,30].

3. Her seansın kuralları

RIR, dinlenme, ROM, ısınma, ilerleme

RIR (yedekte kalan tekrar) [6,7,25]

RIR $2 \approx$ 'düzgün formla 2 tekrar daha yapabiliyordim'. ACSM, anlık kas tükenişinin ortalama yetişkinde sonucu tutarlı değiştirmediğini belirtir [1]. Grgic meta-analizi tükeniş vs tükenişe gitmeme arasında hipertrofide net üstünlük göstermez [6]; Refalo anlık failure'ın şart olmadığını söyler [7]. Çok eklemli setler RIR 1-3; makine izolasyonunun son seti RIR 0-1. Partnerli forced rep ve cheat yok.

Dinlenme [8]

Antrenmanlı erkeklerde 3 dk dinlenme, 1 dk'ya göre squat/bench kuvvetini ve uyluk önü kalınlığını daha fazla artırmıştır [8]. Compound'larda 2,5-3 dk, izolasyonda 75-90 sn. FST-7'nin 10 sn'si mekanik işi düşürür [31].

ROM [9,10]

Tam veya uzun (gerilmiş) ROM, kısa kas boyundaki kısmi ROM'dan üstün veya eşittir [9]. Pulldown tepesinde lat'i esnet; squat'ta bel yuvarlanmasın; pec deck'te göğsü aç.

Isınma

5-8 dk yürüyüş veya bike. İlk compound için 1-2 rampa seti (ör. pulldown 2x10 hafif). Bunlar çalışma seti sayılmaz. 10 dakikalık stretching devresi hipertrofi için gerekli değildir [1].

İlerleme (double progression) [1,29]

Hedef tekrar bandının üstünü (ör. 3x12) tüm çalışma setlerinde RIR kuralıyla bitirince yükü 2-5 kg veya 1 kablo plakası artır, tekrar alt banda (8) dön. 2 haftadır kilo ve tekrar yerindeyse uyku/stres bak; hemen drop set ekleme [20]. 7. veya 8. hafta deload: setleri $\sim 2/3$ 'e çek, RIR 3-4, yeni hareket yok.

Seans hacmi

Üst günler 6 hareket / $\approx$ 16-18 set ($\sim 70-80$ dk), bacak 5 hareket / 15 set ($\sim 55-70$ dk). Bacak enerjin biterse extension'ı 2 sete indir. Gün 1 bel yorulursa barbell row'u 2 sete indir. Gün 4'te hammer, Gün 5'te pec deck'in son seti kesilir; ilk compound'lar kalır [2,14].

4. GÜN 1 — SIRT & BICEPS A

Pulldown + 3 row · 70-80 dk · kol hareketleri aynı

Sırt hareketleri senin listen: lat pulldown, barbell row, göğüs destekli row, tek kol DB row. Kablo row ve düz kol pulldown yok. Üç row da yatay çekiş — çeşit şart değil, fark destek türü [1]. Barbell row, karşılaştırılan row'lar içinde en yüksek lomber kompresyonu verir [14]; bu yüzden pulldown'dan hemen sonra, cheat'siz ve RIR 2-3 ile yapılır. Biceps günün sonundaki curl'ler aynı kalır. Göğüs bu günde yok.

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Lat pulldown (orta pronated tutuş, tam ROM)	3 çalışma (+1-2 ısınma)	8-12	2,5-3 dk	1-2	Latissimus, biceps, alt trap

Neden bu hareket? V kesiti için en doğrudan dikey çekiş. Orta tutuşta lat EMG'si dar/geniş ile benzer, 6RM yük biraz daha yüksektir [17]. Orijinal 'ROM %80, stretch yok' notu literatürün tersinedir [9]. Tükeniş her sette şart değil [1,6,7].

Uygulama: Göğüs açık, hafif geri yat. Bar üst göğse. Tepede lat'i esnet, sallama yok.

Yedek: Nötr V-bar pulldown, assisted pull-up. Behind-the-neck yok.

Kanıt derecesi: A (ROM, sıklık) + C (tutuş EMG).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Barbell row (önden, bel nötr)	3	6-10	2,5-3 dk	2-3	Üst sırt, lat, erektör

Neden bu hareket? Serbest ağırlık yatay çekiş; sırt kalınlığı için yükü taşır. Fenwick: ayakta öne eğik row, destekli varyantlardan daha yüksek lomber kompresyon üretir [14]. Pulldown'dan sonra, bel henüz taze iken yapılır. Cheat / 'lat için kambur' yok [29]. İlk haftalar ego kilo yok.

Uygulama: Diz az kırık, gövde ~30-45°. Bel nötr, göğüs açık. Bar alt kaburga / kalça üstüne. Sırt yuvarlanınca set biter, kilo düşer.

Yedek: Bel rahatsızsa bu 3 seti göğüs destekliye ekle. Pendlay yalnızca bel nötrse.

Kanıt derecesi: A (hacim) + C (lomber yük [14]).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Göğüs destekli row (chest-supported / makine)	3	8-12	2,5-3 dk	1-2	Orta trap, romboid, lat, arka deltoid

Neden bu hareket? Aynı yatay çekişi barbell'den daha düşük bel yüküyle verir [14]. Bar'dan sonra kalınlık hacmini tamamlar; pelvis önde durduğu için destekli varyant burada asıl kalite setidir.

Uygulama: Göğüs yastığa yapışık. Çekiş dirsekle. Cheat yok. RIR 1-2 [6,7].

Yedek: Chest-supported T-bar, seated machine row.

Kanıt derecesi: A (çekiş hacmi) + C (omurga biyomekaniği).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Tek kol dumbbell row (bench destekli)	3	8-10 / kol	90-120 sn	1-2	Lat, orta sırt (tek taraf)

Neden bu hareket? Kablo row'un serbest ağırlık karşılığı. Tek kol asimetriyi görünür kılar. Bench'e el-diz destek, ayakta iki elle DB row'dan daha az bel ister [14]. 'Lat için kambur' bel fleksiyonu değildir.

Uygulama: Bir el ve aynı taraf diz bench'te. Bel nötr, çekiş kalça hizasına. Sol ve sağ ayrı sayılır.

Yedek: Kablo tek kol row. Ayakta desteksiz DB row yok.

Kanıt derecesi: A + C [14].

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Dumbbell supinated curl	3	10-12	75-90 sn	1-2	Biceps brachii

Neden bu hareket? Çekişler biceps'e dolaylı hacim verir; doğrudan ~8-12 set/hafta yeter [2]. Biceps görsel darboğazın değil. Momentum gerilimi azaltır [29].

Uygulama: Dirsek gövde yanında, sallanma yok.

Yedek: Kablo curl, barbell curl (bilek rahatsa).

Kanıt derecesi: A (hacim).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Hammer curl	2	10-12	75 sn	1-2	Brachialis, brachioradialis

Neden bu hareket? Nötr tutuş brachialis/önkol. Orijinal drop set eşit hacimde üstün hipertrofi vermez [20].

Uygulama: Başparmak yukarı, drop yok.

Yedek: Rope hammer curl.

Kanıt derecesi: A [20] + C (anatomi).

5. GÜN 2 — GÖĞÜS & OMUZ A

6 hareket · üst göğüs + düz press + yan omuz · 70-80 dk

Gün 1 ile aynı uzunluk: 6 hareket. Incline'dan sonra düz press eklenir ki seans tek press ile bitmesin; açı farkı üst vs orta pektoralis [15]. Lateral raise, front raise'den daha seçici orta deltoid uyarır [16]. Sıra: compound önce, çünkü kuvvet seansın başındaki harekette daha çok artar; hipertrofi sıra değişince benzerdir [19].

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Incline press (makine veya dumbbell, ~30°)	3	8-12	2,5-3 dk	1-3	Üst pektoralis, ön deltoid, triceps

Neden bu hareket? 30° civarı üst göğsü vurgularken 45-56° kadar ön deltoidi öne almaz [15]. Tam/uzun ROM kısmi kısa ROM'dan en az eşit veya daha iyidir [9]. Partnerli forced rep yok [6].

Uygulama: Kürek bench'e sabit. Bar üst-orta göğse insin. Dirsekler aşırı açılmasın.

Yedek: Smith incline. Omuz rahatsızsa makine.

Kanıt derecesi: A (hacim/ROM) + C (açı EMG). Incline üst göğüs MRI RCT'si sınırlıdır.

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Göğüs press makinesi (düz)	3	8-12	2,5 dk	1-2	Pektoralis, ön deltoid, triceps

Neden bu hareket? İkinci göğüs compound'u. ACSM ekipman türünün hipertrofiyi tutarlı değiştirmediğini belirtir [1]; makine, incline'dan sonra omuz stabilitesini kolaylaştırır. Gün 5'teki press ile 2x sıklık kalır [5].

Uygulama: Kürek arkada. Kilidi çarpmadan uzat. Partnerli negatif yok [6].

Yedek: DB flat press, Smith düz. Dip yedek (Gün 5).

Kanıt derecesi: A (hacim + sıklık).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Kablo lateral raise	4	12-15	75-90 sn	1-2	Yan (orta) deltoid

Neden bu hareket? Omuz genişliği belin daha dar görünmesini sağlar. Orijinal programda yan omuz ~4 set/haftaydı; hedef ~10+ ağır set [1,2]. Bu 4 set + Gün 5'teki 4 set ≈ 8 doğrudan + press katkısı. Lateral, front raise'den daha seçici [16].

Uygulama: Kol ~30° önde, 90°yi aşma, gövde sallanmasın.

Yedek: Seated DB lateral, makine lateral. Upright row yok.

Kanıt derecesi: A (hacim) + C (EMG). Lateral vs press hipertrofi RCT'si yok.

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Pec deck	2	12-15	75-90 sn	0-2	Pektoralis (uzun kas boyu)

Neden bu hareket? Kablo fly'ın makine karşılığı. ACSM ekipman türünün hipertrofiyi tutarlı değiştirmediğini belirtir [1]. Açık pozisyonadaki gerilme, kısa 'sıkış'tan üstün veya eşittir [9,10]. Gün 5'te pec deck tekrarlanır (2x sıklık); kopya değil, lateral raise ile aynı mantık.

Uygulama: Kürek arkada, dirsek hafif kırık. Omuz öne gitmesin. Gerilmede dur, gövde kıpırdamasın.

Yedek: Kablo fly yalnızca pec deck yoksa.

Kanıt derecesi: A (hacim + ROM).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Face pull (ip, yüz hizası)	3	12-15	75-90 sn	1-2	Arka deltoid, dış rotatörler, orta trap

Neden bu hareket? Press hacmine karşı denge. Klinik glenohumeral/skapular örüntü [28]. Hipertrofi RCT'si zayıf; daha doğrudan yedek reverse pec deck (Gün 4).

Uygulama: İp kulak hizası, dış rotasyon, momentum yok.

Yedek: Reverse pec deck, reverse fly.

Kanıt derecesi: D/C [28].

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Overhead kablo triceps extension	3	10-12	90 sn	1-2	Triceps, özellikle uzun baş

Neden bu hareket? MRI'lı 12 haftalık çapraz-kol çalışmada baş üstü ekstansiyon, nötr kola göre daha fazla triceps büyümesi verdi (uzun baş +28,5% vs +19,6%) ve daha düşük yükte [11].

Uygulama: Üst kol kulak yanında sabit. Bel çukuru artmasın.

Yedek: Overhead DB extension. Pushdown yedek (Gün 5).

Kanıt derecesi: B (Maeo 2023, MRI).

6. GÜN 3 — BACAK (5 hareket · ~55-70 dk)

Squat, leg press, curl, extension, hyperextension · atlama

Tek bacak günü, yalnızca yapabildiğin makinelere indirildi: squat + leg press (quad/kalça), leg curl (hamstring), extension (quad izolasyon), hyperextension (kalça-ham-erektör). Hip thrust, lunge, RDL, calf ve karın yok; 8 hareketlik seans enerjiyi bitirirdi. 15 çalışma seti, 1x sıklık için yeterli bir dozdur [2,5]. Seated curl varsa prone'a tercih et [12]. 4 günlük haftada bu günü asla kesme.

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Squat (bar, Smith veya goblet)	3	8-12	3 dk	2-3	Quadriceps, glute, addüktör

Neden bu hareket? Günün en yorucu, en becerili hareketi olduğu için başta [19]. Plotkin: squat paterni kalçada hip thrust kadar, uyluk önünde daha fazla kesit artışı verir [13]. İlk haftalar RIR 2-3; ego squat yok. Smith/goblet serbest bara denk sayılır [1].

Uygulama: Topuklar yerde, dizler parmak yönünde. Derin ama bel yuvarlanmadan. Göğüs açık. Çıkışta kalçayı kilitleyip bel boşluğunu şişirme.

Yedek: Smith squat, goblet squat, hack squat. Bel rahatsızsa bu 3 seti leg press'e ekle.

Kanıt derecesi: A (hacim) + B (Plotkin 2023).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Leg press	3	8-12	2,5-3 dk	1-3	Quadriceps, glute

Neden bu hareket? Squat'tan sonra hacmi güvenli tamamlar. Bel yastığı yaslı olduğu için squat kadar omurga becerisi istemez [1]. 3+3 = 6 compound quad seti; 1x gün için omurga budur [2].

Uygulama: Bel yastıktan kalkmasın. Kontrollü in, kilidi çarpmadan uzat. Ayaklar omuz genişliği.

Yedek: Yoksa squat'a 2 set daha ekle. Hack squat.

Kanıt derecesi: A (hacim) + B (squat paterni [13]).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Leg curl (oturarak varsa oturarak)	3	10-12	90-120 sn	0-2	Hamstring

Neden bu hareket? Hamstringi doğrudan bükür. Seated (kalça bükük) curl, 12 haftalık MRI'da prone'dan daha fazla hamstring hacmi vermiştir (+14% vs +9%) [12]. Makine yüzüstüyse yine yap; 3 set yeter. RDL olmadığı için bu 3 set kesilmez.

Uygulama: Kalça pad'e yapışık. Tam uzat, kontrollü bük. Kalçayı kaldırma.

Yedek: Lying / standing curl. Hepsi kabul.

Kanıt derecesi: B (Maeo 2021, MRI).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Leg extension	3	12-15	75-90 sn	0-2	Quadriceps (rektus femoris)

Neden bu hareket? Squat ve press rektus femorisi her zaman yeterince uzatmaz. 3 izolasyon seti haftalık quad'ı ~9-12 sete tamamlar [1,2]. Son sette RIR 0-1 olabilir.

Uygulama: Sırt yaslı. Üstte 0,5 sn. Diz ağırsa ROM'u kısalt, kilo düş.

Yedek: Enerji biterse 2 sete in; squat ve press'i kesme.

Kanıt derecesi: A (hacim tamamlama).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Hyperextension (plaka tutarak)	3	10-15	90 sn	1-3	Glute, hamstring, erektör

Neden bu hareket? RDL ve hip thrust'ın senin makine listesindeki karşılığı. Kalçadan bükülen (belden kırılmayan) hyperextension arka zinciri yükler. Orijinal programdaki 'kilo tutarak hyper' notu burada kontrollü ve RIR'li haliyle durur. Bel yuvarlayarak 'kambur hyper' yok.

Uygulama: Pad kalça kemiğinin hemen altında. Göğüs açık, bel nötr. Aşağı inerken kalça geriye, yukarı çıkarken kalçayı sık. Üstte bel boşluğunu şişirme. 5-10 kg plaka göğüste yeter; ilk hafta vücut ağırlığı da olur.

Yedek: 45° back extension. Reverse hyper yoksa bu kalır.

Kanıt derecesi: A (arka zincir hacmi) + C/D (mentşe). RDL/hip thrust kadar doğrudan RCT'si yok; elindeki mentşe bu.

7. GÜN 4 — SIRT & BICEPS B

6 hareket · pulldown + DB row + hammer · 70-80 dk

Sırtı haftada 2 kez uyarmak için [4,5]. Tek kol kablo yerine Gün 1'deki bench destekli DB row (2× sıklık; çeşit şart değil [1,5]). Düz kol pulldown çıktı — kanıtı zayıf [18]; lat dozu pulldown'a +1 set olarak gitti. 6. hareket hammer curl: Gün 1 ile aynı kol paterni. Enerji biterse hammer kesilir; pulldown 4 set kalır.

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Nötr tutuş lat pulldown (V-bar)	4	8-12	2,5-3 dk	1-2	Latissimus, biceps

Neden bu hareket? Tutuş genişliği lat EMG'sini büyük değiştirmez [17]. Düz kol pulldown kesildi; 1 set buraya eklendi (3→4). 4. set RIR 2; form düşünce kes.

Uygulama: Tam gerilme, göğüs açık. 1-2 RIR.

Yedek: Pronated pulldown (Gün 1'den farklı tutuş yeter).

Kanıt derecesi: A (sıklık) + C (EMG).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Seated kablo row (dar veya D-handle)	3	8-12	2-2,5 dk	1-2	Orta sırt, lat

Neden bu hareket? Göğüs destekli / barbell row'dan farklı açı. Oturarak bel shear'i ayakta öne eğik row'dan düşüktür [14].

Uygulama: Göğüs açık, bel nötr. Çekiş gövdeye, sallama yok.

Yedek: Makine row (Gün 1'den farklı tutuş).

Kanıt derecesi: A + C [14].

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Tek kol dumbbell row (bench destekli)	3	8-10 / kol	90-120 sn	1-2	Lat, orta sırt (tek taraf)

Neden bu hareket? Kablo row yerine senin DB row'un. Gün 1 ile aynı hareket; 2x sıklık hipertrofide çeşitten daha tutarlıdır [4,5]. Bench el-diz destek, ayakta desteksiz DB row yok [14].

Uygulama: Bir el ve aynı taraf diz bench'te. Bel nötr, çekiş kalça hizasına. Sol ve sağ ayrı sayılır.

Yedek: Kablo tek kol row yalnızca bench yoksa.

Kanıt derecesi: A + C [14].

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Reverse pec deck veya reverse fly	3	12-15	75 sn	0-2	Arka deltoid

Neden bu hareket? Face pull (Gün 2) daha çok dış rotasyon; bu daha doğrudan arka deltoid izolasyonu. Coratella varyantları deltoid başlarını farklı vurgular [16].

Uygulama: Kollar hafif kırık, shrug yok.

Yedek: Kablo reverse fly.

Kanıt derecesi: A (izolasyon hacmi) + C [16].

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Kablo curl	2	10-12	75 sn	1-2	Biceps

Neden bu hareket? Gün 1'deki 5 set + bu 2 set + hammer 2 $\approx$ 9 doğrudan + çekişler $\approx$ 10-12/hafta [2].

Uygulama: Dirsek sabit, tempo kontrollü.

Yedek: DB curl (Gün 1'den farklı açı, ör. incline curl).

Kanıt derecesi: A (hacim).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Hammer curl	2	10-12	75 sn	1-2	Brachialis, brachioradialis

Neden bu hareket? Düz kol pulldown'ın ikamesi olarak 6. hareket. Lat değil; o doz pulldown'daki +1 settedir. Hammer Gün 1'de var — 2x sıklık, drop yok [20].

Uygulama: Başparmak yukarı, sallanma yok.

Yedek: Rope hammer. Enerji biterse bu 2 seti kes; pulldown 4 kalsın.

Kanıt derecesi: A [20] + C (anatomi).

8. GÜN 5 — GÖĞÜS & OMUZ B

5 hareket · crossover yok; pec + lateral ekstra · 65-75 dk

Göğüs ve yan omuzu 2x tamamlar [4,5]. Crossover çıktı: aynı göğüs izolasyonu pec deck'te zaten var (Gün 2+5). 2 seti pec deck (+1) ve lateral'e (+1) bölündü — yan omuz senin görsel önceliğin [16]. 4 günlük haftada bu gün düşer; yerine 'üst karma' yapılır.

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Göğüs press makinesi (düz veya hafif incline)	3	8-12	2,5 dk	1-2	Pektoralis, ön deltoid, triceps

Neden bu hareket? Göğsü ikinci kez uyarmak. Hacim eşitlenince sıklık sihir değil ama 2x dağıtım performansı taşır [5]. Makine, haftanın 5. gününde omuz stabilitesini kolaylaştırır [1].

Uygulama: Kürek arkada. Partnerli negatif yok [6].

Yedek: DB flat press, Smith. Dip ancak omuz rahatsa.

Kanıt derecesi: A (sıklık + hacim).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Shoulder press makine	3	8-10	2,5 dk	1-3	Ön/yan deltoid, triceps

Neden bu hareket? Dikey press, yan omuz izolasyonunun taşıyamadığı yükü verir. ACSM kuvvet için daha ağır yükleri ($\geq 8-10$ tekrarlık zor set) öne çıkarır [1]. Tükeniş + partner yok.

Uygulama: Negatif kontrollü. Kilo omuzda kalsın, bel çukuru artmasın.

Yedek: Smith press, DB seated press.

Kanıt derecesi: A (yük + hacim).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Kablo veya dumbbell lateral raise	4	12-15	75-90 sn	1-2	Yan deltoid

Neden bu hareket? Gün 2'deki 4 setin ikinci yarısı + crossover'dan gelen 1 set [2,16]. Yorgunlukta kilo düşer, form düşmez.

Uygulama: Gün 2 ile aynı teknik.

Yedek: Makine lateral.

Kanıt derecesi: A + C [16].

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Pec deck	3	12-15	75 sn	0-2	Pektoralis (uzun kas boyu)

Neden bu hareket? Gün 2 pec deck ile 2x sıklık [4,5]. Crossover'ın 1 seti buraya eklendi (2→3). Açık pozisyonadaki gerilme kısa 'sıkış'tan üstün veya eşittir [9,10]. Enerji biterse 3. seti kes.

Uygulama: Kürek arkada, dirsek hafif kırık. Omuz öne gitmesin. Üstte 0,5 sn şart değil.

Yedek: Kablo fly yalnızca pec deck yoksa.

Kanıt derecesi: A (hacim + ROM).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Kablo pushdown (V-bar veya ip)	2	10-12	75 sn	1-2	Triceps (lateral/medial baş)

Neden bu hareket? Overhead (Gün 2) uzun baş için üstün [11]; pushdown diğer başları ve ek hacmi verir. 2 set yeter, orijinal programın tek triceps'i buraya sıkıştırılmaz.

Uygulama: Dirsek gövde yanında. 1 sn sıkış şart değil.

Yedek: Tek kol pushdown.

Kanıt derecesi: A (hacim) + B (overhead önceliği [11]).

8b. 4 GÜNLÜK HAFTA — ÜST KARMA (Gün 5 yerine)

Bacağı asla kesme · 55-70 dk · Cuma veya Perşembe

4 güne düşersen varsayılan: Gün 1 Sırt A, Gün 2 Göğüs A, Gün 3 Bacak, Gün 4 bu karma. Gün 4'teki ikinci sırt seansı (Sırt B) o hafta yapılmaz; karma güne 3 set pulldown ve 3 set row konur ki sırt ve göğüs yine 2x kalsın [4,5].

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Shoulder press makine (veya göğüs press)	3	8-12	2,5 dk	1-2	Deltoid, pektoralis, triceps

Neden bu hareket? Gün 2'de incline + düz press zaten var; burada dikey press göğsü 2x tutar ve omuzu Gün 5 düşmesin diye taşır [5]. Göğüs gerideyse düz press seç.

Uygulama: Gün 2/5 ile aynı teknik. Bel çukuru artmasın.

Yedek: Smith press, DB seated press.

Kanıt derecesi: A (sıklık).

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Lat pulldown (tam ROM)	3	8-12	2,5 dk	1-2	Lat

Neden bu hareket? Sırt B düştüğü için ikinci dikey çekiş burada [4].

Uygulama: Tam gerilme [9].

Yedek: V-bar pulldown.

Kanıt derecesi: A.

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Göğüs destekli veya seated row	3	8-12	2 dk	1-2	Orta sırt

Neden bu hareket? İkinci yatay çekiş [14].

Uygulama: Bel nötr, cheat yok.

Yedek: Makine row.

Kanıt derecesi: A + C.

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Kablo lateral raise	3	12-15	75 sn	1-2	Yan deltoid

Neden bu hareket? Gün 5 düşünce yan omuz 4 sete düşmesin [2,16].

Uygulama: Form bozulunca kilo düş.

Yedek: DB lateral.

Kanıt derecesi: A + C.

Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR	Hedef
Overhead triceps veya curl (o hafta hangi kol gerideyse)	2	10-12	75 sn	1-2	Triceps veya biceps

Neden bu hareket? Zaman kısaysa tek izolasyon. Overhead triceps kanıtı daha güçlü [11].

Uygulama: Birini seç, ikisini şişirme.

Yedek: Pushdown veya hammer.

Kanıt derecesi: B (triceps) / A (biceps hacmi).

9. Salon kartı

Telefona indirip salonda açmak için — yalnızca set/tekrar

Aşağıdaki tablolar gerekçe metinleri olmadan tüm programdır. 5 günlük haftada 1-5; 4 günlük haftada 1, 2, 3 ve 'Üst karma'. RIR ve dinlenme bölüm 3'e uyar.

Gün 1 — Sırt & biceps A

#	Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR
1	Lat pulldown (orta pronated tutuş, tam ROM)	3 çalışma (+1-2 ısınma)	8-12	2,5-3 dk	1-2
2	Barbell row (önden, bel nötr)	3	6-10	2,5-3 dk	2-3
3	Göğüs destekli row (chest-supported / makine)	3	8-12	2,5-3 dk	1-2
4	Tek kol dumbbell row (bench destekli)	3	8-10 / kol	90-120 sn	1-2
5	Dumbbell supinated curl	3	10-12	75-90 sn	1-2
6	Hammer curl	2	10-12	75 sn	1-2

Gün 2 — Göğüs & omuz A

#	Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR
1	Incline press (makine veya dumbbell, ~30°)	3	8-12	2,5-3 dk	1-3

#	Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR
2	Göğüs press makinesi (düz)	3	8-12	2,5 dk	1-2
3	Kablo lateral raise	4	12-15	75-90 sn	1-2
4	Pec deck	2	12-15	75-90 sn	0-2
5	Face pull (ip, yüz hizası)	3	12-15	75-90 sn	1-2
6	Overhead kablo triceps extension	3	10-12	90 sn	1-2

Gün 3 — Bacak (atlamayın)

#	Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR
1	Squat (bar, Smith veya goblet)	3	8-12	3 dk	2-3
2	Leg press	3	8-12	2,5-3 dk	1-3
3	Leg curl (oturarak varsa oturarak)	3	10-12	90-120 sn	0-2
4	Leg extension	3	12-15	75-90 sn	0-2
5	Hyperextension (plaka tutarak)	3	10-15	90 sn	1-3

Gün 4 — Sırt & biceps B (5 günlük hafta)

#	Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR
1	Nötr tutuş lat pulldown (V-bar)	4	8-12	2,5-3 dk	1-2
2	Seated kablo row (dar veya D-handle)	3	8-12	2-2,5 dk	1-2
3	Tek kol dumbbell row (bench destekli)	3	8-10 / kol	90-120 sn	1-2
4	Reverse pec deck veya reverse fly	3	12-15	75 sn	0-2
5	Kablo curl	2	10-12	75 sn	1-2
6	Hammer curl	2	10-12	75 sn	1-2

Gün 5 — Göğüs & omuz B (5 günlük hafta)

#	Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR
1	Göğüs press makinesi (düz veya hafif incline)	3	8-12	2,5 dk	1-2
2	Shoulder press makine	3	8-10	2,5 dk	1-3
3	Kablo veya dumbbell lateral raise	4	12-15	75-90 sn	1-2
4	Pec deck	3	12-15	75 sn	0-2
5	Kablo pushdown (V-bar veya ip)	2	10-12	75 sn	1-2

4 günlük hafta — Üst karma (Gün 5 yerine)

#	Hareket	Set	Tekrar	Dinlenme	RIR
1	Shoulder press makine (veya göğüs press)	3	8-12	2,5 dk	1-2
2	Lat pulldown (tam ROM)	3	8-12	2,5 dk	1-2
3	Göğüs destekli veya seated row	3	8-12	2 dk	1-2
4	Kablo lateral raise	3	12-15	75 sn	1-2
5	Overhead triceps veya curl (o hafta hangi kol gerideyse)	2	10-12	75 sn	1-2

10. Haftalık çalışma seti özeti (5 günlük hafta)

Isınma hariç			
Kas	Doğrudan set/hafta	Hedef bant [1-3]	Not
Lat / üst sırt	18-22	10-20	Gün 1: 12 çekiş; Gün 4: pulldown 4 + row 3+3
Göğüs	14	10-20	Incline 3 + düz 3 + pec 2+3 + press 3
Yan deltoid	8 + press	8-12	Lateral 4+4
Arka deltoid	6 + row	6-10	Face pull + reverse pec deck
Triceps	5 + press	6-10	Overhead 3 + pushdown 2 [11]
Biceps	9 + çekiş	8-12	Gün 1 5 + Gün 4 curl 2 + hammer 2
Quadriceps	9	8-12 (1× gün)	Squat 3 + press 3 + extension 3
Glute	squat+press+hyper	dolaylı	Hip thrust yok; hyper mentşe
Hamstring	3 + hyper	6-10	Curl 3; seated varsa oturarak [12]
Calf	0 (zorunlu değil)	—	Enerji kalırsa press'te 2 calf seti
Karın	üst günlerde yok	—	Bacak gününe eklenmedi

Bacak 5 harekete, üst günler 6 harekete çekildi (kullanıcı tercihi). Calf ve karın bacak gününde yok. 4 günlük haftada sırt ve göğüs karma günle 2× kalır; yan omuz ~4+3 yerine ~4+3 (karma 3 set) benzer bantta durur.

11. Orijinal programdan ne çıktı, neden?

Aynı keyif, daha az risk, eşit veya daha iyi uyaran

Çıkan öge	Neden çıktı	Kaynak
FST-7 (7×10, 10 sn dinlenme)	Akut çalışmada benzer metabolik yanıt, daha az mekanik iş ve daha yüksek yorgunluk. Fasya gerilerek büyüme iddiası kanıtlanmamış.	[31,29]
Her sette drop / rest-pause şovu	Eşit hacimde geleneksel setle benzer hipertrofi; avantaj zaman. Yorgunluk ve form bozulması artar.	[20,32]
Barbell row'da cheat	Öne eğik row zaten en yüksek lomber kompresyonu üretir. Cheat, bel momentini artırır, lat gerilimini azaltır.	[14,29]
Partnerli forced rep / ağır negatif	Tükeniş şart değil. Eksantrik yük hipertrofiye katkı verebilir [1] ama omuzda kontrol kaybı pahalıdır.	[1,6,7]
Pulldown ROM %80, stretch yok	Uzun kas boyu / tam ROM lehinedir. Kısa kısmi ROM geride kalır.	[9]
Front raise, fazla shrug	Front raise ön deltoid + üst pektoralis (zaten press'te var) [16]. Shrug trap'i row'larla da çalışır.	[16]
Biceps drop + 6-8 izolasyon	Biceps darboğaz değil. Direkt 5 set + çekiş, ~10 setlik banda yeter.	[2]
0 bacak günü (orijinal internet programı)	Tek dolu bacak seansı eklendi. 2× sıklık kanıtı daha güçlü [4,24]; 1 günde ~12-16 set yığmak 0'dan iyidir [5].	[1,4,5,24]

12. Beslenme ve adım — 187 cm / 94 kg

Fotoğrafi antrenmandan hızlı değiştiren kısım

Kilon ve boyun. $94 / 1,87^2 \approx \text{BMI } 26,9$ (kilolu aralık). Bu bir hastalık teşhisi değil; bel çevresi fotoğrafı da aynı hikâyeyi anlatır. Hedef 'kuru 94' değil, yağsız kütleyi koruyarak bel çevresini yavaş indirmektir.

Protein hedefi: 150-190 g/gün ($1,6-2,0 \text{ g/kg} \times 94 \text{ kg}$). ISSN $1,4-2,0 \text{ g/kg}$ der [22]; Morton meta-analizi $\approx 1,6 \text{ g/kg}$ civarında plato gösterir [21]. Pratik: 160-180 g. Öğün sayısı sihir değildir; 2 büyük öğün + spor çıkışı 1 shake yeter. Sabah aç antrenman, günlük protein ve kalori tutulursa hipertrofiyi tutarlı bozmaz. Diyet sıkılaşırsa 190-200 g'a çıkarmak yağsız kütleyi korumaya yardım eder [22].

Kalori (yaş bilinmediği için aralık). Mifflin-St Jeor erkek: $10 \times 94 + 6,25 \times 187 - 5 \times \text{yaş} + 5$. Yaş 28-38 varsayılırsa BMR $\approx 1920-1980 \text{ kcal}$. 5 gün direnç + günlük yürüyüşle TDEE kaba tahmin $\approx 2700-3100 \text{ kcal}$.

İlk 8-12 hafta: 2500-2800 kcal (günde ~200-400 açık). Haftalık tartı 0,25-0,5 kg düşsün; 1 kg/hafta hızlıdır ve sırt antrenmanını bozar [23]. Kilo 2 hafta yerindeyse 150-200 kcal kes; performans ve uyku bozulursa 150 kcal ekle.

Yürüme. DSÖ, büyük kas gruplarını haftada ≥ 2 gün güçlendirmenin yanında haftalık 150-300 dk orta şiddetli aeroibiği önerir [24]. Pratik hedef: günde 7-10 bin adım veya haftada 150-250+ dk tempolu yürüyüş [23,24]. Bu, 'kardio kas yer' mitinin yerine geçer; düşük şiddetli yürüyüş toparlanmayı bozmadan enerji harcar.

Uyku ve alkol. Bunların RCT'sini programa yazmak zorunda değil; pratikte 7-9 saat uyku ilerlemeyi, alkol ise protein sentezi ve kalori dengesini bozar. Kanıt derecesi burada genel fizyoloji, programın A/B çekirdeği değil.

13. 8 haftalık takip

Ayna pump'ı değil, sayı

- Her seans: hareket, kilo, tekrar, RIR notu. Defter yoksa program işlemiyor demektir.
- Aynı 4 kare (ön/yan/arka, aynı ışık, sabah) 4. ve 8. hafta.
- Göbek hizası mezura, 2 haftada bir, sabah.
- Başarı: incline/leg press/pulldown'da tekrar veya kilo artışı + bel çevresinde yavaş düşüş.
- Başarısızlık sinyali: 3 haftadır yük yok, uyku bozuldu, eklem ağrısı — hacmi kes, drop ekleme.
- 8. hafta sonunda: fotoğraf tekrarı. Yan omuz/lat hâlâ gerideyse lateral veya pulldown'a +1 set; biceps'e değil.

14. Mini ısınma ve seans içi düzen

Uygulama detayı

Bacak günü: 5 dk bike + 1 boş squat. 55-70 dk. Üst günler: kol çemberi 10+10, 1 hafif pulldown veya band face pull.

Sıra. Nunes meta-analizi: hipertrofi için çok eklem→izolasyon ile tersi benzerdir; kuvvet, seansın başındaki harekette daha çok artar [19]. Bu yüzden pulldown, press, leg press ve squat günün başındadır. Yan omuz öncelikli olduğu için lateral, tamamen sona bırakılmaz.

15. Kaynakça

Köşeli parantezler bu listeye karşılık gelir

Birincil kaynaklar hakemli dergi veya kurum kılavuzudur. Blog, antrenör sözü ve 'fasya gerilimi mucizesi' iddiaları listeye alınmadı. DOI/PMID verilenler doğrulanabilir.

- [1] Mcleod JC ve ark. ACSM Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews. Med Sci Sports Exerc. 2026;58(4):851-872. PMID: 41843416. PMC: PMC12965823. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12965823/>
- [2] Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW. Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: a systematic review and meta-analysis. J Sports Sci. 2017;35(11):1073-1082. PMID: 27433992.
- [3] Schoenfeld BJ, Contreras B, Krieger J ve ark. Resistance Training Volume Enhances Muscle Hypertrophy but Not Strength in Trained Men. Med Sci Sports Exerc. 2019;51(1):94-103. PMID: 30160419.
- [4] Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW. Effects of Resistance Training Frequency on Measures of Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2016;46(11):1689-1697. PMID: 27102172.
- [5] Schoenfeld BJ, Grgic J, Krieger J. How many times per week should a muscle be trained to maximize muscle hypertrophy? A systematic review and meta-analysis. J Sports Sci. 2019;37(11):1286-1295. PMID: 30558493.
- [6] Grgic J, Schoenfeld BJ, Orazem J, Sabol F. Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. J Sport Health Sci. 2022;11(2):202-211. PMID: 33497853. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2021.01.007>
- [7] Refalo MC, Helms ER, Trexler ET, Hamilton DL, Fyfe JJ. Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure on Skeletal Muscle Hypertrophy: A Systematic Review with Meta-analysis. Sports Med. 2023;53(3):649-665. PMID: 36334240. PMC: PMC9935748.
- [8] Schoenfeld BJ, Pope ZK, Benik FM ve ark. Longer Interset Rest Periods Enhance Muscle Strength and Hypertrophy in Resistance-Trained Men. J Strength Cond Res. 2016;30(7):1805-1812. PMID: 26605807.

- [9] Wolf M, Androulakis-Korakakis P, Fisher J, Schoenfeld B, Steele J. Partial Vs Full Range of Motion Resistance Training: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Int J Strength Cond.* 2023;3(1). <https://journal.iusca.org/index.php/Journal/article/view/182>
- [10] Kassiano W, Costa B, Kunevaliki G ve ark. Greater Gastrocnemius Muscle Hypertrophy After Partial Range of Motion Training Performed at Long Muscle Lengths. *J Strength Cond Res.* 2023;37(9):1746-1753.
- [11] Mao S, Wu Y, Huang M ve ark. Triceps brachii hypertrophy is substantially greater after elbow extension training performed in the overhead versus neutral arm position. *Eur J Sport Sci.* 2023;23(4):450-458. PMID: 35819335. <https://doi.org/10.1080/17461391.2022.2100279>
- [12] Mao S, Huang M, Wu Y ve ark. Greater Hamstrings Muscle Hypertrophy but Similar Damage Protection after Training at Long versus Short Muscle Lengths. *Med Sci Sports Exerc.* 2021;53(4):825-837. PMID: 33009197.
- [13] Plotkin DL, Coleman M, Van Every DW ve ark. Hip thrust and back squat training elicit similar gluteus muscle hypertrophy and transfer similarly to the deadlift. *Front Physiol.* 2023;14:1279170. <https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1279170>
- [14] Fenwick CMJ, Brown SHM, McGill SM. Comparison of different rowing exercises: trunk muscle activation and lumbar spine motion, load, and stiffness. *J Strength Cond Res.* 2009;23(5):1408-1417. PMID: 19620925.
- [15] Rodríguez-Ridao D, Antequera-Vique JA, Martín-Fuentes I, Muyor JM. Effect of Five Bench Inclinations on the Electromyographic Activity of the Pectoralis Major, Anterior Deltoid, and Triceps Brachii during the Bench Press Exercise. *Int J Environ Res Public Health.* 2020;17(19):7339. PMC: PMC7579505. <https://doi.org/10.3390/ijerph17197339>
- [16] Coratella G, Tornatore G, Longo S, Esposito F, Cè E. An Electromyographic Analysis of Lateral Raise Variations and Frontal Raise in Competitive Bodybuilders. *Int J Environ Res Public Health.* 2020;17(17):6015. <https://doi.org/10.3390/ijerph17176015>
- [17] Andersen V, Fimland MS, Wiik E, Skoglund A, Saeterbakken AH. Effects of grip width on muscle strength and activation in the lat pull-down. *J Strength Cond Res.* 2014;28(4):1135-1142. <https://doi.org/10.1097/JSC.0000000000000232>
- [18] Marchetti PH, Uchida MC. Effects of the pullover exercise on the pectoralis major and latissimus dorsi muscles as evaluated by EMG. *J Appl Biomech.* 2011;27(4):380-384. PMID: 21975179.
- [19] Nunes JP, Grgic J, Cunha PM ve ark. What influence does resistance exercise order have on muscular strength gains and muscle hypertrophy? A systematic review and meta-analysis. *Eur J Sport Sci.* 2021;21(2):149-157. <https://doi.org/10.1080/17461391.2020.1733672>
- [20] Coleman M, Harrison K, Arias R ve ark. Effects of Drop Sets on Skeletal Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-analysis. *Sports Med Open.* 2023;9:66. <https://doi.org/10.1186/s40798-023-00620-5>
- [21] Morton RW, Murphy KT, McKellar SR ve ark. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *Br J Sports Med.* 2018;52(6):376-384. PMID: 28698222. PMC: PMC5867436.
- [22] Jäger R, Kerksick CM, Campbell BI ve ark. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. *J Int Soc Sports Nutr.* 2017;14:20. PMID: 28642676. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0177-8>
- [23] Donnelly JE, Blair SN, Jakicic JM ve ark. ACSM Position Stand. Appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults. *Med Sci Sports Exerc.* 2009;41(2):459-471. PMID: 19127177.
- [24] World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO; 2020. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>
- [25] Helms ER, Cronin J, Storey A, Zourdos MC. Application of the Repetitions in Reserve-Based Rating of Perceived Exertion Scale for Resistance Training. *Strength Cond J.* 2016;38(4):42-49. <https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000218>
- [26] Speirs DE, Bennett MA, Finn CV, Turner AP. Unilateral vs. Bilateral Squat Training for Strength, Sprints, and Agility in Academy Rugby Players. *J Strength Cond Res.* 2016;30(2):386-392. PMID: 26244881.
- [27] Axler CT, McGill SM. Low back loads over a variety of abdominal exercises: searching for the safest abdominal challenge. *Med Sci Sports Exerc.* 1997;29(6):804-811. PMID: 9219209.
- [28] Reinold MM, Escamilla RF, Wilk KE. Current concepts in the scientific and clinical rationale behind exercises for glenohumeral and scapulothoracic musculature. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2009;39(2):105-117. PMID: 19194023.
- [29] Schoenfeld BJ. The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. *J Strength Cond Res.* 2010;24(10):2857-2872. PMID: 20847704.
- [30] ACSM. Resistance training guidelines update (2026 özet). <https://acsm.org/resistance-training-guidelines-update-2026/>
- [31] ACSM yıllık toplantı özeti. Fascia Stretch Training-7 Induces Similar Metabolic Response, But Lower Mechanical Stress. *Med Sci Sports Exerc.* 2018;50(5S):S2649.
- [32] Enes A, Alves RC, Schoenfeld BJ ve ark. Rest-pause and drop-set training elicit similar strength and hypertrophy adaptations compared with traditional sets in resistance-trained males. *Appl Physiol Nutr Metab.* 2021;46(11):1417-1424. PMID: 34197702.

Tek paragraf özet

Özet: 5 gün (çekiş-itiş-bacak-çekiş-itiş), üst vücut 2x, bacak 1 dolu seans, kas başına kabaca 10+ ağır set, 8-15 tekrar, RIR 1-3, tam/uzun ROM, cheat/FST-7/drop yok. 94 kg için protein 160-180 g, kalori 2500-2800 bandı, günde 7-10 bin adım. 4 günlük haftada bacak kalır, Gün 5 'üst karma'ya döner. Hareket markası ikincildir [1].

Hazırlanış: Eylül 2026. Fotoğraf + 187 cm / 94 kg + 5 gün (1 bacak) tercihi. Genel popülasyon kılavuzu olarak kopyalanmamalı.