高校1年　HS-MATH1-U05　データの分析

# 問題プリント　データの分析　問題プリント　問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U05-LESSON

| 組　番　氏名 | ／260 点 |
|---|---|

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの分布　四分位範囲と箱ひげ図：四分位数・箱ひげ図 JH-MATH-G2-U07
- データの活用：代表値 JH-MATH-G1-U07

### 授業前の確認

- 平均値・中央値・最頻値（中学1年）を求められる。
- 四分位数と箱ひげ図（中学2年）をかける。
- 平方根の計算と、確率の基本的な求め方を知っている。

### 発展・応用への接続

- 統計的な推測：確率分布と統計的推測 HS-MATHB-U02

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

## A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

**A-01**　次のデータの分散を求めなさい。　33，31，25，33，22，24　　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-02**　次のデータの分散を求めなさい。　23，22，29，25，26　　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-03** 次のデータの分散を求めなさい。　5，6，8，1，5　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-04** 次のデータの分散を求めなさい。　24，36，26，31，33　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-05** 次のデータの分散を求めなさい。　21，19，24，28，33　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-06** 次の 11 個のデータの第1四分位数を求めなさい。　28，46，38，24，17，15，27，37，49，20，33　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-07** 次の 7 個のデータの四分位範囲を求めなさい。　10，37，51，46，29，44，45　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-08** 次の 9 個のデータの四分位範囲を求めなさい。　35，17，44，32，11，36，29，15，30　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-09** 次の 9 個のデータの四分位範囲を求めなさい。　22，39，32，59，51，17，30，43，28　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-10** 次の 9 個のデータの第1四分位数を求めなさい。　10，38，16，28，44，20，58，24，21　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-11** 変量 $x$ のデータの平均値が $5$、標準偏差が $2$ である。変量 $y$ を $y = 4x + 28$ で定めるとき、$y$ のデータの平均値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-12** 変量 $x$ のデータの平均値が $28$、標準偏差が $8$ である。変量 $y$ を $y = 4x + 11$ で定めるとき、$y$ のデータの平均値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-13** 変量 $x$ のデータの平均値が $21$、標準偏差が $6$ である。変量 $y$ を $y = -x - 15$ で定めるとき、$y$ のデータの分散を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-14** 変量 $x$ のデータの平均値が $47$、標準偏差が $3$ である。変量 $y$ を $y = -4x - 4$ で定めるとき、$y$ のデータの平均値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-15** ある地域の各日の最高気温 $x$ とその日の飲料の販売数 $y$ について調べたところ、相関係数は $0.02$ であった（架空のデータ）。この結果の解釈として最も適切なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　直線的な相関はほとんどない

イ　強い正の相関がある

ウ　ある地域の各日の最高気温がその日の飲料の販売数を変化させる原因であると結論できる

エ　強い負の相関がある

**A-16** ある地域の各日の最高気温 $x$ とその日の飲料の販売数 $y$ について調べたところ、相関係数は $-0.91$ であった（架空のデータ）。この結果の解釈として最も適切なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　強い正の相関がある

イ　強い負の相関がある

ウ　ある地域の各日の最高気温がその日の飲料の販売数を変化させる原因であると結論できる

エ　直線的な相関はほとんどない

**A-17** 生徒の1日の勉強時間 $x$ と小テストの得点 $y$ について調べたところ、相関係数は $0.95$ であった（架空のデータ）。この結果の解釈として最も適切なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　直線的な相関はほとんどない

イ　生徒の1日の勉強時間が小テストの得点を変化させる原因であると結論できる

ウ　強い正の相関がある

エ　強い負の相関がある

**A-18** 2つの変量 $x$, $y$ について、$x$ の標準偏差が $7$、$y$ の標準偏差が $5$、$x$ と $y$ の共分散が $28$ である。$x$ と $y$ の相関係数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-19** 2つの変量 $x$, $y$ について、$x$ の標準偏差が $7$、$y$ の標準偏差が $9$、$x$ と $y$ の共分散が $37.8$ である。$x$ と $y$ の相関係数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-20** 2つの変量 $x$, $y$ について、$x$ の標準偏差が $4$、$y$ の標準偏差が $8$、$x$ と $y$ の共分散が $-19.2$ である。$x$ と $y$ の相関係数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

## B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

**B-01** 8 個の値からなる変量 $x$ のデータについて、$x$ の平均値は $17$、$x^2$ の平均値は $370$ であった。$x$ のデータの標準偏差を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**B-02** 20 個の値からなる変量 $x$ のデータについて、$x$ の平均値は $4$、$x^2$ の平均値は $97$ であった。$x$ のデータの標準偏差を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**B-03** 10 個の値からなる変量 $x$ のデータについて、$x$ の平均値は $3$、$x^2$ の平均値は $25$ であった。$x$ のデータの標準偏差を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**B-04** 8 個の値からなる変量 $x$ のデータについて、$x$ の平均値は $31$、$x^2$ の平均値は $1061$ であった。$x$ のデータの標準偏差を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**B-05** 5人の生徒の2つの小テストの得点 $(x,\ y)$ は $(3,\ 6)$，$(2,\ 6)$，$(4,\ 4)$，$(1,\ 7)$，$(5,\ 2)$ であった（架空のデータ。下の表にもまとめてある）。$x$ と $y$ の相関係数を、小数第3位を四捨五入して小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

| 生徒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| $y$ | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 |

解答

**B-06** 5人の生徒の2つの小テストの得点 $(x,\ y)$ は $(7,\ 1)$，$(10,\ 1)$，$(6,\ 8)$，$(8,\ 5)$，$(9,\ 10)$ であった（架空のデータ。下の表にもまとめてある）。$x$ と $y$ の相関係数を、小数第3位を四捨五入して小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

| 生徒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 |
| $y$ | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |

解答

**B-07** 5人の生徒の2つの小テストの得点 $(x,\ y)$ は $(4,\ 12)$，$(5,\ 10)$，$(3,\ 6)$，$(2,\ 4)$，$(1,\ 8)$ であった（架空のデータ。下の表にもまとめてある）。$x$ と $y$ の相関係数を、小数第3位を四捨五入して小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

| 生徒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| $y$ | 12 | 10 | 6 | 4 | 8 |

解答

**B-08** 5人の生徒の2つの小テストの得点 $(x,\ y)$ は $(5,\ 7)$，$(3,\ 0)$，$(2,\ 8)$，$(1,\ 5)$，$(4,\ 0)$ であった（架空のデータ。下の表にもまとめてある）。$x$ と $y$ の相関係数を、小数第3位を四捨五入して小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

| 生徒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| $y$ | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 |

解答

**B-09** 次の 10 個のデータについて、「第1四分位数から四分位範囲の1.5倍を引いた値より小さい値、または第3四分位数に四分位範囲の1.5倍を加えた値より大きい値」を外れ値とする。外れ値をすべて答えなさい（ない場合は「なし」と答えなさい）。　49，55，45，43，56，44，47，59，48，86 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-10** 次の 11 個のデータについて、「第1四分位数から四分位範囲の1.5倍を引いた値より小さい値、または第3四分位数に四分位範囲の1.5倍を加えた値より大きい値」を外れ値とする。外れ値をすべて答えなさい（ない場合は「なし」と答えなさい）。　52，59，45，42，53，48，100，60，41，38，39 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-11** 次の 9 個のデータについて、「第1四分位数から四分位範囲の1.5倍を引いた値より小さい値、または第3四分位数に四分位範囲の1.5倍を加えた値より大きい値」を外れ値とする。外れ値をすべて答えなさい（ない場合は「なし」と答えなさい）。　36，41，54，45，55，112，42，31，43　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-12** 次の 11 個のデータについて、「第1四分位数から四分位範囲の1.5倍を引いた値より小さい値、または第3四分位数に四分位範囲の1.5倍を加えた値より大きい値」を外れ値とする。外れ値をすべて答えなさい（ない場合は「なし」と答えなさい）。　0，36，53，52，51，40，50，47，46，34，42　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-13** 新しい飲料 A と従来の飲料 B を 13 人に飲み比べてもらったところ、9 人が A の方がおいしいと答えた（架空の設定）。「A の方が好まれる」と判断してよいかを、基準となる確率を 5% として考える。仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとで、9 人以上が A を選ぶ確率は約 $0.133$ である。正しい判断を選びなさい。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」が正しいことが証明された

イ　「B の方が好まれる」と判断してよい

ウ　仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでも起こりうることなので、「A の方が好まれる」とは判断できない

エ　仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでは起こりにくいことが起こったので、「A の方が好まれる」と判断してよい

**B-14** あるコインを 14 回投げたところ、表が 12 回出た（架空の設定）。「このコインは表が出やすい」と判断してよいかを、基準となる確率を 5% として考える。仮説「このコインは公正である（表が出る確率は $\frac{1}{2}$）」のもとで、表が 12 回以上出る確率は約 $0.006$ である。正しい判断を選びなさい。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　仮説「このコインは公正である（表が出る確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでは起こりにくいことが起こったので、「このコインは表が出やすい」と判断してよい

イ　仮説「このコインは公正である（表が出る確率は $\frac{1}{2}$）」が正しいことが証明された

ウ　仮説「このコインは公正である（表が出る確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでも起こりうることなので、「このコインは表が出やすい」とは判断できない

エ　「このコインは裏が出やすい」と判断してよい

**B-15** 2つの選択肢から1つを選ぶ問題 16 問に、ある生徒が答えたところ 13 問正解した（架空の設定）。「この生徒には実力がある」と判断してよいかを、基準となる確率を 5% として考える。仮説「この生徒はでたらめに答えている（各問の正解の確率は $\frac{1}{2}$）」のもとで、13 問以上正解する確率は約 $0.011$ である。正しい判断を選びなさい。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　「この生徒は正解しにくい答え方をしている」と判断してよい

イ　仮説「この生徒はでたらめに答えている（各問の正解の確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでも起こりうることなので、「この生徒には実力がある」とは判断できない

ウ　仮説「この生徒はでたらめに答えている（各問の正解の確率は $\frac{1}{2}$）」が正しいことが証明された

エ　仮説「この生徒はでたらめに答えている（各問の正解の確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでは起こりにくいことが起こったので、「この生徒には実力がある」と判断してよい

**B-16** 新しい飲料 A と従来の飲料 B を 22 人に飲み比べてもらったところ、14 人が A の方がおいしいと答えた（架空の設定）。「A の方が好まれる」と判断してよいかを、基準となる確率を 5% として考える。仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとで、14 人以上が A を選ぶ確率は約 $0.143$ である。正しい判断を選びなさい。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでも起こりうることなので、「A の方が好まれる」とは判断できない

イ　仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」が正しいことが証明された

ウ　仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでは起こりにくいことが起こったので、「A の方が好まれる」と判断してよい

エ　「B の方が好まれる」と判断してよい

**B-17** A 組 10 人と B 組 5 人の小テストの得点について、A 組の平均値は 43 点、分散は 10、B 組の平均値は 52 点、分散は 28 である（架空のデータ）。2つの組を合わせた 15 人の得点の分散を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-18** A 組 5 人と B 組 5 人の小テストの得点について、A 組の平均値は 44 点、分散は 28、B 組の平均値は 48 点、分散は 20 である（架空のデータ）。2つの組を合わせた 10 人の得点の平均値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-19** A 組 8 人と B 組 8 人の小テストの得点について、A 組の平均値は 46 点、分散は 5、B 組の平均値は 44 点、分散は 29 である（架空のデータ）。2つの組を合わせた 16 人の得点の分散を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-20** A 組 4 人と B 組 4 人の小テストの得点について、A 組の平均値は 46 点、分散は 11、B 組の平均値は 66 点、分散は 19 である（架空のデータ）。2つの組を合わせた 8 人の得点の分散を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

## C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

**C-01** 変量 $x$ のデータ $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ の平均値を $\overline{x}$、標準偏差を $s_x$ とする。$y_k = -5x_k + 4$（$k = 1,\ 2,\ \cdots,\ n$）で定まる変量 $y$ の標準偏差 $s_y$ が $s_y = 5s_x$ となることを証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

**C-02** 変量 $x$ のデータ $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ の平均値を $\overline{x}$、標準偏差を $s_x$ とする。$y_k = 2x_k + 6$（$k = 1,\ 2,\ \cdots,\ n$）で定まる変量 $y$ の標準偏差 $s_y$ が $s_y = 2s_x$ となることを証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

**C-03** 変量 $x$ のデータ $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ の平均値を $\overline{x}$、分散を $s^2$ とする。$s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$ が成り立つことを証明しなさい。ただし、$\overline{x^2}$ は $x_1^2,\ x_2^2,\ \cdots,\ x_n^2$ の平均値である。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

**C-04** ある店で、新しいパン A と従来のパン B を 16 人に食べ比べてもらったところ、12 人が A を選んだ（架空の設定）。「A の方が好まれる」と判断してよいか、基準となる確率を 5% として、仮説検定の考え方を用いて説明しなさい。ただし、各回（各人・各組）の結果は互いに無関係とし、確率 $\dfrac{1}{2}$ で起こることが 16 回中 12 回以上起こる確率は約 $0.038$ であることを用いてよい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

**C-05** ある店で、新しいパン A と従来のパン B を 26 人に食べ比べてもらったところ、16 人が A を選んだ（架空の設定）。「A の方が好まれる」と判断してよいか、基準となる確率を 5% として、仮説検定の考え方を用いて説明しなさい。ただし、各回（各人・各組）の結果は互いに無関係とし、確率 $\frac{1}{2}$ で起こることが 26 回中 16 回以上起こる確率は約 $0.163$ であることを用いてよい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

**C-06** ある生徒が、形が少しゆがんだコインを 22 回投げたところ、表が 16 回出た（架空の設定）。「このコインは表が出やすい」と判断してよいか、基準となる確率を 5% として、仮説検定の考え方を用いて説明しなさい。ただし、各回（各人・各組）の結果は互いに無関係とし、確率 $\frac{1}{2}$ で起こることが 22 回中 16 回以上起こる確率は約 $0.026$ であることを用いてよい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

**C-07** あるコインを 5 回投げたところ、表が 5 回出た（架空の設定）。コインが公正である（表の出る確率が $\frac{1}{2}$）と仮定したとき、表が 5 回以上出る確率を、反復試行の確率を用いて分数で求めなさい。また、基準となる確率を 5% として、「このコインは表が出やすい」と判断してよいか答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATHA-U01

解答

**C-08** データ 15，17，8，11，14 に対して、$t$ の関数 $f(t)=(t-15)^2+(t-17)^2+(t-8)^2+(t-11)^2+(t-14)^2$ を考える。$f(t)$ を最小にする $t$ の値と、そのときの最小値を求めなさい。また、その $t$ の値がデータの何であるかを答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATHA-U01

解答

**C-09** 2つの変量 $x$, $y$ の相関係数は $0.75$ である。変量 $u$, $v$ を $u=x-12$、$v=-2y+15$ で定めるとき、$u$ と $v$ の相関係数を求め、その理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-10** 2つの変量 $x$, $y$ の相関係数は $-0.8$ である。変量 $u$, $v$ を $u=-3x-3$、$v=-4y-14$ で定めるとき、$u$ と $v$ の相関係数を求め、その理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

## D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

**D-01**　データ 12，8，6，14，10 の分散を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x^2$ の平均値は $108$、平均値は $10$ なので、分散は $108-10=98$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-02**　データ 13，1，5，9，2 の分散を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x^2$ の平均値は $56$、平均値は $6$ なので、分散は $56-6=50$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-03** データ 21，25，28，22，24 の分散を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

平均値は 24。偏差は $-3$，$1$，$4$，$-2$，$0$ で、その平均値は $0$ なので、分散は $0$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-04** 変量 $x$ の平均値が $53$、標準偏差が $s_x = 7$ である。$y = -2x - 19$ で定まる変量 $y$ の標準偏差 $s_y$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$s_y = -2s_x = -14$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-05** 変量 $x$ の平均値が $33$、標準偏差が $s_x = 3$ である。$y = 2x + 10$ で定まる変量 $y$ の標準偏差 $s_y$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$s_y = 2s_x + 10 = 16$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-06** 変量 $x$ の平均値が $55$、標準偏差が $s_x = 4$ である。$y = -5x + 12$ で定まる変量 $y$ の標準偏差 $s_y$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$s_y = -5s_x + 12 = -8$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-07** データ 19，11，24，48，43，45，36 の中央値 $Q_2$ と、第1四分位数 $Q_1$、第3四分位数 $Q_3$ を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

中央値は真ん中の値なので 48。前半 19，11，24 の中央値 $Q_1 = 19$、後半 43，45，36 の中央値 $Q_3 = 43$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-08** データ 39，51，44，48，10，57，38 の中央値 $Q_2$ と、第1四分位数 $Q_1$、第3四分位数 $Q_3$ を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

中央値は真ん中の値なので 48。前半 39，51，44 の中央値 $Q_1 = 44$、後半 10，57，38 の中央値 $Q_3 = 38$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-09** ある市の各月のアイスクリームの売上 $x$ とその月の水難事故の件数 $y$ の相関係数は $0.82$ であった（架空のデータ）。このデータからいえることを答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

相関係数が $0.82$ と $1$ に近いので、$x$ を減らせば $y$ も減らせる（$x$ が $y$ の原因である）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

**D-10** 各都市の消防署の数 $x$ とその都市の1年間の火災の件数 $y$ の相関係数は $0.91$ であった（架空のデータ）。このデータからいえることを答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

相関係数が $0.91$ と $1$ に近いので、$x$ を減らせば $y$ も減らせる（$x$ が $y$ の原因である）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-MATH1-U05-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））