高校2年　HS-MATHC-U01　ベクトル

問題プリント ベクトル　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHC-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形と計量：三角比 HS-MATH1-U04
- 図形の性質：図形の性質 HS-MATHA-U02

授業前の確認

- 三平方の定理と余弦定理（数学Ⅰ）を使える。
- $\cos\theta$ の値から $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の角を求められる。
- 座標平面上の2点間の距離・内分点の座標（数学Ⅱ）を求められる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル：ベクトルの応用 CT-MATH2BC-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 2つのベクトル $\vec{a}=(-5,\ -5)$, $\vec{b}=(-4,\ -2)$ について、ベクトル $4\vec{a}-2\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 2つのベクトル $\vec{a}=(3,\ 5)$, $\vec{b}=(-4,\ -2)$ について、ベクトル $-2\vec{a}+3\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 2つのベクトル $\vec{a}=(3,\,5)$, $\vec{b}=(-1,\,4)$ について、ベクトル $3\vec{a}-\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 2つのベクトル $\vec{a}=(-1,\,0)$, $\vec{b}=(-4,\,5)$ について、ベクトル $4\vec{a}+2\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 2つのベクトル $\vec{a}=(2,\,2)$, $\vec{b}=(-5,\,-4)$ について、ベクトル $\vec{a}-3\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角 θ として正しいものを選びなさい。ただし $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$\theta=90^\circ$　　イ　$\theta=30^\circ$　　ウ　$\theta=60^\circ$　　エ　$\theta=120^\circ$

A-07 ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=3\sqrt{2}$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=9$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角 θ として正しいものを選びなさい。ただし $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$\theta=135^\circ$　　イ　$\theta=45^\circ$　　ウ　$\theta=30^\circ$　　エ　$\theta=60^\circ$

A-08 ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}|=5$, $|\vec{b}|=2\sqrt{2}$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-10$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角 θ として正しいものを選びなさい。ただし $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$\theta=120^\circ$　　イ　$\theta=135^\circ$　　ウ　$\theta=90^\circ$　　エ　$\theta=45^\circ$

A-09 ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4\sqrt{2}$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-12$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角 θ として正しいものを選びなさい。ただし $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$\theta=45^\circ$　　イ　$\theta=120^\circ$　　ウ　$\theta=150^\circ$　　エ　$\theta=135^\circ$

A-10 ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 6$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 15$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角 θ として正しいものを選びなさい。ただし $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$\theta = 120^\circ$　　イ　$\theta = 90^\circ$　　ウ　$\theta = 45^\circ$　　エ　$\theta = 60^\circ$

A-11 k を定数とする。$\vec{a} = (k,\ 5)$ と $\vec{b} = (-5,\ 2)$ が垂直になるような k の値を求めなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

A-12 k を定数とする。$\vec{a} = (-4,\ k)$ と $\vec{b} = (3,\ -6)$ が平行になるような k の値を求めなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

A-13 k を定数とする。$\vec{a} = (k,\ 6)$ と $\vec{b} = (3,\ 5)$ が垂直になるような k の値を求めなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

A-14 k を定数とする。$\vec{a} = (k,\ 6)$ と $\vec{b} = (-3,\ -2)$ が平行になるような k の値を求めなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

A-15 k を定数とする。$\vec{a} = (k,\ -6)$ と $\vec{b} = (-2,\ 1)$ が垂直になるような k の値を求めなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

A-16 座標平面上の2点 A$(-6,\ 2)$、B$(-2,\ -2)$ に対して、線分 AB を $1:3$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-17 座標平面上の2点 $\mathrm{A}(5,\ 1)$、$\mathrm{B}(-1,\ -5)$ に対して、線分 AB を $5:1$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-18 座標平面上の2点 $\mathrm{A}(1,\ -2)$、$\mathrm{B}(-5,\ 1)$ に対して、線分 AB を $1:2$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-19 座標平面上の2点 $\mathrm{A}(2,\ -4)$、$\mathrm{B}(-4,\ 2)$ に対して、線分 AB を $5:1$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-20 座標平面上の2点 $\mathrm{A}(6,\ -1)$、$\mathrm{B}(-6,\ -5)$ に対して、線分 AB を $1:3$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 2つのベクトル $\vec{a}=(-2,\ 0)$, $\vec{b}=(-2,\ -2)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-02 2つのベクトル $\vec{a}=(2,\ 0)$, $\vec{b}=(-4,\ 4)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-03 2つのベクトル $\vec{a} = (-2,\ -1)$, $\vec{b} = (-1,\ -3)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-04 空間の2つのベクトル $\vec{a} = (2,\ 2,\ 0)$, $\vec{b} = (-1,\ 0,\ -1)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-05 2つのベクトル $\vec{a} = (0,\ 3)$, $\vec{b} = (-6,\ 0)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-06 $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 2$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$ のとき、$|-\vec{a} - 2\vec{b}|$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-07 $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 5$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -6$ のとき、$|-\vec{a} + \vec{b}|$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-08 $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -4$ のとき、$|-\vec{a} - 3\vec{b}|$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-09 $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 5$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -7$ のとき、$|\vec{a} - 2\vec{b}|$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-10 3点 $\mathrm{A}(-4,\ -3)$、$\mathrm{B}(1,\ 4)$、$\mathrm{C}(5,\ -1)$ を頂点とする $\triangle \mathrm{ABC}$ の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-11 3点 $\mathrm{A}(0,\,-2)$、$\mathrm{B}(-4,\,5)$、$\mathrm{C}(2,\,5)$ を頂点とする $\triangle\mathrm{ABC}$ の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-12 3点 $\mathrm{A}(-4,\,1)$、$\mathrm{B}(-2,\,2)$、$\mathrm{C}(-1,\,2)$ を頂点とする $\triangle\mathrm{ABC}$ の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-13 3点 $\mathrm{A}(-4,\,4)$、$\mathrm{B}(1,\,3)$、$\mathrm{C}(-1,\,1)$ を頂点とする $\triangle\mathrm{ABC}$ の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-14 空間のベクトル $\vec{a}=(-1,\,2,\,-4)$, $\vec{b}=(0,\,1,\,1)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 空間のベクトル $\vec{a}=(1,\,-4,\,-4)$, $\vec{b}=(-2,\,-1,\,-1)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 空間のベクトル $\vec{a}=(-2,\,2,\,2)$, $\vec{b}=(-1,\,0,\,0)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 空間のベクトル $\vec{a}=(2,\,-1,\,-4)$, $\vec{b}=(-1,\,0,\,1)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 空間の3点 $\mathrm{A}(-1,\ -2,\ 3)$、$\mathrm{B}(-1,\ -3,\ 0)$、$\mathrm{C}(p,\ q,\ 9)$ が一直線上にあるとき、$p,\ q$ の値を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-19 空間の3点 $\mathrm{A}(1,\ -2,\ 0)$、$\mathrm{B}(0,\ -1,\ -3)$、$\mathrm{C}(p,\ q,\ 3)$ が一直線上にあるとき、$p,\ q$ の値を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-20 空間の3点 $\mathrm{A}(1,\ 0,\ -2)$、$\mathrm{B}(-2,\ 2,\ -1)$、$\mathrm{C}(p,\ q,\ -4)$ が一直線上にあるとき、$p,\ q$ の値を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復


解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。


C-01　△OAB において、辺 OA を $1:2$ に内分する点を P、辺 OB を $4:3$ に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OX}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ を用いて表しなさい。途中の考え方も書くこと。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02




C-02 △OAB において、辺 OA を $2:1$ に内分する点を P、辺 OB を $1:2$ に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OX}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ を用いて表しなさい。途中の考え方も書くこと。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02




C-03 △OAB において、辺 OA を 1 : 4 に内分する点を P、辺 OB を 1 : 1 に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。$\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ とするとき、$\overrightarrow{OX}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ を用いて表しなさい。途中の考え方も書くこと。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02



C-04 △OAB において、辺 OA を $3:4$ に内分する点を P、辺 OB を $2:3$ に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OX}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ を用いて表しなさい。途中の考え方も書くこと。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02



C-05 △OAB において $\mathrm{OA}=6$, $\mathrm{OB}=4$, $\mathrm{AB}=6$ である。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とするとき、内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と △OAB の面積 S を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

C-06 △OAB において $\mathrm{OA}=7$, $\mathrm{OB}=5$, $\mathrm{AB}=6$ である。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とするとき、内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と △OAB の面積 S を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

C-07 △OAB において $\mathrm{OA}=6,\ \mathrm{OB}=8,\ \mathrm{AB}=8$ である。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とするとき、内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と △OAB の面積 S を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

C-08 $\vec{a}=(-3,\ 0)$ に垂直な大きさが 1 のベクトル $\vec{e}$ をすべて求めなさい。答えだけでなく、条件を式で表して求める過程も書くこと。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-09 $\vec{a}=(36,\ 15)$ に垂直な大きさが 26 のベクトル $\vec{e}$ をすべて求めなさい。答えだけでなく、条件を式で表して求める過程も書くこと。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-10 $\vec{a}=(8,\ -15)$ に垂直な大きさが 17 のベクトル $\vec{e}$ をすべて求めなさい。答えだけでなく、条件を式で表して求める過程も書くこと。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 $|\vec{a}|=1,\ |\vec{b}|=6,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=-5$ のとき、$|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2=1+36=37$　よって $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{37}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　$|\vec{a}|=1,\ |\vec{b}|=6,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=-1$ のとき、$|\vec{a}-\vec{b}|$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$|\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2=1+36=37$　よって $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{37}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03　$|\vec{a}|=1,\ |\vec{b}|=3,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=2$ のとき、$|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2=1+9=10$　よって $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{10}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 2点 A$(2,\ 4)$、B$(-4,\ 4)$ に対して、線分 AB を $3:5$ に外分する点 Q の座標を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{m\vec{a}-n\vec{b}}{m-n}$ に $m=3,\ n=5$ を代入して、$x=\dfrac{3\cdot(2)-5\cdot(-4)}{-2}=-13$、$y=\dfrac{3\cdot(4)-5\cdot(4)}{-2}=4$。よって $(-13,\ 4)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 2点 A$(-1,\ -5)$、B$(-3,\ -3)$ に対して、線分 AB を $3:1$ に外分する点 Q の座標を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{m\vec{a}-n\vec{b}}{m-n}$ に $m=3,\ n=1$ を代入して、$x=\dfrac{3\cdot(-1)-1\cdot(-3)}{2}=0$、$y=\dfrac{3\cdot(-5)-1\cdot(-3)}{2}=-6$。よって $(0,\ -6)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 2点 A$(-4,\ 3)$、B$(4,\ 3)$ に対して、線分 AB を $3:1$ に外分する点 Q の座標を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{m\vec{a}-n\vec{b}}{m-n}$ に $m=3,\ n=1$ を代入して、$x=\dfrac{3\cdot(-4)-1\cdot(4)}{2}=-8$、$y=\dfrac{3\cdot(3)-1\cdot(3)}{2}=3$ 。よって $(-8,\ 3)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 2つのベクトル $\vec{a}=(-3,\ 3),\ \vec{b}=(0,\ -12)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$\vec{a}\cdot\vec{b}=-36$、$|\vec{a}|=\sqrt{18},\ |\vec{b}|=\sqrt{144}$ より $\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$。$\cos\theta$ の大きさが $\cos 45^\circ$ と等しいので $\theta=45^\circ$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 2つのベクトル $\vec{a}=(2,\,0,\,2)$, $\vec{b}=(0,\,2,\,-2)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\vec{a}\cdot\vec{b}=-4$、$|\vec{a}|=\sqrt{8}$, $|\vec{b}|=\sqrt{8}$ より $\cos\theta=-\frac{1}{2}$。$\cos\theta$ の大きさが $\cos 60^\circ$ と等しいので $\theta=60^\circ$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 $\vec{a}=(-5,\,k)$ と $\vec{b}=(1,\,-3)$ が平行になるような定数 k の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

平行なので $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$。$-5\cdot(1)+k\cdot(-3)=0$ より $k=-\dfrac{5}{3}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 $\vec{a}=(3,\ k)$ と $\vec{b}=(-1,\ -4)$ が平行になるような定数 k の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

平行なので $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$。$3\cdot(-1)+k\cdot(-4)=0$ より $k=-\dfrac{3}{4}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-MATHC-U01-EX ｜ 版 1.3.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））