高校2年　HS-GEOE-U01　自然環境

問題プリント 自然環境　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-GEOE-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	イ　古期造山帯	2
A-02	エ　安定陸塊	2
A-03	ウ　古期造山帯	2
A-04	エ　古期造山帯	2
A-05	エ　エスチュアリー（三角江）	2
A-06	ア　扇状地	2
A-07	ウ　環礁	2
A-08	エ　海岸段丘	2
A-09	ウ　氷雪気候（**EF**）	2
A-10	ア　温暖冬季少雨気候（**Cw**）	2
A-11	エ　ツンドラ気候（**ET**）	2
A-12	ア　**EF**	2
A-13	ウ　硬葉樹	2
A-14	エ　チェルノーゼム	2
A-15	イ　ラトソル	2
A-16	エ　マングローブ	2
A-17	**484 mm**	2
A-18	**464 mm**	2
A-19	**47.5** ℃	2
A-20	**7.3** ℃	2
B-01	エ　亜寒帯湿潤気候（**Df**）	4
B-02	エ　砂漠気候（**BW**）	4
B-03	イ　熱帯雨林気候（**Af**）	4
B-04	ア　温暖冬季少雨気候（**Cw**）	4

番号	正答	配点
B-05	エ　西岸海洋性気候（**Cfb**）	4
B-06	イ　亜寒帯冬季少雨気候（**Dw**）	4
B-07	ア　温暖湿潤気候（**Cfa**）	4
B-08	イ　狭まる境界（沈み込み）	4
B-09	イ　狭まる境界（沈み込み）	4
B-10	エ　アフリカ大地溝帯	4
B-11	エ　サンアンドレアス断層	4
B-12	ア　エスチュアリー（三角江）	4
B-13	ア　河川が山地から平地に出る所で、粗い砂礫が扇形に堆積してできた。	4
B-14	イ　氷河が削った**U**字谷が沈水してできた。	4
B-15	ウ　太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯が移動してきて雨季に、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季になるから。	4
B-16	イ　**1**年を通して亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくいから。	4
B-17	ウ　夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、冬は気圧帯が南下して偏西風や低気圧の影響を受けるから。	4
B-18	ア　高潮	4
B-19	ア　エルニーニョ現象	4
B-20	ア　海抜ゼロメートル地帯の三角州	4
C-01	**(1)** 北半球。**7**月ごろに気温が最も高いから。　**(2) 1167÷1377×100 ≒ 85 %**　**(3)** サバナ気候（**Aw**）。太陽の高度が高…	8
C-02	**(1)** 北半球。**7**月ごろに気温が最も高いから。　**(2) 1102÷1263×100 ≒ 87 %**　**(3)** サバナ気候（**Aw**）。太陽の高度が高…	8
C-03	**(1)** 北半球。**7**月ごろに気温が最も高いから。　**(2) 86÷478×100 ≒ 18 %**　**(3)** 地中海性気候（**Cs**）。夏は亜熱帯高圧帯に…	8
C-04	**(1)** 最暖月 **14.1**℃、最寒月 **11.7**℃（どちらも地点**L**より **14.3**℃ 低い）　**(2)** 最寒月 **11.7**℃ は **−3**℃ 以上 **18**℃…	8
C-05	**(1)** 最暖月 **13.9**℃、最寒月 **12.6**℃（どちらも地点**L**より **13**℃ 低い）　**(2)** 最寒月 **12.6**℃ は **−3**℃ 以上 **18**℃ 未…	8
C-06	**(1)** 最暖月 **11.5**℃、最寒月 **9.8**℃（どちらも地点**L**より **15.6**℃ 低い）　**(2)** 最寒月 **9.8**℃ は **−3**℃ 以上 **18**℃ 未…	8
C-07	**(1) X：r＝20(t＋7)＝646 mm、Y：r＝20(t＋7)＝296 mm**　**(2) X** は年降水量 **400 mm** が **646 mm**…	8
C-08	**(1) X：r＝20(t＋14)＝800 mm、Y：r＝20t＝144 mm**　**(2) X** は年降水量 **700 mm** が **800 mm** 未満で…	8
C-09	**(1)** 地区ア：津波、地区イ：浸水（内水氾濫・外水氾濫）　**(2)** 地区アは湾の奥ほど幅がせまくなり、津波が高くなりやすい。地区イは周囲より低…	8
C-10	**(1)** 地区ア：高潮、地区イ：津波　**(2)** 地区アは低平な土地で、台風による海面の吸い上げと吹き寄せで海水が入りやすい。地区イは湾の奥ほど幅…	8

番号	正答	配点
D-01	**662 mm**	6
D-02	ステップ気候（**BS**）	6
D-03	ステップ気候（**BS**）	6
D-04	年較差 **45.7**℃、冷帯（亜寒帯）	6
D-05	年較差 **31.3**℃、冷帯（亜寒帯）	6
D-06	高温多雨のため落ち葉はすぐに分解され、養分は植物に吸収されるか雨で流されてしまう。土壌は鉄やアルミニウムの酸化物が残った赤色のやせたラトソル…	6
D-07	夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくく雨が少ない。上昇気流は雲をつくり雨をもたらす。	6
D-08	それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。	6
D-09	それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。	6
D-10	**3**つはいずれも熱帯低気圧で、発生する海域によって呼び名が異なる。北西太平洋では台風、北大西洋・北東太平洋ではハリケーン、インド洋・南太平洋で…	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　イ　古期造山帯　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。「グレートディヴァイディング山脈がふくまれる地域である。」

思考の糸口　造山運動を受けた時期（先カンブリア時代・古生代・中生代〜新生代）と、その後の侵食の長さから考える。

解法

1. 説明から、造山運動の時期・地形の険しさ・資源などの手がかりを読み取る。
2. 手がかりに合うのは古期造山帯。

選択肢の分析

ア	新期造山帯は、中生代から新生代にかけて造山運動を受け、険しい山地が連なり地震や火山活動が活発な地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同
ウ	安定陸塊は、先カンブリア時代に造山運動を受け、その後長く侵食されて楯状地や卓状地などの平坦な地形が広がる地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同
エ	海嶺はプレートの広がる境界にあたる海底の大山脈で、大地形の区分（造山運動の時期）とは別の観点である。 誤概念：プレート境界の地形と造山運動による区分の混同

別解・別の確かめ方

- 代表的な山脈・資源（鉄鉱石・石炭・地震や火山）を3つの区分に振り分けた表をつくり、照らし合わせる。

部分点のポイント

- 区分の基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 古期造山帯と新期造山帯を山の高さだけで区別する。
- 安定陸塊を造山運動の新しい地域と取り違える。

A-02　正答　エ　安定陸塊　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

造山運動の時期による大地形の区分について、次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。「先カンブリア時代に造山運動を受けたのち、長い間侵食を受けて平坦になった地域で、鉄鉱石の産出が多い。」

思考の糸口　造山運動を受けた時期（先カンブリア時代・古生代・中生代〜新生代）と、その後の侵食の長さから考える。

解法

1. 説明から、造山運動の時期・地形の険しさ・資源などの手がかりを読み取る。
2. 手がかりに合うのは安定陸塊。

選択肢の分析

ア	古期造山帯は、古生代に造山運動を受け、長い侵食によって比較的なだらかになった山地が見られる地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同
イ	ホットスポットはプレート内部でマグマが供給される場所で、造山運動の時期による区分ではない。 誤概念：プレート境界の地形と造山運動による区分の混同
ウ	新期造山帯は、中生代から新生代にかけて造山運動を受け、険しい山地が連なり地震や火山活動が活発な地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同

別解・別の確かめ方

- 代表的な山脈・資源（鉄鉱石・石炭・地震や火山）を3つの区分に振り分けた表をつくり、照らし合わせる。

部分点のポイント

- 区分の基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 古期造山帯と新期造山帯を山の高さだけで区別する。
- 安定陸塊を造山運動の新しい地域と取り違える。

A-03　正答　ウ　古期造山帯　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

世界の大地形について、次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。「長い侵食によってなだらかになった山地が多く、周辺で石炭の産出が多い。」

思考の糸口　造山運動を受けた時期（先カンブリア時代・古生代・中生代〜新生代）と、その後の侵食の長さから考える。

解法

1. 説明から、造山運動の時期・地形の険しさ・資源などの手がかりを読み取る。
2. 手がかりに合うのは古期造山帯。

選択肢の分析

ア	ホットスポットはプレート内部でマグマが供給される場所で、造山運動の時期による区分ではない。 誤概念：プレート境界の地形と造山運動による区分の混同
イ	新期造山帯は、中生代から新生代にかけて造山運動を受け、険しい山地が連なり地震や火山活動が活発な地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同
エ	安定陸塊は、先カンブリア時代に造山運動を受け、その後長く侵食されて楯状地や卓状地などの平坦な地形が広がる地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同

別解・別の確かめ方

- 代表的な山脈・資源（鉄鉱石・石炭・地震や火山）を3つの区分に振り分けた表をつくり、照らし合わせる。

部分点のポイント

- 区分の基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 古期造山帯と新期造山帯を山の高さだけで区別する。
- 安定陸塊を造山運動の新しい地域と取り違える。

A-04　正答　エ　古期造山帯　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。「長い侵食によってなだらかになった山地が多く、周辺で石炭の産出が多い。」

思考の糸口　造山運動を受けた時期（先カンブリア時代・古生代・中生代〜新生代）と、その後の侵食の長さから考える。

解法

1. 説明から、造山運動の時期・地形の険しさ・資源などの手がかりを読み取る。
2. 手がかりに合うのは古期造山帯。

選択肢の分析

ア	安定陸塊は、先カンブリア時代に造山運動を受け、その後長く侵食されて楯状地や卓状地などの平坦な地形が広がる地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同
イ	海嶺はプレートの広がる境界にあたる海底の大山脈で、大地形の区分（造山運動の時期）とは別の観点である。 誤概念：プレート境界の地形と造山運動による区分の混同
ウ	新期造山帯は、中生代から新生代にかけて造山運動を受け、険しい山地が連なり地震や火山活動が活発な地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同

別解・別の確かめ方

- 代表的な山脈・資源（鉄鉱石・石炭・地震や火山）を3つの区分に振り分けた表をつくり、照らし合わせる。

部分点のポイント

- 区分の基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 古期造山帯と新期造山帯を山の高さだけで区別する。
- 安定陸塊を造山運動の新しい地域と取り違える。

A-05 正答 エ　エスチュアリー（三角江）　2点

概念理解

次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。「河口部が沈水してラッパ状に広がった入り江」

思考の糸口 説明の中の「何が（河川・波・氷河・溶食）」「どこで」「侵食か堆積か」に注目する。

解法

1. 地形をつくったはたらき（河川・海・氷河・溶食）を読み取る。
2. 侵食・堆積・沈水などのでき方を確かめる。
3. 当てはまるのはエスチュアリー（三角江）。

選択肢の分析

ア	リアス海岸は、山地の谷（V字谷）に海水が入りこんでできた、のこぎりの歯のような出入りの多い海岸である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
イ	モレーンは、氷河が運んだ岩石や土砂が、氷河の末端や側方に堆積した丘である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
ウ	ドリーネは、石灰岩が雨水に溶けてできた、すり鉢状の凹地である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の地形を、でき方のはたらきごとに分類してから消去する。

部分点のポイント

- でき方を手がかりにしている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- リアス海岸とフィヨルド（V字谷とU字谷）を取り違える。
- 自然堤防と後背湿地を逆にする。

A-06 正答 ア　扇状地

2点

概念理解

次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。「河川が山地から平地に出る所で、流れが急に弱まり砂や礫が扇形に堆積した地形」

思考の糸口 説明の中の「何が（河川・波・氷河・溶食）」「どこで」「侵食か堆積か」に注目する。

解法

1. 地形をつくったはたらき（河川・海・氷河・溶食）を読み取る。
2. 侵食・堆積・沈水などのでき方を確かめる。
3. 当てはまるのは扇状地。

選択肢の分析

イ	環礁は、島が沈降して中央の島が見えなくなり、サンゴ礁だけが輪のように残った地形である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
ウ	三角州は、河口付近で、流れが弱まって細かい土砂が堆積してできた低平な地形である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
エ	河岸段丘は、川沿いに、平坦面と急崖が階段状に並んでいる地形である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の地形を、でき方のはたらきごとに分類してから消去する。

部分点のポイント

- でき方を手がかりにしている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- リアス海岸とフィヨルド（V字谷とU字谷）を取り違える。
- 自然堤防と後背湿地を逆にする。

A-07　正答　ウ　環礁　　2点

概念理解

次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。「島が沈降して中央の島が見えなくなり、サンゴ礁だけが輪のように残った地形」

思考の糸口　説明の中の「何が（河川・波・氷河・溶食）」「どこで」「侵食か堆積か」に注目する。

解法

1. 地形をつくったはたらき（河川・海・氷河・溶食）を読み取る。
2. 侵食・堆積・沈水などのでき方を確かめる。
3. 当てはまるのは環礁。

選択肢の分析

ア	モレーンは、氷河が運んだ岩石や土砂が、氷河の末端や側方に堆積した丘である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
イ	自然堤防は、洪水のときに川からあふれた水が運んだ砂が、川沿いに堆積してできた微高地である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
エ	海岸段丘は、海岸沿いに、平坦面と急崖が階段状に並んでいる地形である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の地形を、でき方のはたらきごとに分類してから消去する。

部分点のポイント

- でき方を手がかりにしている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- リアス海岸とフィヨルド（V字谷とU字谷）を取り違える。
- 自然堤防と後背湿地を逆にする。

A-08 正答 エ　海岸段丘

2点

概念理解

次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。「海岸沿いに、平坦面と急崖が階段状に並んでいる地形」

思考の糸口 説明の中の「何が（河川・波・氷河・溶食）」「どこで」「侵食か堆積か」に注目する。

解法

1. 地形をつくったはたらき（河川・海・氷河・溶食）を読み取る。
2. 侵食・堆積・沈水などのでき方を確かめる。
3. 当てはまるのは海岸段丘。

選択肢の分析

ア	ドリーネは、石灰岩が雨水に溶けてできた、すり鉢状の凹地である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
イ	フィヨルドは、氷河が削ってできたU字谷に海水が入りこんでできた、奥行きの長い入り江である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
ウ	三日月湖は、蛇行していた川の流路が洪水などで短絡し、取り残されてできた湖である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の地形を、でき方のはたらきごとに分類してから消去する。

部分点のポイント

- でき方を手がかりにしている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- リアス海岸とフィヨルド（V字谷とU字谷）を取り違える。
- 自然堤防と後背湿地を逆にする。

A-09　正答　ウ　氷雪気候（EF）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。「最暖月平均気温が 0℃ 未満である。」

思考の糸口　①寒帯か（最暖月 10℃）②乾燥帯か（乾燥限界）③最寒月の気温で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に条件を読む。

解法

1. 条件文から、どの段階の基準かを読み取る。
2. 気温の境界値（18℃・−3℃・10℃・22℃）や降水の型（s・w・f）を確かめる。
3. 当てはまるのはEF。

選択肢の分析

ア	ツンドラ気候（ET）の条件は「最暖月平均気温が 0℃ 以上 10℃ 未満である。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
イ	亜寒帯冬季少雨気候（Dw）の条件は「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、冬に乾燥する。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
エ	砂漠気候（BW）の条件は「年降水量が乾燥限界の半分未満である。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同

別解・別の確かめ方

- 判定の流れ図を書き、条件文をたどって確かめる。

部分点のポイント

- 判定基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- −3℃ と 18℃ の境界を取り違える。
- s（夏に乾燥）と w（冬に乾燥）を逆にする。

A-10　正答　ア　温暖冬季少雨気候（Cw）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、冬に乾燥し夏に雨が多い。」

思考の糸口　①寒帯か（最暖月 10℃）②乾燥帯か（乾燥限界）③最寒月の気温で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に条件を読む。

解法

1. 条件文から、どの段階の基準かを読み取る。
2. 気温の境界値（18℃・−3℃・10℃・22℃）や降水の型（s・w・f）を確かめる。
3. 当てはまるのはCw。

選択肢の分析

イ	地中海性気候（Cs）の条件は「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、夏に乾燥し冬に雨が多い。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
ウ	ステップ気候（BS）の条件は「年降水量が乾燥限界の半分以上で、乾燥限界未満である。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
エ	亜寒帯冬季少雨気候（Dw）の条件は「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、冬に乾燥する。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同

別解・別の確かめ方

- 判定の流れ図を書き、条件文をたどって確かめる。

部分点のポイント

- 判定基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- −3℃ と 18℃ の境界を取り違える。
- s（夏に乾燥）と w（冬に乾燥）を逆にする。

A-11 正答 エ　ツンドラ気候（ET）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。「最暖月平均気温が 0℃ 以上 10℃ 未満である。」

思考の糸口 ①寒帯か（最暖月 10℃）②乾燥帯か（乾燥限界）③最寒月の気温で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に条件を読む。

解法

1. 条件文から、どの段階の基準かを読み取る。
2. 気温の境界値（18℃・−3℃・10℃・22℃）や降水の型（s・w・f）を確かめる。
3. 当てはまるのはET。

選択肢の分析

ア	亜寒帯湿潤気候（Df）の条件は「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、年中湿潤である。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
イ	温暖冬季少雨気候（Cw）の条件は「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、冬に乾燥し夏に雨が多い。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
ウ	氷雪気候（EF）の条件は「最暖月平均気温が 0℃ 未満である。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同

別解・別の確かめ方

- 判定の流れ図を書き、条件文をたどって確かめる。

部分点のポイント

- 判定基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- −3℃ と 18℃ の境界を取り違える。
- s（夏に乾燥）と w（冬に乾燥）を逆にする。

A-12　正答　ア　EF　　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。「最暖月平均気温が 0℃ 未満である。」

思考の糸口　①寒帯か（最暖月 10℃）②乾燥帯か（乾燥限界）③最寒月の気温で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に条件を読む。

解法

1. 条件文から、どの段階の基準かを読み取る。
2. 気温の境界値（18℃・−3℃・10℃・22℃）や降水の型（s・w・f）を確かめる。
3. 当てはまるのはEF。

選択肢の分析

イ	ツンドラ気候（ET）の条件は「最暖月平均気温が 0℃ 以上 10℃ 未満である。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
ウ	亜寒帯冬季少雨気候（Dw）の条件は「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、冬に乾燥する。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
エ	熱帯雨林気候（Af）の条件は「最寒月平均気温が 18℃ 以上で、最少雨月の降水量も 60 mm 以上ある。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同

別解・別の確かめ方

- 判定の流れ図を書き、条件文をたどって確かめる。

部分点のポイント

- 判定基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- −3℃ と 18℃ の境界を取り違える。
- s（夏に乾燥）と w（冬に乾燥）を逆にする。

A-13　正答　ウ　硬葉樹　2点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる植生として最も適当なものを選びなさい。「夏の乾燥に耐えるため、小さく硬い葉をもつオリーブやコルクがしなどの樹木」

思考の糸口　説明の中の「気候（高温多雨・寒冷・乾燥）」「色」「母岩（石灰岩・玄武岩）」「分布する地域」を手がかりにする。

解法

1. 説明から気候や母岩、分布地域の手がかりを抜き出す。
2. 手がかりに合うのは硬葉樹。

選択肢の分析

ア	サバナは、雨季と乾季のある熱帯で、長い草の草原に低木がまばらに生える植生である。 誤概念：気候・母岩と植生の対応の混同
イ	照葉樹林は、シイ・カシ・クスなど、表面に光沢のある葉をもつ常緑広葉樹の森林である。 誤概念：気候・母岩と植生の対応の混同
エ	タイガは、冷帯（亜寒帯）に広がる、モミ・トウヒ・カラマツなどの針葉樹の純林である。 誤概念：気候・母岩と植生の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 気候帯ごとに、植生と土壌を1つずつ対応させた表を書いて確かめる。

部分点のポイント

- 気候・母岩との対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- テラロッサとテラローシャを取り違える。
- 熱帯雨林の土壌を肥沃だと考える。

A-14 正答 エ　チェルノーゼム

2点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる土壌として最も適当なものを選びなさい。「ウクライナからロシア南部のステップに分布する、草の腐植が厚く積もった肥沃な黒色土」

思考の糸口 説明の中の「気候（高温多雨・寒冷・乾燥）」「色」「母岩（石灰岩・玄武岩）」「分布する地域」を手がかりにする。

解法

1. 説明から気候や母岩、分布地域の手がかりを抜き出す。
2. 手がかりに合うのはチェルノーゼム。

選択肢の分析

ア	褐色森林土は、温帯の落葉広葉樹林の下に分布する、比較的肥沃な褐色の土壌である。 誤概念：気候・母岩と土壌の対応の混同
イ	テラロッサは、地中海沿岸に分布する、石灰岩が風化してできた赤色の土壌である。 誤概念：気候・母岩と土壌の対応の混同
ウ	レグールは、デカン高原に分布する、玄武岩が風化してできた黒色の土壌で、綿花栽培に利用されるである。 誤概念：気候・母岩と土壌の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 気候帯ごとに、植生と土壌を1つずつ対応させた表を書いて確かめる。

部分点のポイント

- 気候・母岩との対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- テラロッサとテラローシャを取り違える。
- 熱帯雨林の土壌を肥沃だと考える。

A-15 正答 イ　ラトソル

2点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる土壌として最も適当なものを選びなさい。「熱帯の高温多雨のもとで有機物の分解と養分の流出が進み、鉄やアルミニウムの酸化物が残った赤色のやせた土壌」

思考の糸口 説明の中の「気候（高温多雨・寒冷・乾燥）」「色」「母岩（石灰岩・玄武岩）」「分布する地域」を手がかりにする。

解法

1. 説明から気候や母岩、分布地域の手がかりを抜き出す。
2. 手がかりに合うのはラトソル。

選択肢の分析

ア	レグールは、デカン高原に分布する、玄武岩が風化してできた黒色の土壌で、綿花栽培に利用されるである。 誤概念：気候・母岩と土壌の対応の混同
ウ	褐色森林土は、温帯の落葉広葉樹林の下に分布する、比較的肥沃な褐色の土壌である。 誤概念：気候・母岩と土壌の対応の混同
エ	チェルノーゼムは、ウクライナからロシア南部のステップに分布する、草の腐植が厚く積もった肥沃な黒色土である。 誤概念：気候・母岩と土壌の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 気候帯ごとに、植生と土壌を1つずつ対応させた表を書いて確かめる。

部分点のポイント

- 気候・母岩との対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- テラロッサとテラローシャを取り違える。
- 熱帯雨林の土壌を肥沃だと考える。

A-16 正答 エ　マングローブ

2点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる植生として最も適当なものを選びなさい。「熱帯・亜熱帯の河口付近など、海水と淡水が混じる潮間帯に生える森林」

思考の糸口 説明の中の「気候（高温多雨・寒冷・乾燥）」「色」「母岩（石灰岩・玄武岩）」「分布する地域」を手がかりにする。

解法

1. 説明から気候や母岩、分布地域の手がかりを抜き出す。
2. 手がかりに合うのはマングローブ。

選択肢の分析

ア	タイガは、冷帯（亜寒帯）に広がる、モミ・トウヒ・カラマツなどの針葉樹の純林である。 誤概念：気候・母岩と植生の対応の混同
イ	サバナは、雨季と乾季のある熱帯で、長い草の草原に低木がまばらに生える植生である。 誤概念：気候・母岩と植生の対応の混同
ウ	硬葉樹は、夏の乾燥に耐えるため、小さく硬い葉をもつオリーブやコルクがしなどの樹木である。 誤概念：気候・母岩と植生の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 気候帯ごとに、植生と土壌を1つずつ対応させた表を書いて確かめる。

部分点のポイント

- 気候・母岩との対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- テラロッサとテラローシャを取り違える。
- 熱帯雨林の土壌を肥沃だと考える。

A-17 正答 484 mm

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ケッペンの気候区分では、乾燥限界 r（mm）を、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t＋7)、夏に多雨で冬に乾燥するなら r＝20(t＋14)、冬に多雨で夏に乾燥するなら r＝20t で求める。年平均気…

思考の糸口 まず降水の季節配分から式を選び、年平均気温を代入する。

解法

1. 降水の型：1年を通して平均して雨が降る → r＝20(t＋7)。
2. 代入して 484 mm。

別解・別の確かめ方

- 3つの式で計算した値を並べ、w 型が最大、s 型が最小になっていることを確かめる。

部分点のポイント

- 式を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 夏多雨と冬多雨の式を取り違える。
- 括弧の中の加算を忘れて 20t＋7 とする。

A-18　正答　464 mm　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ケッペンの気候区分では、乾燥限界 r（mm）を、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t＋7)、夏に多雨で冬に乾燥するなら r＝20(t＋14)、冬に多雨で夏に乾燥するなら r＝20t で求める。年平均気…

思考の糸口　まず降水の季節配分から式を選び、年平均気温を代入する。

解法

1. 降水の型：1年を通して平均して雨が降る → r＝20(t＋7)。
2. 代入して 464 mm。

別解・別の確かめ方

- 3つの式で計算した値を並べ、w 型が最大、s 型が最小になっていることを確かめる。

部分点のポイント

- 式を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 夏多雨と冬多雨の式を取り違える。
- 括弧の中の加算を忘れて 20t＋7 とする。

A-19　正答　47.5 ℃　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

表は、北緯 47° 付近にある地点Hの月平均気温である（架空の資料）。この地点の気温の年較差（最暖月平均気温と最寒月平均気温の差）は何℃ か。

思考の糸口　表から最大値と最小値を探し、差を求める。最寒月が負の数のときの引き算に注意する。

解法

1. 最暖月：21.6℃。
2. 最寒月：−25.9℃。
3. 年較差：21.6−(−25.9)＝47.5℃。

別解・別の確かめ方

- 数直線に最暖月と最寒月の気温をとり、間の長さとして確かめる。

部分点のポイント

- 最大値と最小値を読み取っている（1点）
- 正しい差（1点）

よくあるミス

- 負の数を引くときに符号を誤る。

A-20　正答　7.3 ℃　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標高 300 m の地点Aの年平均気温は 21.6℃ である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がるものとすると、地点Aの近くにある標高 2,500 m の地点Bの年平均気温は何℃ と推定されるか。

思考の糸口　標高差を求め、100 m あたりの低下量 0.65℃ をかけて、地点Aの気温から引く。

解法

1. 標高差：2,500－300＝2,200 m。
2. 低下量：0.65×22＝14.3℃。
3. 21.6－14.3＝7.3℃。

別解・別の確かめ方

- 地点Bの気温 7.3℃ に、標高差分の 14.3℃ を足すと地点Aの 21.6℃ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 標高差と低下量を求めている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 地点Bの標高そのものに 0.65 をかけてしまう。
- 低下量を足してしまう。

B　標準演習

B-01　正答　エ　亜寒帯湿潤気候（Df）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

地理探究の授業で、ある地点の雨温図を作成した。図の地点Pのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　①最暖月で寒帯か ②乾燥限界で乾燥帯か ③最寒月で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に判定する。南半球かどうかを最初に確かめる。

解法

1. 最暖月 17℃、最寒月 −13.8℃、年降水量 781 mm、年平均気温 1.6℃。
2. 降水の型は f、乾燥限界は 172 mm。
3. 最寒月平均気温が −13.8℃ で −3℃ 未満、最暖月は 17℃ で 10℃ 以上、年中湿潤である。
4. 答え：亜寒帯湿潤気候（Df）。

選択肢の分析

ア	この地点は、最寒月平均気温が −13.8℃ で −3℃ 未満、最暖月は 17℃ で 10℃ 以上、年中湿潤である。Cfbの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で年中湿潤であり、最暖月平均気温が 22℃ 未満である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
イ	この地点は、最寒月平均気温が −13.8℃ で −3℃ 未満、最暖月は 17℃ で 10℃ 以上、年中湿潤である。ETの条件「最暖月平均気温が 0℃ 以上 10℃ 未満である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
ウ	この地点は、最寒月平均気温が −13.8℃ で −3℃ 未満、最暖月は 17℃ で 10℃ 以上、年中湿潤である。Dwの条件「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、冬に乾燥する。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- ハイサーグラフに描き直し、グラフの形（縦長・横長・右上がりなど）から典型的な気候と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 気温・降水量を正しく読み取っている（2点）
- 判定基準を正しく当てはめている（2点）

よくあるミス

- 南半球の地点で夏と冬を逆に読む。
- 乾燥帯の判定を忘れて、気温だけで判断する。

B-02　正答　エ　砂漠気候（BW）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

地理探究の授業で、ある地点の雨温図を作成した。図の地点Sのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　①最暖月で寒帯か ②乾燥限界で乾燥帯か ③最寒月で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に判定する。南半球かどうかを最初に確かめる。

解法

1. 最暖月 26.8℃、最寒月 11.8℃、年降水量 129 mm、年平均気温 19.3℃。
2. 降水の型は w、乾燥限界は 666 mm。
3. 年降水量 129 mm が、乾燥限界 666 mm の半分にも満たない。
4. 答え：砂漠気候（BW）。

選択肢の分析

ア	この地点は、年降水量 129 mm が、乾燥限界 666 mm の半分にも満たない。（南半球の地点なので、夏の半年は 10〜3月である）Awの条件「最寒月平均気温が 18℃ 以上で、明瞭な乾季がある。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
イ	この地点は、年降水量 129 mm が、乾燥限界 666 mm の半分にも満たない。（南半球の地点なので、夏の半年は 10〜3月である）Cwの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、冬に乾燥し夏に雨が多い。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
ウ	この地点は、年降水量 129 mm が、乾燥限界 666 mm の半分にも満たない。（南半球の地点なので、夏の半年は 10〜3月である）BSの条件「年降水量が乾燥限界の半分以上で、乾燥限界未満である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- ハイサーグラフに描き直し、グラフの形（縦長・横長・右上がりなど）から典型的な気候と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 気温・降水量を正しく読み取っている（2点）
- 判定基準を正しく当てはめている（2点）

よくあるミス

- 南半球の地点で夏と冬を逆に読む。
- 乾燥帯の判定を忘れて、気温だけで判断する。

B-03　正答　イ　熱帯雨林気候（Af）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、ある都市の月平均気温と月降水量を示した雨温図である。図の地点Qのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　①最暖月で寒帯か ②乾燥限界で乾燥帯か ③最寒月で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に判定する。南半球かどうかを最初に確かめる。

解法

1. 最暖月 28.2℃、最寒月 25.9℃、年降水量 2369 mm、年平均気温 27.1℃。
2. 降水の型は f、乾燥限界は 682 mm。
3. 最寒月平均気温が 25.9℃ で 18℃ 以上、最少雨月も 60 mm 以上あり年中多雨である。
4. 答え：熱帯雨林気候（Af）。

選択肢の分析

ア	この地点は、最寒月平均気温が 25.9℃ で 18℃ 以上、最少雨月も 60 mm 以上あり年中多雨である。Dwの条件「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、冬に乾燥する。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
ウ	この地点は、最寒月平均気温が 25.9℃ で 18℃ 以上、最少雨月も 60 mm 以上あり年中多雨である。Awの条件「最寒月平均気温が 18℃ 以上で、明瞭な乾季がある。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
エ	この地点は、最寒月平均気温が 25.9℃ で 18℃ 以上、最少雨月も 60 mm 以上あり年中多雨である。Cfaの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で年中湿潤であり、最暖月平均気温が 22℃ 以上である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- ハイサーグラフに描き直し、グラフの形（縦長・横長・右上がりなど）から典型的な気候と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 気温・降水量を正しく読み取っている（2点）
- 判定基準を正しく当てはめている（2点）

よくあるミス

- 南半球の地点で夏と冬を逆に読む。
- 乾燥帯の判定を忘れて、気温だけで判断する。

B-04　正答　ア　温暖冬季少雨気候（Cw）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

地理探究の授業で、ある地点の雨温図を作成した。図の地点Sのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　①最暖月で寒帯か ②乾燥限界で乾燥帯か ③最寒月で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に判定する。南半球かどうかを最初に確かめる。

解法

1. 最暖月 25℃、最寒月 15.5℃、年降水量 1755 mm、年平均気温 20.2℃。
2. 降水の型は w、乾燥限界は 684 mm。
3. 最寒月平均気温が 15.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、冬に乾燥し夏に雨が集中する。
4. 答え：温暖冬季少雨気候（Cw）。

選択肢の分析

イ	この地点は、最寒月平均気温が 15.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、冬に乾燥し夏に雨が集中する。Cfaの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で年中湿潤であり、最暖月平均気温が 22℃ 以上である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
ウ	この地点は、最寒月平均気温が 15.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、冬に乾燥し夏に雨が集中する。Csの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、夏に乾燥し冬に雨が多い。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
エ	この地点は、最寒月平均気温が 15.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、冬に乾燥し夏に雨が集中する。Awの条件「最寒月平均気温が 18℃ 以上で、明瞭な乾季がある。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- ハイサーグラフに描き直し、グラフの形（縦長・横長・右上がりなど）から典型的な気候と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 気温・降水量を正しく読み取っている（2点）
- 判定基準を正しく当てはめている（2点）

よくあるミス

- 南半球の地点で夏と冬を逆に読む。
- 乾燥帯の判定を忘れて、気温だけで判断する。

B-05　正答　エ　西岸海洋性気候（Cfb）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

図は、ある地点のハイサーグラフである。グラフは気温の変化も降水量の変化も小さく、中央付近にまとまっている。図の地点Qのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　ハイサーグラフは縦の位置が気温、横の位置が降水量。最も上の点（最暖月）・最も下の点（最寒月）の高さと、高温の月が左右どちらにあるかを読む。

解法

1. 最も上の点（最暖月）は 16.5℃、最も下の点（最寒月）は 4.7℃。
2. 高温の月と低温の月が、それぞれ降水量の多い側・少ない側のどちらにあるかを読む。
3. 最寒月平均気温が 4.7℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 16.5℃ と 22℃ 未満である。

選択肢の分析

ア	この地点は、最寒月平均気温が 4.7℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 16.5℃ と 22℃ 未満である。Dfの条件「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、年中湿潤である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
イ	この地点は、最寒月平均気温が 4.7℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 16.5℃ と 22℃ 未満である。Csの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、夏に乾燥し冬に雨が多い。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
ウ	この地点は、最寒月平均気温が 4.7℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 16.5℃ と 22℃ 未満である。Cfaの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で年中湿潤であり、最暖月平均気温が 22℃ 以上である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 点の値を表に書き出して雨温図の形に直し、判定の流れ図に当てはめる。

部分点のポイント

- グラフの縦軸・横軸を正しく読んでいる（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 縦軸と横軸を取り違え、降水量を気温として読む。
- グラフの傾きの向き（夏に多雨か冬に多雨か）を逆に読む。

B-06　正答　イ　亜寒帯冬季少雨気候（Dw）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

図は、ある地点のハイサーグラフである。グラフは縦に長くのび、気温の低い月は左端（降水量がきわめて少ない側）に集まっている。図の地点Xのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　ハイサーグラフは縦の位置が気温、横の位置が降水量。最も上の点（最暖月）・最も下の点（最寒月）の高さと、高温の月が左右どちらにあるかを読む。

解法

1. 最も上の点（最暖月）は 20.1℃、最も下の点（最寒月）は −19.2℃。
2. 高温の月と低温の月が、それぞれ降水量の多い側・少ない側のどちらにあるかを読む。
3. 最寒月平均気温が −19.2℃ で −3℃ 未満、最暖月は 20.1℃ で 10℃ 以上、冬に極端に乾燥する。

選択肢の分析

ア	この地点は、最寒月平均気温が −19.2℃ で −3℃ 未満、最暖月は 20.1℃ で 10℃ 以上、冬に極端に乾燥する。Dfの条件「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、年中湿潤である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
ウ	この地点は、最寒月平均気温が −19.2℃ で −3℃ 未満、最暖月は 20.1℃ で 10℃ 以上、冬に極端に乾燥する。Cwの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、冬に乾燥し夏に雨が多い。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
エ	この地点は、最寒月平均気温が −19.2℃ で −3℃ 未満、最暖月は 20.1℃ で 10℃ 以上、冬に極端に乾燥する。ETの条件「最暖月平均気温が 0℃ 以上 10℃ 未満である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 点の値を表に書き出して雨温図の形に直し、判定の流れ図に当てはめる。

部分点のポイント

- グラフの縦軸・横軸を正しく読んでいる（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 縦軸と横軸を取り違え、降水量を気温として読む。
- グラフの傾きの向き（夏に多雨か冬に多雨か）を逆に読む。

B-07　正答　ア　温暖湿潤気候（Cfa）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

図は、ある地点のハイサーグラフである。グラフは気温の高い月ほど右側にあるが、低温の月も降水量が 0 に近づかない。図の地点Qのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　ハイサーグラフは縦の位置が気温、横の位置が降水量。最も上の点（最暖月）・最も下の点（最寒月）の高さと、高温の月が左右どちらにあるかを読む。

解法

1. 最も上の点（最暖月）は 27.3℃、最も下の点（最寒月）は 6.5℃。
2. 高温の月と低温の月が、それぞれ降水量の多い側・少ない側のどちらにあるかを読む。
3. 最寒月平均気温が 6.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 27.3℃ と 22℃ 以上である。

選択肢の分析

イ	この地点は、最寒月平均気温が 6.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 27.3℃ と 22℃ 以上である。Dfの条件「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、年中湿潤である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
ウ	この地点は、最寒月平均気温が 6.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 27.3℃ と 22℃ 以上である。Cwの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、冬に乾燥し夏に雨が多い。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
エ	この地点は、最寒月平均気温が 6.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 27.3℃ と 22℃ 以上である。Cfbの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で年中湿潤であり、最暖月平均気温が 22℃ 未満である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 点の値を表に書き出して雨温図の形に直し、判定の流れ図に当てはめる。

部分点のポイント

- グラフの縦軸・横軸を正しく読んでいる（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 縦軸と横軸を取り違え、降水量を気温として読む。
- グラフの傾きの向き（夏に多雨か冬に多雨か）を逆に読む。

B-08　正答　イ　狭まる境界（沈み込み）　4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U01

アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝は、プレートとの関係で見るとどのような場所にあたるか。最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　プレートが「離れる」「近づく（沈み込む・衝突する）」「すれ違う」のどれかを、できる地形（海嶺・海溝・褶曲山脈・断層）から判断する。

解法

1. アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝がどのような地形かを確かめる。
2. その地形ができるプレートの動きを考える。
3. 答え：狭まる境界（沈み込み）。

選択肢の分析

ア	ホットスポット（プレートの内部）は、プレート内部でマグマが供給され続ける場所で、火山島の列ができる場所である。アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝は、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む境界にできた山脈と海溝である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
ウ	狭まる境界（衝突）は、大陸どうしが衝突する境界で、高く険しい褶曲山脈ができる場所である。アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝は、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む境界にできた山脈と海溝である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
エ	ずれる境界は、プレートがすれ違う境界で、トランスフォーム断層ができる場所である。アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝は、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む境界にできた山脈と海溝である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 地学基礎で学んだプレートの境界の模式図に、地名を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 地形とプレートの動きを結びつけている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- ハワイ諸島をプレートの境界にあると考える。
- ヒマラヤ山脈を沈み込み帯の火山と考える。

B-09　正答　イ　狭まる境界（沈み込み）　4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U01

日本海溝と東北日本の弧状列島は、プレートとの関係で見るとどのような場所にあたるか。最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　プレートが「離れる」「近づく（沈み込む・衝突する）」「すれ違う」のどれかを、できる地形（海嶺・海溝・褶曲山脈・断層）から判断する。

解法

1. 日本海溝と東北日本の弧状列島がどのような地形かを確かめる。
2. その地形ができるプレートの動きを考える。
3. 答え：狭まる境界（沈み込み）。

選択肢の分析

ア	広がる境界は、プレートが両側に離れていく境界で、海嶺や地溝ができる場所である。日本海溝と東北日本の弧状列島は、海洋プレートが大陸側のプレートの下に沈み込む境界である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
ウ	ホットスポット（プレートの内部）は、プレート内部でマグマが供給され続ける場所で、火山島の列ができる場所である。日本海溝と東北日本の弧状列島は、海洋プレートが大陸側のプレートの下に沈み込む境界である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
エ	ずれる境界は、プレートがすれ違う境界で、トランスフォーム断層ができる場所である。日本海溝と東北日本の弧状列島は、海洋プレートが大陸側のプレートの下に沈み込む境界である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 地学基礎で学んだプレートの境界の模式図に、地名を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 地形とプレートの動きを結びつけている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- ハワイ諸島をプレートの境界にあると考える。
- ヒマラヤ山脈を沈み込み帯の火山と考える。

B-10　正答　エ　アフリカ大地溝帯　4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U01

次のうち、広がる境界にあたる地形・場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　広がる境界では「プレートが両側に離れていく境界で、海嶺や地溝ができる」。この特徴をもつ地形を選ぶ。

解法

1. 広がる境界でできる地形を確かめる。
2. 各選択肢の地形がどの境界にあるかを判断する。
3. 当てはまるのはアフリカ大地溝帯。

選択肢の分析

ア	ヒマラヤ山脈は狭まる境界（衝突）にあたる。インド・オーストラリアプレートがユーラシアプレートに衝突してできた褶曲山脈である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
イ	アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝は狭まる境界（沈み込み）にあたる。海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む境界にできた山脈と海溝である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
ウ	ハワイ諸島はホットスポット（プレートの内部）にあたる。プレートの境界ではなく、プレート内部のホットスポットでつくられた火山島の列である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢をすべて境界の型に分類し、残ったものを確かめる。

部分点のポイント

- 境界の型ごとの地形を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 海嶺と海溝を取り違える。

B-11　正答　エ　サンアンドレアス断層　4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U01

次のうち、ずれる境界にあたる地形・場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　ずれる境界では「プレートがすれ違う境界で、トランスフォーム断層ができる」。この特徴をもつ地形を選ぶ。

解法

1. ずれる境界でできる地形を確かめる。
2. 各選択肢の地形がどの境界にあるかを判断する。
3. 当てはまるのはサンアンドレアス断層。

選択肢の分析

ア	ハワイ諸島はホットスポット（プレートの内部）にあたる。プレートの境界ではなく、プレート内部のホットスポットでつくられた火山島の列である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
イ	アフリカ大地溝帯は広がる境界にあたる。大陸が引き裂かれるようにプレートが離れていく境界にできた地溝である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
ウ	ヒマラヤ山脈は狭まる境界（衝突）にあたる。インド・オーストラリアプレートがユーラシアプレートに衝突してできた褶曲山脈である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢をすべて境界の型に分類し、残ったものを確かめる。

部分点のポイント

- 境界の型ごとの地形を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 海嶺と海溝を取り違える。

B-12 正答 ア　エスチュアリー（三角江）　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の文は、ある地形の特徴と土地利用・災害との関係を述べたものである。当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。「この地形は河口部が沈水してラッパ状に広がったもので、土砂の供給が少なく潮の干満の大きい河口に見られ、…

思考の糸口 文の前半の「でき方」から地形を特定し、後半の土地利用・災害の説明と矛盾しないか確かめる。

解法

1. でき方を読み取る。
2. 当てはまる地形はエスチュアリー（三角江）。
3. 土地利用・災害の説明と照合する。

選択肢の分析

イ	三角州は、河口付近で細かい土砂が堆積してできた地形である。 誤概念：地形のでき方と土地利用の対応の混同
ウ	フィヨルドは、氷河が削ったU字谷が沈水してできた地形である。 誤概念：地形のでき方と土地利用の対応の混同
エ	リアス海岸は、山地の谷が沈水してできた地形である。 誤概念：地形のでき方と土地利用の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 土地利用（港・養殖・果樹園・水田）から逆に地形を推定して確かめる。

部分点のポイント

- でき方から地形を特定している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 土地利用だけで判断し、でき方を確かめない。

B-13 正答 ア　河川が山地から平地に出る所で、粗い砂礫が扇形に堆積してできた。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

扇状地のでき方を説明した文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 侵食・堆積・沈水・離水のどれでできた地形かを最初に判断し、はたらき（河川・氷河・波）を確かめる。

解法

1. 扇状地は堆積によってできた地形である。
2. でき方：河川が山地から平地に出る所で、粗い砂礫が扇形に堆積してできた。

選択肢の分析

イ	これは三角州のでき方である。 誤概念：扇状地と三角州の混同
ウ	これはモレーンなどの氷河地形のでき方である。 誤概念：地形のでき方の混同
エ	これは自然堤防のでき方である。 誤概念：扇状地と自然堤防の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢がどの地形のでき方を説明しているかを特定し、消去する。

部分点のポイント

- でき方を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 沈水と離水を取り違える。
- リアス海岸とフィヨルドを取り違える。

B-14　正答　イ　氷河が削ったU字谷が沈水してできた。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

フィヨルドのでき方を説明した文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　侵食・堆積・沈水・離水のどれでできた地形かを最初に判断し、はたらき（河川・氷河・波）を確かめる。

解法

1. フィヨルドは沈水によってできた地形である。
2. でき方：氷河が削ったU字谷が沈水してできた。

選択肢の分析

ア	これは砂嘴や砂州のでき方である。 誤概念：侵食地形と堆積地形の混同
ウ	サンゴ礁は熱帯・亜熱帯の浅い海でできる地形である。 誤概念：地形のでき方の混同
エ	これはリアス海岸のでき方である。 誤概念：沈水海岸の種類の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢がどの地形のでき方を説明しているかを特定し、消去する。

部分点のポイント

- でき方を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 沈水と離水を取り違える。
- リアス海岸とフィヨルドを取り違える。

B-15　正答　ウ　太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯が移動してきて雨季に、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季になるから。　4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U02

次の事実の要因を説明した文として最も適当なものを選びなさい。「サバナ気候の地域では、雨季と乾季がはっきりしている。」

思考の糸口　上昇気流（低圧帯・風上・暖流）は雨をもたらし、下降気流（高圧帯）・風下・寒流は乾燥をもたらす、という原則に当てはめる。

解法

1. 事実が「雨が多い」「雨が少ない」「気温が高い」のどれに関するものかを確認する。
2. 気圧帯・恒常風・海流・地形のうち、関係するしくみを選ぶ。
3. 説明：太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯が移動してきて雨季に、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季になるから。

選択肢の分析

ア	1年中亜熱帯高圧帯の下にあれば砂漠となる。 誤概念：気圧帯の季節移動の見落とし
イ	1年中赤道低圧帯の下にあれば年中多雨となり、熱帯雨林気候になる。 誤概念：気圧帯の季節移動の見落とし
エ	これは地中海性気候の説明である。 誤概念：気候区の混同

別解・別の確かめ方

- 気圧帯の模式図に地域の緯度を書きこみ、夏と冬それぞれでどの気圧帯の影響を受けるかを確かめる。

部分点のポイント

- 気候のしくみを正しく当てはめている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 寒流と暖流の影響を逆にする。
- 気圧帯の季節移動の向きを逆にする。

B-16　正答　イ　1年を通して亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくいから。　4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U02

大気の大循環と気候の関係について、次の事実の要因を説明した文として最も適当なものを選びなさい。「サハラ砂漠など、緯度 20〜30° 付近に大規模な砂漠が分布する。」

思考の糸口　上昇気流（低圧帯・風上・暖流）は雨をもたらし、下降気流（高圧帯）・風下・寒流は乾燥をもたらす、という原則に当てはめる。

解法

1. 事実が「雨が多い」「雨が少ない」「気温が高い」のどれに関するものかを確認する。
2. 気圧帯・恒常風・海流・地形のうち、関係するしくみを選ぶ。
3. 説明：1年を通して亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくいから。

選択肢の分析

ア	寒流は大気を安定させ雨を降りにくくするが、海から湿った風が吹き込むことは雨の要因になる。 誤概念：海流の影響の誤解
ウ	偏西風帯は緯度 40〜60° 付近で、湿った空気を運ぶのは雨の要因になる。 誤概念：恒常風の分布の誤解
エ	上昇気流のもとでは雲ができて雨が多くなる。赤道低圧帯は熱帯雨林の分布と対応する。 誤概念：気圧帯と降水の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 気圧帯の模式図に地域の緯度を書きこみ、夏と冬それぞれでどの気圧帯の影響を受けるかを確かめる。

部分点のポイント

- 気候のしくみを正しく当てはめている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 寒流と暖流の影響を逆にする。
- 気圧帯の季節移動の向きを逆にする。

B-17 正答 ウ　夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、冬は気圧帯が南下して偏西風や低気圧の影響を受けるから。 4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U02

大気の大循環と気候の関係について、次の事実の要因を説明した文として最も適当なものを選びなさい。「地中海沿岸では、夏に乾燥し冬に雨が多い。」

思考の糸口 上昇気流（低圧帯・風上・暖流）は雨をもたらし、下降気流（高圧帯）・風下・寒流は乾燥をもたらす、という原則に当てはめる。

解法

1. 事実が「雨が多い」「雨が少ない」「気温が高い」のどれに関するものかを確認する。
2. 気圧帯・恒常風・海流・地形のうち、関係するしくみを選ぶ。
3. 説明：夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、冬は気圧帯が南下して偏西風や低気圧の影響を受けるから。

選択肢の分析

ア	これは西岸海洋性気候の説明である。 誤概念：気候区の混同
イ	これは夏に多雨・冬に乾燥となる季節風の地域の説明で、地中海沿岸とは季節が逆である。 誤概念：季節風と気圧帯の混同
エ	これはサバナ気候の季節変化の説明で、しかも夏に雨が多くなるはずである。 誤概念：気圧帯の季節移動の誤解

別解・別の確かめ方

- 気圧帯の模式図に地域の緯度を書きこみ、夏と冬それぞれでどの気圧帯の影響を受けるかを確かめる。

部分点のポイント

- 気候のしくみを正しく当てはめている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 寒流と暖流の影響を逆にする。
- 気圧帯の季節移動の向きを逆にする。

B-18 正答 ア　高潮

4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「台風などによる気圧の低下で海面が吸い上げられ、強風で海水が吹き寄せられて海面が異常に高くなる現象」

思考の糸口 発生する場所（海域・地形）と、被害をもたらすしくみ（風・水・地盤・火山）の2点から判断する。

解法

1. 説明から発生場所としくみを読み取る。
2. 当てはまるのは高潮。

選択肢の分析

イ	火砕流は「高温の火山ガスと火山灰・岩石が一体となって、高速で山の斜面を流れ下る現象」である。 誤概念：自然災害の種類・名称の混同
ウ	液状化は「埋立地や旧河道など、砂が多く地下水位の高い土地で、地震のゆれによって地盤が液体のようになる現象」である。 誤概念：自然災害の種類・名称の混同
エ	サイクロンは「インド洋や南太平洋で発生し、南アジアなどに被害をもたらす熱帯低気圧」である。 誤概念：自然災害の種類・名称の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の語句それぞれについて「どこで・何が起こるか」を一言で書き、説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- しくみを理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 熱帯低気圧の呼び名を、発生する海域と結びつけずに覚える。
- 高潮と津波を混同する。

B-19　正答　ア　エルニーニョ現象　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「太平洋の赤道域東部（ペルー沖）で、海面水温が平年より高い状態が続く現象」

思考の糸口　発生する場所（海域・地形）と、被害をもたらすしくみ（風・水・地盤・火山）の2点から判断する。

解法

1. 説明から発生場所としくみを読み取る。
2. 当てはまるのはエルニーニョ現象。

選択肢の分析

イ	ハリケーンは「北大西洋や北東太平洋で発生し、北アメリカやカリブ海の島々に被害をもたらす熱帯低気圧」である。 誤概念：自然災害の種類・名称の混同
ウ	台風は「北西太平洋で発生し、東アジアや東南アジアに暴風や豪雨をもたらす熱帯低気圧」である。 誤概念：自然災害の種類・名称の混同
エ	土石流は「大雨によって谷や斜面の土砂・石が水と一体となって一気に流れ下る現象」である。 誤概念：自然災害の種類・名称の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の語句それぞれについて「どこで・何が起こるか」を一言で書き、説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- しくみを理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 熱帯低気圧の呼び名を、発生する海域と結びつけずに覚える。
- 高潮と津波を混同する。

B-20　正答　ア　海抜ゼロメートル地帯の三角州　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次のうち、「台風のときの高潮」の危険性が特に高い場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地形のでき方 → 高さ・堆積物・水はけ → 起こりやすい災害、の順に考える。

解法

1. 各選択肢の地形の特徴（高さ・堆積物・形）を確認する。
2. 台風のときの高潮の原因となる条件をもつのは海抜ゼロメートル地帯の三角州。

選択肢の分析

イ	谷の出口にある扇状地の扇頂付近は、谷から流れ出る土砂の通り道にあたるため、大雨のときの土石流に特に注意が必要な場所である。 誤概念：地形と災害の危険性の対応の混同
ウ	自然堤防の背後に広がる後背湿地は、周囲より低く、水はけが悪いため、大雨のときの浸水に特に注意が必要な場所である。 誤概念：地形と災害の危険性の対応の混同
エ	旧河道を埋め立てた住宅地は、砂が多く地下水位が高いため、地震のときの液状化に特に注意が必要な場所である。 誤概念：地形と災害の危険性の対応の混同

別解・別の確かめ方

- ハザードマップの浸水想定区域・土砂災害警戒区域・液状化の危険度の図と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 地形と災害の対応を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 地形の名前だけで判断し、高さや堆積物を考えない。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1)** 北半球。**7**月ごろに気温が最も高いから。　**(2) 1167÷1377×100 ≒ 85 %**　**(3)** サバナ気候（**Aw**）。太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯（熱帯収束帯）が移動してきて上昇気流による雨季となり、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季となる。　**(4)** 長い草の草原に低木がまばらに生えるサバナが広がり、乾季には草が枯れる。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02　関連 HS-GEOG-U02

図は、ある地点の雨温図である。 (1) 図の地点Qは北半球と南半球のどちらにあるか、根拠とともに答えなさい。 (2) 夏の半年（北半球では4〜9月、南半球では10〜3月）の降水量が年降水量に占める割合を、整数の % で答…

思考の糸口　まず最暖月の位置で半球を決め、夏の半年を確定させてから降水の季節配分を読む。成因は「どの季節にどの気圧帯の下にあるか」で説明する。

解法

1. 最暖月は 7 月 → 北半球。
2. 夏の半年の降水量は 1167 mm、年降水量は 1377 mm → 85 %。
3. 最寒月平均気温が 25.8℃ で 18℃ 以上だが、降水量がきわめて少ない乾季がある。
4. 成因：太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯（熱帯収束帯）が移動してきて上昇気流による雨季となり、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季となる。

別解・別の確かめ方

- 気圧帯の模式図を夏用・冬用の2枚描き、地点の緯度に印をつけて、どちらの季節に雨が降るかを図から読み取る。

部分点のポイント

- (1)（1点）
- (2)（2点）
- (3) 判定（1点）
- (3) 成因（3点）
- (4)（1点）

よくあるミス

- 南半球の地点で、1〜3月を冬として降水の型を逆に判定する。
- 気圧帯の移動の向きを逆に説明する（夏に低緯度側へ移動する、など）。

C-02　正答　(1) 北半球。7月ごろに気温が最も高いから。　(2) 1102÷1263×100 ≒ 87 %　(3) サバナ気候（Aw）。太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯（熱帯収束帯）が移動してきて上昇気流による雨季となり、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季となる。　(4) 長い草の草原に低木がまばらに生えるサバナが広がり、乾季には草が枯れる。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02　関連 HS-GEOG-U02

図は、ある都市の月平均気温と月降水量を示したものである。 (1) 図の地点Sは北半球と南半球のどちらにあるか、根拠とともに答えなさい。 (2) 夏の半年（北半球では4〜9月、南半球では10〜3月）の降水量が年降水量に占め…

思考の糸口　まず最暖月の位置で半球を決め、夏の半年を確定させてから降水の季節配分を読む。成因は「どの季節にどの気圧帯の下にあるか」で説明する。

解法

1. 最暖月は 7 月 → 北半球。
2. 夏の半年の降水量は 1102 mm、年降水量は 1263 mm → 87 %。
3. 最寒月平均気温が 22.6℃ で 18℃ 以上だが、降水量がきわめて少ない乾季がある。
4. 成因：太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯（熱帯収束帯）が移動してきて上昇気流による雨季となり、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季となる。

別解・別の確かめ方

- 気圧帯の模式図を夏用・冬用の2枚描き、地点の緯度に印をつけて、どちらの季節に雨が降るかを図から読み取る。

部分点のポイント

- (1)（1点）
- (2)（2点）
- (3) 判定（1点）
- (3) 成因（3点）
- (4)（1点）

よくあるミス

- 南半球の地点で、1〜3月を冬として降水の型を逆に判定する。
- 気圧帯の移動の向きを逆に説明する（夏に低緯度側へ移動する、など）。

C-03　正答　(1) 北半球。7月ごろに気温が最も高いから。　(2) 86÷478×100 ≒ 18 %　(3) 地中海性気候（Cs）。夏は亜熱帯高圧帯におおわれて下降気流のため雨が少なく、冬は気圧帯が低緯度側へ移動して偏西風や低気圧（前線）の影響を受けて雨が降る。　(4) 夏の乾燥に耐える硬葉樹（オリーブ・コルクがしなど）が育ち、オリーブ・ぶどうなどの樹木作物と冬の小麦を組み合わせた地中海式農業が行われる。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02　関連 HS-GEOG-U02

図は、ある都市の月平均気温と月降水量を示したものである。 (1) 図の地点Pは北半球と南半球のどちらにあるか、根拠とともに答えなさい。 (2) 夏の半年（北半球では4〜9月、南半球では10〜3月）の降水量が年降水量に占め…

思考の糸口　まず最暖月の位置で半球を決め、夏の半年を確定させてから降水の季節配分を読む。成因は「どの季節にどの気圧帯の下にあるか」で説明する。

解法

1. 最暖月は 7 月 → 北半球。
2. 夏の半年の降水量は 86 mm、年降水量は 478 mm → 18 %。
3. 最寒月平均気温が 11.2℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、夏に乾燥し冬に雨が多い。
4. 成因：夏は亜熱帯高圧帯におおわれて下降気流のため雨が少なく、冬は気圧帯が低緯度側へ移動して偏西風や低気圧（前線）の影響を受けて雨が降る。

別解・別の確かめ方

- 気圧帯の模式図を夏用・冬用の2枚描き、地点の緯度に印をつけて、どちらの季節に雨が降るかを図から読み取る。

部分点のポイント

- (1)（1点）
- (2)（2点）
- (3) 判定（1点）
- (3) 成因（3点）
- (4)（1点）

よくあるミス

- 南半球の地点で、1〜3月を冬として降水の型を逆に判定する。
- 気圧帯の移動の向きを逆に説明する（夏に低緯度側へ移動する、など）。

C-04

正答 **(1)** 最暖月 **14.1**℃、最寒月 **11.7**℃（どちらも地点**L**より **14.3**℃ 低い）　**(2)** 最寒月 **11.7**℃ は **−3**℃ 以上 **18**℃ 未満で温帯、年中湿潤（最少雨月 **138 mm**）で最暖月 **14.1**℃ は **22**℃ 未満なので **Cfb**（西岸海洋性気候にあたる。高山気候 **H** として扱うこともある）。　**(3)** 年較差は地点**L**と同じ **2.4**℃ で変わらない。標高による気温の低下はどの月も同じだけ起こり、季節による変化の大きさは緯度で決まるから。　**(4)** 低地は**1**年中高温多湿だが、高原は気温が下がって**1**年中おだやかな「常春」の気候となり、暮らしやすいから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-EARB-U02

赤道付近にある標高 100 m の低地の地点Lと、その近くの標高 2,300 m の高原の都市Hについて考える。表は地点Lの月平均気温である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がり、降水量は2地点で同じと…

思考の糸口　標高差 → 気温の低下量（0.65℃/100 m） → 各月の気温を同じだけ下げる → 判定基準に当てはめる。

解法

1. 標高差 2,200 m、低下量 14.3℃。
2. 都市H：最暖月 28.4−14.3＝14.1℃、最寒月 26−14.3＝11.7℃。
3. 最寒月が −3℃ 以上 18℃ 未満 → 温帯。年中湿潤で最暖月 22℃ 未満 → Cfb。
4. 全月が同じだけ下がるので年較差は不変。

別解・別の確かめ方

- 都市Hの雨温図を描くと、地点Lの気温の折れ線を下に平行移動した形になることから、年較差が変わらないことを確かめる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3)（2点）
- (4)（2点）

よくあるミス

- 都市Hの標高そのものに 0.65 をかけてしまう。
- 標高が上がると年較差も大きくなると考える。

C-05　正答　(1) 最暖月 13.9℃、最寒月 12.6℃（どちらも地点Lより 13℃ 低い）　(2) 最寒月 12.6℃ は −3℃ 以上 18℃ 未満で温帯、年中湿潤（最少雨月 135 mm）で最暖月 13.9℃ は 22℃ 未満なので Cfb（西岸海洋性気候にあたる。高山気候 H として扱うこともある）。　(3) 年較差は地点Lと同じ 1.3℃ で変わらない。標高による気温の低下はどの月も同じだけ起こり、季節による変化の大きさは緯度で決まるから。　(4) 低地は1年中高温多湿だが、高原は気温が下がって1年中おだやかな「常春」の気候となり、暮らしやすいから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-EARB-U02

赤道付近にある標高 200 m の低地の地点Lと、その近くの標高 2,200 m の高原の都市Hについて考える。表は地点Lの月平均気温である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がり、降水量は2地点で同じと…

思考の糸口　標高差 → 気温の低下量（0.65℃/100 m） → 各月の気温を同じだけ下げる → 判定基準に当てはめる。

解法

1. 標高差 2,000 m、低下量 13℃。
2. 都市H：最暖月 26.9−13＝13.9℃、最寒月 25.6−13＝12.6℃。
3. 最寒月が −3℃ 以上 18℃ 未満 → 温帯。年中湿潤で最暖月 22℃ 未満 → Cfb。
4. 全月が同じだけ下がるので年較差は不変。

別解・別の確かめ方

- 都市Hの雨温図を描くと、地点Lの気温の折れ線を下に平行移動した形になることから、年較差が変わらないことを確かめる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3)（2点）
- (4)（2点）

よくあるミス

- 都市Hの標高そのものに 0.65 をかけてしまう。
- 標高が上がると年較差も大きくなると考える。

C-06　正答　(1) 最暖月 11.5℃、最寒月 9.8℃（どちらも地点Lより 15.6℃ 低い）　(2) 最寒月 9.8℃ は −3℃ 以上 18℃ 未満で温帯、年中湿潤（最少雨月 158 mm）で最暖月 11.5℃ は 22℃ 未満なので Cfb（西岸海洋性気候にあたる。高山気候 H として扱うこともある）。　(3) 年較差は地点Lと同じ 1.7℃ で変わらない。標高による気温の低下はどの月も同じだけ起こり、季節による変化の大きさは緯度で決まるから。　(4) 低地は1年中高温多湿だが、高原は気温が下がって1年中おだやかな「常春」の気候となり、暮らしやすいから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-EARB-U02

赤道付近にある標高 200 m の低地の地点Lと、その近くの標高 2,600 m の高原の都市Hについて考える。表は地点Lの月平均気温である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がり、降水量は2地点で同じと…

思考の糸口　標高差 → 気温の低下量（0.65℃/100 m）→ 各月の気温を同じだけ下げる → 判定基準に当てはめる。

解法

1. 標高差 2,400 m、低下量 15.6℃。
2. 都市H：最暖月 27.1−15.6＝11.5℃、最寒月 25.4−15.6＝9.8℃。
3. 最寒月が −3℃ 以上 18℃ 未満 → 温帯。年中湿潤で最暖月 22℃ 未満 → Cfb。
4. 全月が同じだけ下がるので年較差は不変。

別解・別の確かめ方

- 都市Hの雨温図を描くと、地点Lの気温の折れ線を下に平行移動した形になることから、年較差が変わらないことを確かめる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3)（2点）
- (4)（2点）

よくあるミス

- 都市Hの標高そのものに 0.65 をかけてしまう。
- 標高が上がると年較差も大きくなると考える。

C-07

正答 **(1) X：r＝20(t＋7)＝646 mm、Y：r＝20(t＋7)＝296 mm　(2) X は年降水量 400 mm が 646 mm 未満で、半分の 323 mm 以上なのでステップ気候（BS）。Y は 296 mm 以上なので乾燥帯ではない。　(3)** 気温が高いほど蒸発する水の量が多く、さらに雨が気温の高い季節に集中すると降った雨がすぐに蒸発してしまう。そのため、高温で夏に雨が多い **X** は同じ年降水量でも水が不足し、乾燥帯になる。

8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

表は、2つの地点X（年平均気温 25.3℃）・Y（年平均気温 7.8℃）の気候を示したものである。どちらも年降水量は 400 mm である。乾燥限界 r（mm）は、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t…

思考の糸口　降水の季節配分で式を選び、年平均気温を代入する。年降水量を r、r/2 と比べる。

解法

1. X：20(t＋7) に t＝25.3 を代入して 646 mm。
2. Y：20(t＋7) に t＝7.8 を代入して 296 mm。
3. X：400＜646 かつ 400≧323 → BS。Y：400≧296 → 乾燥帯ではない。
4. 理由を蒸発量で説明する。

別解・別の確かめ方

- 乾燥限界の代わりに「年降水量 − 乾燥限界」を2地点で求め、正なら湿潤、負なら乾燥と判断してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 蒸発（2点）
- (3) 季節配分（2点）

よくあるミス

- 年降水量が同じなので同じ気候帯だと決めつける。
- 式の括弧を外し忘れて 20t＋7 と計算する。

C-08　正答　**(1) X：r＝20(t＋14)＝800 mm、Y：r＝20t＝144 mm　(2) X は年降水量 700 mm が 800 mm 未満で、半分の 400 mm 以上なのでステップ気候（BS）。Y は 144 mm 以上なので乾燥帯ではない。　(3)** 気温が高いほど蒸発する水の量が多く、さらに雨が気温の高い季節に集中すると降った雨がすぐに蒸発してしまう。そのため、高温で夏に雨が多い **X** は同じ年降水量でも水が不足し、乾燥帯になる。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

表は、2つの地点X（年平均気温 26.0℃）・Y（年平均気温 7.2℃）の気候を示したものである。どちらも年降水量は 700 mm である。乾燥限界 r（mm）は、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t…

思考の糸口　降水の季節配分で式を選び、年平均気温を代入する。年降水量を r、r/2 と比べる。

解法

1. X：20(t＋14) に t＝26.0 を代入して 800 mm。
2. Y：20t に t＝7.2 を代入して 144 mm。
3. X：700＜800 かつ 700≧400 → BS。Y：700≧144 → 乾燥帯ではない。
4. 理由を蒸発量で説明する。

別解・別の確かめ方

- 乾燥限界の代わりに「年降水量 − 乾燥限界」を2地点で求め、正なら湿潤、負なら乾燥と判断してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 蒸発（2点）
- (3) 季節配分（2点）

よくあるミス

- 年降水量が同じなので同じ気候帯だと決めつける。
- 式の括弧を外し忘れて 20t＋7 と計算する。

C-09　正答　(1) 地区ア：津波、地区イ：浸水（内水氾濫・外水氾濫）　(2) 地区アは湾の奥ほど幅がせまくなり、津波が高くなりやすい。地区イは周囲より低く細かい泥が積もった水はけの悪い土地で、水が集まりやすく引きにくい。　(3) 例：高台への避難経路を決め、ゆれを感じたらすぐに避難する。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-GEOG-U03　関連 HS-GEOG-U01

S市では、市内の2つの地区について防災計画を見直している。地区アはリアス海岸の湾の奥の集落、地区イは後背湿地を造成した住宅地である。 (1) 地区ア・地区イのそれぞれで特に警戒すべき災害を1つずつ答えなさい。 (2) (…

思考の糸口　地形名 → でき方 → 堆積物・高さ・形 → 起こりやすい災害 → 備え、の順に因果をつなげる。

解法

1. 地区ア：リアス海岸の湾の奥の集落 → 津波。
2. 地区イ：後背湿地を造成した住宅地 → 浸水（内水氾濫・外水氾濫）。
3. それぞれの理由を地形の性質で説明する。
4. ハザードマップで確認すべき情報と備えを述べる。

別解・別の確かめ方

- 地理院地図の「土地の成り立ち」と重ねるハザードマップを想定し、どの情報を見れば危険性がわかるかから説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2) ア（2点）
- (2) イ（2点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 地形と災害の組み合わせを取り違える（扇状地で液状化など）。
- 備えが抽象的で、ハザードマップのどの情報を使うかが書かれていない。

C-10　正答　(1) 地区ア：高潮、地区イ：津波　(2) 地区アは低平な土地で、台風による海面の吸い上げと吹き寄せで海水が入りやすい。地区イは湾の奥ほど幅がせまくなり、津波が高くなりやすい。　(3) 例：台風の接近前に、浸水しない場所への広域避難を検討する。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-GEOG-U03　関連 HS-GEOG-U01

M町では、市内の2つの地区について防災計画を見直している。地区アは海抜ゼロメートル地帯の三角州の市街地、地区イはリアス海岸の湾の奥の集落である。 (1) 地区ア・地区イのそれぞれで特に警戒すべき災害を1つずつ答えなさい。…

思考の糸口　地形名 → でき方 → 堆積物・高さ・形 → 起こりやすい災害 → 備え、の順に因果をつなげる。

解法

1. 地区ア：海抜ゼロメートル地帯の三角州の市街地 → 高潮。
2. 地区イ：リアス海岸の湾の奥の集落 → 津波。
3. それぞれの理由を地形の性質で説明する。
4. ハザードマップで確認すべき情報と備えを述べる。

別解・別の確かめ方

- 地理院地図の「土地の成り立ち」と重ねるハザードマップを想定し、どの情報を見れば危険性がわかるかから説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2) ア（2点）
- (2) イ（2点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 地形と災害の組み合わせを取り違える（扇状地で液状化など）。
- 備えが抽象的で、ハザードマップのどの情報を使うかが書かれていない。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　**662 mm**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

年平均気温 19.1℃ で、夏に雨が集中し冬に乾燥する地点の乾燥限界を求めなさい（乾燥限界は r＝20(t＋14) で求める）。［ある生徒の解答］ r＝20×19.1＋14＝396 mm 上の解答の誤りを指摘し、正しく…

思考の糸口　式に代入するときは、括弧の中を先に計算する。

解法

1. 19.1＋14＝33.1。
2. 20×33.1＝662 mm。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：括弧をはずさずに 20t＋14 と計算した部分
なぜ誤りやすいか：式の形を「20t に何かを足す」と覚えていて、括弧の意味（t＋14 の全体に 20 をかける）を確かめていない。
正しい解答：r＝20×(19.1＋14)＝20×33.1＝662 mm

別解・別の確かめ方

- 分配法則で 20×19.1＋20×14＝382＋280＝662 と計算しても同じになる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 括弧をはずし忘れる。
- 夏多雨型と冬多雨型の式を取り違える。

D-02 正答 ステップ気候（BS）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

年平均気温 15.7℃、最寒月平均気温 5.3℃、最暖月平均気温 26.1℃、年降水量 325 mm の地点のケッペンの気候区分を判定しなさい（降水の季節配分から、乾燥限界は r＝20(t＋7) で求めるものとする）。…

思考の糸口 判定の流れ図（E → B → A・C・D）を必ず上からたどる。

解法

1. 最暖月 26.1℃≧10℃ → 寒帯ではない。
2. r＝454 mm、年降水量 325 mm → 乾燥帯。
3. r/2＝227 mm と比べて BS。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：乾燥帯かどうかを確かめずに、最寒月の気温だけで判定した部分

なぜ誤りやすいか：気候帯は気温だけで決まると考え、判定の順序（寒帯 → 乾燥帯 → 気温による区分）を守っていない。

正しい解答：乾燥限界 r＝20(t＋7)＝454 mm。年降水量 325 mm は r 未満で、r/2＝227 mm 以上なのでステップ気候（BS）。

別解・別の確かめ方

- 同じ気温で年降水量が多い地点と比べ、樹木が育つだけの水があるかどうかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 乾燥帯の判定を飛ばす。

D-03 正答 ステップ気候（BS）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

年平均気温 15.3℃、最寒月平均気温 2.4℃、最暖月平均気温 28.2℃、年降水量 365 mm の地点のケッペンの気候区分を判定しなさい（降水の季節配分から、乾燥限界は r＝20(t＋14) で求めるものとする）。…

思考の糸口 判定の流れ図（E → B → A・C・D）を必ず上からたどる。

解法

1. 最暖月 28.2℃≧10℃ → 寒帯ではない。
2. r＝586 mm、年降水量 365 mm → 乾燥帯。
3. r/2＝293 mm と比べて BS。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：乾燥帯かどうかを確かめずに、最寒月の気温だけで判定した部分

なぜ誤りやすいか：気候帯は気温だけで決まると考え、判定の順序（寒帯 → 乾燥帯 → 気温による区分）を守っていない。

正しい解答：乾燥限界 r＝20(t＋14)＝586 mm。年降水量 365 mm は r 未満で、r/2＝293 mm 以上なのでステップ気候（BS）。

別解・別の確かめ方

- 同じ気温で年降水量が多い地点と比べ、樹木が育つだけの水があるかどうかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 乾燥帯の判定を飛ばす。

D-04　正答　年較差 45.7℃、冷帯（亜寒帯）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

最暖月平均気温が 20.9℃、最寒月平均気温が −24.8℃ の地点の気温の年較差を求め、ケッペンの気候帯を答えなさい。
［ある生徒の解答］ 年較差は 20.9−24.8＝−3.9℃。最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖…

思考の糸口　数直線に2つの気温をとり、0℃ をまたいでいれば差は両方の絶対値の和になることを確かめる。

解法

1. 20.9−(−24.8)＝20.9＋24.8＝45.7℃。
2. 最寒月 −24.8℃＜−3℃、最暖月 20.9℃≧10℃ → 冷帯。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：最寒月の負の数を正の数として引いた部分
なぜ誤りやすいか：負の数を引くときに符号を落とし、絶対値どうしの差を求めてしまっている（気候帯の判定は正しい）。
正しい解答：年較差は 20.9−(−24.8)＝45.7℃。最寒月 −24.8℃ は −3℃ 未満、最暖月は 10℃ 以上なので冷帯（亜寒帯）。

別解・別の確かめ方

- 数直線上で 0℃ をはさんだ2点の距離として年較差を求め直す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の数の引き算で符号を誤る。

D-05　正答　年較差 31.3℃、冷帯（亜寒帯）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

最暖月平均気温が 18.4℃、最寒月平均気温が −12.9℃ の地点の気温の年較差を求め、ケッペンの気候帯を答えなさい。
［ある生徒の解答］ 年較差は 18.4−12.9＝5.5℃。最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月…

思考の糸口　数直線に2つの気温をとり、0℃ をまたいでいれば差は両方の絶対値の和になることを確かめる。

解法

1. 18.4−(−12.9)＝18.4＋12.9＝31.3℃。
2. 最寒月 −12.9℃＜−3℃、最暖月 18.4℃≧10℃ → 冷帯。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：最寒月の負の数を正の数として引いた部分
なぜ誤りやすいか：負の数を引くときに符号を落とし、絶対値どうしの差を求めてしまっている（気候帯の判定は正しい）。
正しい解答：年較差は 18.4−(−12.9)＝31.3℃。最寒月 −12.9℃ は −3℃ 未満、最暖月は 10℃ 以上なので冷帯（亜寒帯）。

別解・別の確かめ方

- 数直線上で 0℃ をはさんだ2点の距離として年較差を求め直す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の数の引き算で符号を誤る。

D-06 正答 高温多雨のため落ち葉はすぐに分解され、養分は植物に吸収されるか雨で流されてしまう。土壌は鉄やアルミニウムの酸化物が残った赤色のやせたラトソルである。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

熱帯雨林の土壌の特色を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 熱帯雨林は植物が非常に豊かなので、落ち葉が積もって土壌は肥沃である。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのようなしくみで」「どうなるか」に分け、授業で学んだしくみと合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：土壌を肥沃とした部分。
3. 正しくは：高温多雨のため落ち葉はすぐに分解され、養分は植物に吸収されるか雨で流されてしまう。土壌は鉄やアルミニウムの酸化物が残った赤色のやせたラトソルである。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：土壌を肥沃とした部分

なぜ誤りやすいか：「植物が多い＝土が肥えている」と、植生と土壌の関係を直感で結びつけている。

正しい解答：高温多雨のため落ち葉はすぐに分解され、養分は植物に吸収されるか雨で流されてしまう。土壌は鉄やアルミニウムの酸化物が残った赤色のやせたラトソルである。

別解・別の確かめ方

- 地図帳の分布図（プレートの境界・気候区分・土壌）や模式図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「植物が多い＝土が肥えている」と、植生と土壌の関係を直感で結びつけている。

D-07 正答 夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくく雨が少ない。上昇気流は雲をつくり雨をもたらす。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

授業の振り返りで、次の問いに答えた。地中海性気候で夏に雨が少ない理由を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 夏は赤道低圧帯におおわれて、上昇気流で雨が降らないから。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのようなしくみで」「どうなるか」に分け、授業で学んだしくみと合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：赤道低圧帯・上昇気流で雨が降らないとした部分。
3. 正しくは：夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくく雨が少ない。上昇気流は雲をつくり雨をもたらす。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：赤道低圧帯・上昇気流で雨が降らないとした部分

なぜ誤りやすいか：気圧帯の名前と、上昇気流・下降気流と降水の関係を取り違えている。

正しい解答：夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくく雨が少ない。上昇気流は雲をつくり雨をもたらす。

別解・別の確かめ方

- 地図帳の分布図（プレートの境界・気候区分・土壌）や模式図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 気圧帯の名前と、上昇気流・下降気流と降水の関係を取り違えている。

D-08 正答 それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地理探究の小テストで、次の問いが出された。テラローシャについて説明しなさい。［ある生徒の解答］ テラローシャは、地中海沿岸の石灰岩が風化してできた赤色土で、オリーブの栽培に利用される。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直…

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのようなしくみで」「どうなるか」に分け、授業で学んだしくみと合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：地中海沿岸の石灰岩の土壌とした部分。
3. 正しくは：それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：地中海沿岸の石灰岩の土壌とした部分

なぜ誤りやすいか：名前が似ているテラロッサとテラローシャを混同している。

正しい解答：それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。

別解・別の確かめ方

- 地図帳の分布図（プレートの境界・気候区分・土壌）や模式図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 名前が似ているテラロッサとテラローシャを混同している。

D-09 正答 それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

テラローシャについて説明しなさい。［ある生徒の解答］テラローシャは、地中海沿岸の石灰岩が風化してできた赤色土で、オリーブの栽培に利用される。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのようなしくみで」「どうなるか」に分け、授業で学んだしくみと合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：地中海沿岸の石灰岩の土壌とした部分。
3. 正しくは：それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：地中海沿岸の石灰岩の土壌とした部分

なぜ誤りやすいか：名前が似ているテラロッサとテラローシャを混同している。

正しい解答：それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。

別解・別の確かめ方

- 地図帳の分布図（プレートの境界・気候区分・土壌）や模式図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 名前が似ているテラロッサとテラローシャを混同している。

D-10 正答 3つはいずれも熱帯低気圧で、発生する海域によって呼び名が異なる。北西太平洋では台風、北大西洋・北東太平洋ではハリケーン、インド洋・南太平洋ではサイクロンという。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

授業の振り返りで、次の問いに答えた。台風・ハリケーン・サイクロンの違いを説明しなさい。［ある生徒の解答］ 台風・ハリケーン・サイクロンは、それぞれ熱帯低気圧・温帯低気圧・竜巻のことで、しくみが異なる現象である。 上の解…

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのようなしくみで」「どうなるか」に分け、授業で学んだしくみと合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：それぞれ別の現象とした部分。
3. 正しくは：3つはいずれも熱帯低気圧で、発生する海域によって呼び名が異なる。北西太平洋では台風、北大西洋・北東太平洋ではハリケーン、インド洋・南太平洋ではサイクロンという。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：それぞれ別の現象とした部分

なぜ誤りやすいか：呼び名が違うので、別のしくみの現象だと思いこんでいる。

正しい解答：3つはいずれも熱帯低気圧で、発生する海域によって呼び名が異なる。北西太平洋では台風、北大西洋・北東太平洋ではハリケーン、インド洋・南太平洋ではサイクロンという。

別解・別の確かめ方

- 地図帳の分布図（プレートの境界・気候区分・土壌）や模式図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 呼び名が違うので、別のしくみの現象だと思いこんでいる。

HS-GEOE-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））