Дезинфекция помещения (без растений)

Перед остановкой помещения сити-фермы на дезинфекцию необходимо провести ликвидационную обработку по растениям смесью фунгицидов и инсектицидов. Эта обработка необходима для того, чтобы максимально уничтожить всех живых вредителей и удалить патогенные грибки и бактерии. Для обработки используются сильные инсектициды (Актеллик, Клипер и др.), обладающие как инсектицидным, так и акарицидным действием.

> *В качестве фунгицида необходимо выбирать препараты широкого спектра действия (Фундазол, Ридомил-Голд и т.д.). Инсектициды и фунгициды могут быть использованы вместе в баковой смеси*

После проведения ликвидной обработки необходимо выдержать помещение полностью закрытым при температуре не ниже 18 градусов в течение суток. Это необходимо для максимально активного действия препаратов.

Перед началом уборки и мойки из помещения следует все удалить растения, растительные остатки и материалы. Живые и мертвые растительные остатки и растительный сок - источники инфекции для новой культуры и резервуары сохранения вредителей.

> *При этом следует учесть, что растительные остатки накапливаются в щелях оборудования, в креплениях шлангов полива и труб отопления*

При выносе растений с сити-фермы важно не допустить их размельчения, растирания. При размельчении растений выделяется растительный сок и возникает множество мелких частей, которые трудно собрать. Растительный сок может содержать вирусы, споры грибов и бактерий.

Удобнее всего использовать для утилизации растительных остатков водонепроницаемые пакеты или пластиковые контейнеры.

> *Важно! Следует избегать попадания растительного сока и мелких растительных остатков в систему полива*

После удаления растений необходимо вымыть все оборудование, пол, стены и конструкции в помещении теплой (не ниже 45 градусов) водой с пенящимся моющим раствором. Хороший эффект дает применение обычного щелочного хозяйственного мыла без отдушек и отбеливающих добавок. Категорически нельзя использовать для уборки дождевую воду и воду поверхностных водоемов. Для мытья используют водопроводную воду, воду из скважин или воду, очищенную осмотическим фильтром.

> *Зеленые пятна от водорослей на оборудовании, на полу и стенах тщательно зачищают*

Только после удаления всех растительных остатков и тщательного смывания загрязнений можно проводить мойку различными чистящими и дезинфицирующими средствами. Без предварительной тщательной мойки дальнейшая дезинфекция бессмысленна!!!

Для дезинфекции можно использовать 0,25% раствор гипохлорита натрия с добавлением моющих средств для посуды на основе ПАВ. Дезинфицирующую смесь наносят на оборудование и поверхности, через сутки тщательно смывают чистой водой.

> *Необходимо избегать попадания моющих и дезинфицирующих средств в систему полива и дренажа*

Для промывки и дезинфекции системы полива и дренажа используется раствор азотной кислоты с pH 2-3, который закачивают в систему полива и оставляют на 1-3 часа. После экспозиции раствор кислоты выдавливают раствором чистой воды до стабилизации pH на уровне не ниже 5,8-6,0.

Можно провести дополнительную обработку системы полива и дренажа 1-3 % раствором перекиси водорода. Перекись, как и кислоту, закачивают в систему полива на сутки, по прошествии этого времени выдавливают чистой водой.

Необходимо тщательно вымыть горячей водой с мылом и ополоснуть чистой проточной водой емкость для сбора дренажного раствора. Емкость и шланги системы полива снаружи можно дополнительно продезинфицировать 6% раствором перекиси водорода.

> *Категорически нельзя оставлять в системе полива неиспользованные поливочные растворы!*

Горячей водой с мылом следует тщательно вымыть все оборудование и инструментарий.

Всю использованную спецодежду, обувь и т.д. необходимо выстирать в воде с температурой не менее 60 градусов.

Одновременно с мойкой помещения проводят ремонтные работы, так, чтобы они были закончены к моменту дезинфекции.

После окончания мойки и высыхания оборудования, поверхностей и конструкций в помещении проводят дезинфекционную обработку препаратом типа Вироцид, Кикстарт, Экоцид. Важно! Обрабатывать необходимо именно сухие поверхности, так как капли воды могут служить «изоляцией», в которой сохранятся патогены.

При обработке Вироцидом используют 1%- ным раствор с расходом рабочей жидкости 0,2-0,25 л/м2. При обработке Кикстартом и Экоцидом используют 1% раствор с расходом рабочей жидкости 0,3 л/м2. При работе другими препаратами действуют по инструкции.

> *После проведения дезинфекционной обработки помещение максимально герметизируют и выдерживают при температуре не менее 20 градусов в течение 3 суток*

Через 3 суток проводят повторную мойку конструкций, поверхностей и оборудования чистой водой, максимально смывая следы дезинфицирующего раствора. При этом важно ополоснуть стены и потолок, чтобы в дальнейшем не допустить попадания дезинфектанта на растения.