

Master RSD (2011-2012)

Corrigé du contrôle N°2 du module Complexité

Exercice1 :

a- $3n^3 + 2^{n-2}$

Nous devons trouver les constantes $c, n_0 > 0$ telles que :

$$0 \leq 3n^3 + 2^{n-2} \leq c \cdot 2^n \quad \text{pour tout } n \geq n_0.$$

$$0 \leq \frac{3n^3 + 2^{n-2}}{2^n} \leq \frac{c \cdot 2^n}{2^n}$$

$$0 \leq \frac{3n^3}{2^n} + \frac{2^{n-2}}{2^n} \leq c$$

$$0 \leq 3 \frac{n^3}{2^n} + \frac{1}{4} \leq c$$

$$\frac{n^3}{2^n} \leq 1 \quad \forall n \geq 10$$

$$\Rightarrow c = \frac{13}{4} \text{ et } n_0=10 \text{ donc la complexité}=O(2^n)$$

b- $4n^3 + 12$;

Nous devons trouver les constantes $c, n_0 > 0$ telles que :

$$0 \leq 4n^3 + 12 \leq c \cdot n^3 \quad \text{pour tout } n \geq n_0.$$

$$\Rightarrow c = 6 \text{ et } n_0=2 \text{ donc la complexité}=O(n^3)$$

c- $n^2 \log(5n^4)$;

Nous devons trouver les constantes $c, n_0 > 0$ telles que :

$$0 \leq n^2 \log(5n^4) \leq c \cdot g(n) \quad \text{pour tout } n \geq n_0.$$

$$n^2 \log(5n^4) = n^2 \times (\log 5 + \log n^4)$$

$$= n^2 \times \log 5 + n^2 \times 4 \log n$$

en appliquant la propriété de la somme on a

$$0 \leq n^2 \log(5n^4) \leq c \cdot n^2 \times \log n$$

avec $C=7$ et $n_0=2$ donc la complexité= $O(n^2 \log n)$

$$d- \frac{1}{2}n^2 - 10n - 60;$$

Nous devons trouver les constantes $c, n_0 > 0$ telles que :

$$0 \leq \frac{1}{2}n^2 - 10n - 60 \leq c \cdot n^2 \text{ pour tout } n \geq n_0.$$

$$\Rightarrow \text{la complexité} = O(n^2) \text{ avec } C = \frac{1}{2} \text{ et } n_0 = 1$$

$$e- \frac{1}{n}$$

Nous devons trouver les constantes $c, n_0 > 0$ telles que :

$$f- 0 \leq \frac{1}{n} \leq c \cdot \log n \text{ pour tout } n \geq n_0.$$

$$\Rightarrow \text{la complexité} = O(\log n) \text{ avec } c=1 \text{ et } n_0=2$$

Classement : Dans l'ordre croissant

$$\log n \subset n^2 \subset n^2 \log n \subset n^3 \subset 2^n$$

Exercice 2 :

a- fonction Carrelter(A :tableau[1..n] de caractères ; n :entier) :entier ;
var i, j, m :entier ;
debut
 si $n \bmod 2 \neq 0$ alors retourner 0
 sinon
 $i \leftarrow 1$; $m \leftarrow \lfloor n/2 \rfloor$; $j \leftarrow m+1$;
 tantque ($i \leq m$) et ($A[i] = A[j]$) faire
 $i \leftarrow i+1$; $j \leftarrow j+1$;
 fait;
 si ($i > m$) alors retourner 1
 sinon retourner 0 ;
 fsi ;
fsi ;
fin ;

b- Invariant de boucle : On pose $m = \lfloor n/2 \rfloor$

« A la fin de la $k^{\text{ème}}$ itération de la boucle **tantque** tous les caractères $A[1..i]$ sont égaux à $A[m+1..j]$ puis on incrémente i et on incrémente j . La fonction s'arrête si $i_{k+1} > m$ et retourne 1 ou bien elle s'arrête si $A[i_{k+1}] \neq A[j_{k+1}]$ et retourne 0 »

Ceci à condition que la taille du mot soit paire, sinon il ne peut pas être carré.

c- On montre la validité de l'invariant par récurrence sur i .

L'invariant est facilement vérifié pour la 1^{ère} itération on a $i=1$ et $j=m$ si $A[1]=A[m+1]$ alors on incrémente $i_2=i_1+1$ et on incrémente $j_2=j_1+1$, si $i > m$ alors la fonction se termine et le mot est carré sinon si $A[1] \neq A[m+1]$ la fonction se termine et le mot n'est pas carré.

On suppose que l'invariant est vrai à la fin de l'itération i et on montre qu'il est vrai, s'il y en a, pour l'itération $i+1$, c'est que $\forall k \in \{1..i\}$ et $\ell \in \{m+1..j\}$ $A[k]=A[\ell]$. Si $k_{i+1} < \ell_{i+1}$ et $A[k_{i+1}]=A[\ell_{i+1}]$ on incrémente k et on incrémente ℓ sinon si $k_{i+1} > \ell_{i+1}$ alors la fonction se termine et le mot est carré sinon si $A[k_{i+1}] \neq A[\ell_{i+1}]$ alors la fonction se termine et le mot n'est pas carré. L'invariant à la fin de l'itération $i+1$ est donc vérifié.

Au pire des cas le mot est carré et on aura fait $m=\lfloor n/2 \rfloor$ comparaison, donc la complexité au pire des cas est de $O(n/2)$ et dans le meilleur des cas la fonction s'arrête quand $A[1] \neq A[m+1]$ donc la complexité est en $O(1)$.

d- fonction CarreRec(A :tableau[1..n] de caractères; n, i, j :entier) :entier ;
 debut (1^{er} appel i=1 et j=m+1)

si (i>m) alors retourner 1

sinon si ($A[i] \neq A[j]$) alors retourner 0

sinon retourner(PalindromeRec(A, n, i+1, j+1);

fsi ;

fsi ;

fin ;

Invariant :

« A la fin de la k^{ième} itération si $i > m$ la fonction se termine et le mot est carré ou bien $A[i] \neq A[j]$ et la fonction se termine et le mot n'est pas carre sinon on fait un appel récursif en incrémentant i et en incrémentant j »