

Санкт-Петербургский Политехнический университет
Петра Великого
Институт Прикладной Математики и Механики
Кафедра «Прикладная Математика и Информатика»

Отчет
По лабораторной работе № 5-8
По Дисциплине «Математическая статистика»

Выполнил:
Студент Селянкин Федор
Группа 3630102/70301
Проверил:
к.ф. – м.н., доцент
Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург
2020 г.

Содержание

Постановка задачи	4
Теория.....	4
Двумерное нормальное распределение	4
Корреляционный момент (ковариация) и коэффициент корреляции.....	5
Выборочные коэффициенты корреляции	5
Выборочный коэффициент корреляции Пирсона.....	5
Выборочный квадрантный коэффициент корреляции	5
Выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена	6
Эллипсы рассеивания	6
Модель простой линейной регрессии.....	7
Метод наименьших квадратов.....	8
Расчётные формулы для МНК-оценок.....	8
Робастные оценки коэффициентов линейной регрессии	9
Метод максимального правдоподобия	11
Проверка гипотезы о законе распределения генеральной совокупности. Метод хи-квадрат.....	12
Доверительные интервалы для параметров нормального распределения.....	15
Доверительный интервал для математического ожидания m нормального распределения ..	15
Доверительный интервал для среднего квадратического отклонения σ нормального распределения	16
Доверительные интервалы для математического ожидания m и среднего квадратического отклонения σ произвольного распределения при большом объёме выборки. Асимптотический подход.	16
Доверительный интервал для математического ожидания m произвольной генеральной совокупности при большом объёме выборки	16
Доверительный интервал для среднего квадратического отклонения σ произвольной генеральной совокупности при большом объёме выборки	17
Реализация	18
Результаты	18
Выборочные коэффициенты корреляции	18
Эллипсы рассеивания	20
Выборка без возмущений.....	21
Выборка с возмущениями	21
Проверка гипотезы о законе распределения генеральной совокупности. Метод хи-квадрат.....	22
Мощность выборки = 10	22
Мощность выборки = 100	23
Доверительные интервалы для параметров нормального распределения.....	24

Доверительные интервалы для параметров произвольного распределения. Асимптотический подход	24
Обсуждения	24
Выборочные коэффициенты корреляции и эллипсы рассеивания	24
Оценки коэффициентов линейной регрессии	24
Проверка гипотезы о законе распределения генеральной совокупности. Метод хи-квадрат.....	24
Выборка мощностью 10	24
Выборка мощностью 100	24
Доверительные интервалы для параметров распределения	25
Литература	25
Список иллюстраций:	
Рисунок 1 Двумерное нормальное распределение $n = 20$	20
Рисунок 2 Двумерное нормальное распределение $n = 60$	20
Рисунок 3 Двумерное нормальное распределение $n = 100$	21
Рисунок 4 Выборка без возмущений	21
Рисунок 5 Выборка с возмущениями	22
Рисунок 6 График частот для выборки мощностью 10 и график теоретических значений частот на таком же разбиении	22
Рисунок 7 График частот для выборки мощностью 10 и график теоретических значений частот на таком же разбиении	23
Список таблиц:	
Таблица 1 Двумерное нормальное распределение, $n = 20$	19
Таблица 2 Двумерное нормальное распределение, $n = 60$	19
Таблица 3 Двумерное нормальное распределение, $n = 100$	19
Таблица 4 Смесь нормальных распределений	20
Таблица 5 Вычисление χ^2 при проверке гипотезы H_0 о нормальном законе распределения $N(\mu, \sigma)$ для выборки мощностью 100	23
Таблица 6 Вычисление χ^2 при проверке гипотезы H_0 о нормальном законе распределения $N(\mu, \sigma)$ для выборки мощностью 100	24
Таблица 7 Доверительные интервалы для параметров нормального распределения	24
Таблица 8 Доверительные интервалы для параметров нормального распределения. Асимптотический подход	24

Постановка задачи

Задание 5. Сгенерировать двумерные выборки размерами 20, 60, 100 для нормального двумерного распределения $N(x, y, 0, 0, 1, 1, \rho)$.

Коэффициент корреляции взять равным 0, 0.5, 0.9.

Каждая выборка генерируется 1000 раз и для неё вычисляются: среднее значение, среднее значение квадрата и дисперсия коэффициентов корреляции Пирсона, Спирмена и квадратного коэффициента корреляции.

Повторить все вычисления для смеси нормальных распределений:

$$f(x, y) = 0.9N(x, y, 0, 0, 1, 1, 0.9) + 0.1N(x, y, 0, 0, 10, 10, -0.9)$$

Изобразить сгенерированные точки на плоскости и нарисовать эллипс равновероятности.

Задание 6. Найти оценки коэффициентов линейной регрессии $y_i = a + bx_i + e_i$, используя 20 точек на отрезке $[-1.8; 2]$ с равномерным шагом равным 0.2. Ошибку e_i считать нормально распределённой с параметрами (0, 1). В качестве эталонной зависимости взять $y_i = 2 + 2x_i + e_i$. При построении оценок коэффициентов использовать два критерия: критерий наименьших квадратов и критерий наименьших модулей. Прodelать то же самое для выборки, у которой в значения y_1 и y_{20} вносятся возмущения 10 и -10.

Задание 7. сгенерировать выборку объёмом 10 и 100 элементов для нормального распределения $N(x, 0, 1)$. По сгенерированной выборке оценить параметры μ и σ нормального закона методом максимального правдоподобия. В качестве основной гипотезы H_0 будем считать, что сгенерированное распределение имеет вид $N(x, \hat{\mu}, \hat{\sigma})$. Проверить основную гипотезу, используя критерий согласия χ^2 . В качестве уровня значимости взять $\alpha = 0.05$. Привести таблицу вычислений χ^2 .

Построить гистограмму сгенерированных событий и теоретическое распределение на одном графике.

Если гипотеза не подтвердилась указать причины.

Задание 8. Для двух выборок размерами 20 и 100 элементов, сгенерированных согласно нормальному закону $N(x, 0, 1)$ для параметров положения масштаба построить асимптотически нормальные интервальные оценки на основе точечных оценок метода максимального правдоподобия и классические интервальные оценки на основе статистик χ^2 и Стьюдента. В качестве надёжности взять $\gamma = 0.95$.

Теория

Двумерное нормальное распределение

Двумерная случайная величина (X, Y) называется распределённой нормально (или просто нормальной), если её плотность вероятности определена формулой

(1)

$$N(x, y, \bar{x}, \bar{y}, \sigma_x, \sigma_y, \rho) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\bar{x})^2}{\sigma_x^2} - 2\rho \frac{(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sigma_x\sigma_y} + \frac{(y-\bar{y})^2}{\sigma_y^2} \right] \right\}$$

Компоненты X , Y двумерной нормальной случайной величины также распределены нормально с математическими ожиданиями \bar{x} , \bar{y} и средними квадратическими отклонениями σ_x , σ_y соответственно.

Параметр ρ называется коэффициентом корреляции.

Корреляционный момент (ковариация) и коэффициент корреляции

Корреляционным моментом, иначе ковариацией, двух случайных величин X и Y называется математическое ожидание произведения отклонений этих случайных величин от их математических ожиданий.

(2)

$$K = \text{cov}(X, Y) = M[(X - \bar{x})(Y - \bar{y})]$$

Коэффициентом корреляции ρ двух случайных величин X и Y называется отношение их корреляционного момента к произведению их средних квадратических отклонений:

(3)

$$\rho = \frac{K}{\sigma_x\sigma_y}$$

Коэффициент корреляции – это нормированная числовая характеристика, являющаяся мерой близости зависимости между случайными величинами к линейной.

Выборочные коэффициенты корреляции

Выборочный коэффициент корреляции Пирсона

Пусть по выборке значений двумерной с.в. требуется оценить коэффициент корреляции.

Естественной оценкой для ρ служит его статистический аналог в виде выборочного коэффициента корреляции, предложенного К. Пирсоном

(4)

$$r = \frac{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 \frac{1}{n} \sum (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{K}{s_x s_y}$$

Где K , s_x^2 , s_y^2 – выборочные ковариация и дисперсии с.в. X и Y .

Выборочный квадрантный коэффициент корреляции

Кроме выборочного коэффициента корреляции Пирсона, существуют и другие оценки степени взаимосвязи между случайными величинами. К ним относится выборочный квадрантный коэффициент корреляции

(5)

$$r_Q = \frac{(n_1 + n_3) - (n_2 + n_4)}{n}$$

Где n_1, n_2, n_3 и n_4 – количества точек с координатами (x_i, y_i) попавшими соответственно в I, II, III и IV квадранты декартовой системы с осями $x' = x - \text{med } x$, $y' = y - \text{med } y$ и с центром в точке с координатами $(\text{med } x, \text{med } y)$.

Выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена

На практике нередко требуется оценить степень взаимодействия между качественными признаками изучаемого объекта. Качественным называется признак, который нельзя измерить точно, но который позволяет сравнивать изучаемые объекты между собой и располагать их в порядке убывания или возрастания их качества. Для этого объекты выстраиваются в определённом порядке в соответствии с рассматриваемым признаком. Процесс упорядочения называется ранжированием, и каждому члену упорядоченной последовательности объектов присваивается ранг, или порядковый номер. Например, объекту с наименьшим значением признака присваивается ранг 1, следующему за ним объекту – ранг 2, и т.д. Таким образом, происходит сравнение каждого объекта со всеми объектами изучаемой выборки.

Если объект обладает не одним, а двумя качественными признаками – переменными X и Y , то для исследования их взаимосвязи используют выборочный коэффициент корреляции между двумя последовательностями рангов этих признаков.

Обозначим ранги, соответствующие значениям переменной X , через u , а ранги, соответствующие значениям переменной Y , – через v .

Выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена определяется как выборочный коэффициент корреляции Пирсона между рангами u , v переменных X , Y :

(6)

$$r_S = \frac{\frac{1}{n} \sum (u_i - \bar{u})(v_i - \bar{v})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum (u_i - \bar{u})^2 \frac{1}{n} \sum (v_i - \bar{v})^2}}$$

где $\bar{u} = \bar{v} = \frac{1+2+\dots+n}{n} = \frac{n+1}{2}$ – среднее значение рангов.

Эллипсы рассеивания

Рассмотрим поверхность распределения, изображающую функцию (1). Она имеет вид холма, вершина которого находится над точкой (\bar{x}, \bar{y}) .

В сечении поверхности распределения плоскостями, параллельными оси $N(x, y, x, y, \sigma_x, \sigma_y, \rho)$, получаются кривые, подобные нормальным кривым распределения. В сечении поверхности распределения плоскостями, параллельными плоскости xOy , получаются эллипсы. Напишем уравнение проекции такого эллипса на плоскость xOy :

(7)

$$\frac{(x - \bar{x})^2}{\sigma_x^2} - 2\rho \frac{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sigma_x \sigma_y} + \frac{(y - \bar{y})^2}{\sigma_y^2} = const$$

Уравнение эллипса (7) можно проанализировать обычными методами аналитической геометрии. Применяя их, убеждаемся, что центр эллипса (7) находится в точке с координатами (\bar{x}, \bar{y}) ; что касается направления осей симметрии эллипса, то они составляют с осью Ox углы, определяемые уравнением

(8)

$$tg 2\alpha = \frac{2\rho\sigma_x\sigma_y}{\sigma_x^2 - \sigma_y^2}$$

Это уравнение дает два значения углов: α и α_1 , различающиеся на $\frac{\pi}{2}$.

Таким образом, ориентация эллипса (7) относительно координатных осей находится в прямой зависимости от коэффициента корреляции ρ системы (X, Y) ; если величины не коррелированы (т.е. в данном случае и независимы), то оси симметрии эллипса параллельны координатным осям; в противном случае они составляют с координатными осями некоторый угол. Пересекая поверхность распределения плоскостями, параллельными плоскости xOy , и проектируя сечения на плоскость xOy мы получим целое семейство подобных и одинаково расположенных эллипсов с общим центром (\bar{x}, \bar{y}) . Во всех точках каждого из таких эллипсов плотность распределения $N(x, y, \sigma_x, \sigma_y, \rho)$ постоянна. Поэтому такие эллипсы называются эллипсами равной плотности или, короче эллипсами рассеивания. Общие оси всех эллипсов рассеивания называются главными осями рассеивания.

Модель простой линейной регрессии

Регрессионную модель описания данных называют простой линейной регрессией, если

(9)

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, i = 1, \dots, n,$$

где x_1, \dots, x_n – заданные числа (значения фактора); y_1, \dots, y_n – наблюдаемые значения отклика; $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ – независимые, нормально распределённые $N(0, \sigma)$ с нулевым математическим ожиданием и одинаковой (неизвестной) дисперсией случайные величины (ненаблюдаемые); β_0, β_1 – неизвестные параметры, подлежащие оцениванию.

В модели (9) отклик y зависит от одного фактора x , и весь разброс экспериментальных точек объясняется только погрешностями наблюдений (результатов измерений) отклика y . Погрешности результатов измерений x в этой модели полагают существенно меньшими погрешностей результатов измерений y , так что ими можно пренебречь.

Метод наименьших квадратов

При оценивании параметров регрессионной модели используют различные методы. Один из наиболее распространённых подходов заключается в следующем: вводится мера (критерий) рассогласования отклика и регрессионной функции, и оценки параметров регрессии определяются так, чтобы сделать это рассогласование наименьшим. Достаточно простые расчётные формулы для оценок получают при выборе критерия в виде суммы квадратов отклонений значений отклика от значений регрессионной функции (сумма квадратов остатков):

(10)

$$Q(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2 \rightarrow \min_{\beta_0, \beta_1}$$

Задача минимизации квадратичного критерия (10) носит название задачи метода наименьших квадратов (МНК), а оценки $\widehat{\beta}_0, \widehat{\beta}_1$ параметров β_0, β_1 , реализующие минимум критерия (10), называют МНК-оценками.

Расчётные формулы для МНК-оценок

МНК-оценки параметров $\widehat{\beta}_0$ и $\widehat{\beta}_1$ находятся из условия обращения функции $Q(\beta_0, \beta_1)$ в минимум.

Для нахождения МНК-оценок $\widehat{\beta}_0$ и $\widehat{\beta}_1$ выпишем необходимые условия экстремума:

(11)

$$\begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial \beta_0} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0 \\ \frac{\partial Q}{\partial \beta_1} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) x_i = 0 \end{cases}$$

Далее для упрощения записи сумм будем опускать индекс суммирования. Из системы (11) получим

$$\begin{cases} n\widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 \sum x_i = \sum y_i \\ \widehat{\beta}_0 \sum x_i + \widehat{\beta}_1 \sum x_i^2 = \sum x_i y_i \end{cases}$$

Разделим оба уравнения на n:

(12)

$$\begin{cases} \widehat{\beta}_0 + \left(\frac{1}{n} \sum x_i\right) \widehat{\beta}_1 = \frac{1}{n} \sum y_i \\ \left(\frac{1}{n} \sum x_i\right) \widehat{\beta}_0 + \left(\frac{1}{n} \sum x_i^2\right) \widehat{\beta}_1 = \frac{1}{n} \sum x_i y_i \end{cases}$$

и, используя известные статистические обозначения для выборочных первых и вторых начальных моментов

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i, \bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i, \overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum x_i^2, \overline{xy} = \frac{1}{n} \sum x_i y_i,$$

получим

(13)

$$\begin{cases} \widehat{\beta}_0 + \bar{x}\widehat{\beta}_1 = \bar{y} \\ \bar{x}\widehat{\beta}_0 + \overline{x^2}\widehat{\beta}_1 = \overline{xy} \end{cases}$$

Откуда МНК-оценку $\widehat{\beta}_1$ наклона прямой регрессии находим по формуле Крамера

(14)

$$\widehat{\beta}_1 = \frac{\overline{xy} - \bar{x} * \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2},$$

а МНК-оценку $\widehat{\beta}_0$ определяем непосредственно из первого уравнения системы (13):

(15)

$$\widehat{\beta}_0 = \bar{y} - \bar{x}\widehat{\beta}_1$$

Заметим, что определитель системы (13)

$$\overline{x^2} - (\bar{x})^2 = n^{-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 = s_x^2 > 0,$$

Если среди значений x_1, \dots, x_n есть различные, что и будем предполагать.

Доказательство минимальности функции $Q(\beta_0, \beta_1)$ в стационарной точке проведём с помощью известного достаточного признака экстремума функции двух переменных. Имеем:

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial \beta_0^2} = 2n, \frac{\partial^2 Q}{\partial \beta_1^2} = 2 \sum x_i^2 = 2n\overline{x^2}, \frac{\partial^2 Q}{\partial \beta_0 \partial \beta_1} = 2 \sum x_i = 2n\bar{x}.$$

$$\Delta = \frac{\partial^2 Q}{\partial \beta_0^2} * \frac{\partial^2 Q}{\partial \beta_1^2} - \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial \beta_0 \partial \beta_1} \right)^2 = 4n^2 \overline{x^2} - 4n^2 (\bar{x})^2 = 4n^2 [\overline{x^2} - (\bar{x})^2] = 4n^2 \left[\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 \right] = 4n^2 s_x^2 > 0$$

Этот результат вместе с условием $\frac{\partial^2 Q}{\partial \beta_0^2} = 2n > 0$ означает, что в стационарной точке функция Q имеет минимум.

Робастные оценки коэффициентов линейной регрессии

Робастность оценок коэффициентов линейной регрессии (т.е. их устойчивость по отношению к наличию в данных редких, но больших по величине выбросов) может быть обеспечена различными способами. Одним из них является использование метода наименьших модулей вместо метода наименьших квадратов:

(16)

$$\sum_{i=1}^n |y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i| \rightarrow \min_{\beta_0, \beta_1}$$

Напомним, что использование метода наименьших модулей в задаче оценивания параметра сдвига распределений приводит к оценке в виде выборочной медианы, обладающей робастными свойствами. В отличие от этого случая и от задач метода наименьших квадратов, на практике задача (16) решается численно. Соответствующие процедуры представлены в некоторых современных пакетах программ по статистическому анализу.

Здесь мы рассмотрим простейшую в вычислительном отношении робастную альтернативу оценкам коэффициентов линейной регрессии по МНК. Для этого сначала запишем выражения для оценок (14) и (15) в другом виде:

$$\begin{aligned}\widehat{\beta}_1 &= \frac{\overline{xy} - \bar{x} * \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} = \frac{k_{xy}}{s_x^2} = \frac{k_{xy}}{s_x s_y} * \frac{s_y}{s_x} = r_{xy} \frac{s_y}{s_x} \\ \widehat{\beta}_0 &= \bar{y} - \bar{x} \widehat{\beta}_1\end{aligned}\quad (17)$$

В формулах (17) заменим выборочные средние \bar{x} и \bar{y} соответственно на робастные выборочные медианы $\text{med } x$ и $\text{med } y$, среднеквадратические отклонения s_x и s_y на робастные нормированные интерквартильные широты q_x^* и q_y^* , выборочный коэффициент корреляции r_{xy} - на знаковый коэффициент корреляции r_Q :

$$\widehat{\beta}_{1R} = r_Q \frac{q_y^*}{q_x^*} \quad (18)$$

$$\widehat{\beta}_{0R} = \text{med } y - \widehat{\beta}_{1R} \text{med } x, \quad (19)$$

$$r_Q = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{sign}(x_i - \text{med } x) \text{sign}(y_i - \text{med } y) \quad (20)$$

$$q_y^* = \frac{y_{(j)} - y_{(l)}}{k_q(n)}, \quad q_x^* = \frac{x_{(j)} - x_{(l)}}{k_q(n)}$$

$$l = \begin{cases} [n/4] + 1 & \text{при } n/4 \text{ дробном} \\ n/4 & \text{при } n/4 \text{ целом} \end{cases}$$

$$j = n - l + 1$$

$$\text{sign } z = \begin{cases} 1 & \text{при } z > 0 \\ 0 & \text{при } z = 0 \\ -1 & \text{при } z < 0 \end{cases}$$

Уравнение регрессии здесь имеет вид

$$y = \widehat{\beta}_{0R} + \widehat{\beta}_{1R} x \quad (22)$$

Статистики выборочной медианы и интерквартильной широты обладают робастными свойствами в силу того, что основаны на центральных порядковых статистиках, малочувствительных к большим по величине выбросам в данных. Статистика выборочного знакового коэффициента корреляции робастна, так как знаковая функция $\text{sing } z$ чувствительна не к величине аргумента, а только к его знаку. Отсюда оценка прямой регрессии (22) обладает очевидными робастными свойствами устойчивости к выбросам по координате y , но она довольно груба.

Метод максимального правдоподобия

Одним из универсальных методов оценивания является метод максимального правдоподобия, предложенный Р. Фишером (1921).

Пусть x_1, \dots, x_n – случайная выборка из генеральной совокупности с плотностью вероятности $f(x, \theta)$; $L(x_1, \dots, x_n, \theta)$ – функция правдоподобия (ФП), представляющая собой совместную плотность вероятности независимых с. в. x_1, \dots, x_n и рассматриваемая как функция неизвестного параметра θ :

$$L(x_1, \dots, x_n, \theta) = f(x_1, \theta)f(x_2, \theta) \dots f(x_n, \theta)$$

(23)

Определение. Оценкой максимального правдоподобия (о.м.п) будем называть такое значение $\hat{\theta}_{\text{мп}}$ из множества допустимых значений параметра θ , для которого ФП принимает наибольшее значение при заданных x_1, \dots, x_n .

(24)

$$\hat{\theta}_{\text{мп}} = \arg \max_{\theta} L(x_1, \dots, x_n, \theta)$$

Если ФП дважды дифференцируема, то её стационарные значения даются корнями уравнения

(25)

$$\frac{\partial L(x_1, \dots, x_n, \theta)}{\partial \theta} = 0$$

Достаточным условием того, чтобы некоторое стационарное значение $\tilde{\theta}$ было локальным максимумом, является неравенство

(26)

$$\frac{\partial^2 L}{\partial \theta^2}(x_1, \dots, x_n, \tilde{\theta}) < 0$$

Определив точки локальных максимумов ФП (если их несколько), находят наибольший, который и даёт решение задачи (23).

Часто проще искать максимум логарифма ФП, так как он имеет максимум в одной точке с ФП:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = \frac{1}{L} \frac{\partial L}{\partial \theta}, \text{ если } L > 0,$$

и соответственно решать уравнение

(27)

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = 0,$$

Которое называют *уравнением правдоподобия*.

В задаче оценивания векторного параметра $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_m)$ аналогично (24) находится максимум ФП нескольких аргументов:

(28)

$$\hat{\theta}_{\text{МП}} = \arg \max_{\theta_1, \dots, \theta_m} L(x_1, \dots, x_n, \theta_1, \dots, \theta_m)$$

и в случае дифференцируемости ФП выписывается система уравнений правдоподобия

(29)

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_k} = 0 \text{ или } \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_k} = 0, k = 1, \dots, m$$

Пример. Оценивание м.о. m и дисперсии σ^2 нормального распределения $N(m, \sigma)$.

Составим функцию правдоподобия и получим последовательно:

$$L(x_1, \dots, x_n, m, \sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x_i - m)^2}{2\sigma^2}\right\} = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2\right\},$$

$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln 2\pi - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2.$$

Получим следующие уравнения правдоподобия:

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial m} = \frac{1}{\hat{\sigma}^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{m}) = \frac{n}{\hat{\sigma}^2} (\bar{x} - \bar{m}) = 0, \\ \frac{\partial \ln L}{\partial (\sigma^2)} = -\frac{n}{2\hat{\sigma}^2} + \frac{1}{2(\hat{\sigma}^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{m})^2 = \frac{n}{2(\hat{\sigma}^2)^2} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{m})^2 - \hat{\sigma}^2 \right] = 0, \end{cases}$$

откуда следует, что выборочное среднее \bar{x} – о.м.п. математического ожидания: $\hat{m}_{\text{МП}} = \bar{x}$, а выборочная дисперсия $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ – о.м.п. генеральной дисперсии: $\hat{\sigma}_{\text{МП}}^2 = s^2$.

Проверка гипотезы о законе распределения генеральной совокупности. Метод хи-квадрат

Исчерпывающей характеристикой изучаемой случайной величины является её закон распределения. Поэтому естественно стремление исследователей построить этот закон приближённо на основе статистических данных.

Сначала выдвигается гипотеза о виде закона распределения.

После того как выбран вид закона, возникает задача оценивания его параметров и проверки (тестирования) закона в целом.

Для проверки гипотезы о законе распределения применяются критерии согласия. Таких критериев существует много. Мы рассмотрим наиболее обоснованный и наиболее часто используемый в практике – критерий χ^2 (хи-квадрат), введенный К. Пирсоном (1900 г.) для случая, когда параметры распределения известны. Этот критерий был существенно уточнен Р. Фишером (1924 г.), когда параметры распределения оцениваются по выборке, используемой для проверки.

Мы ограничимся рассмотрением случая одномерного распределения.

Итак, выдвинута гипотеза H_0 о генеральном законе распределения с функцией распределения $F(x)$.

Рассматриваем случай, когда гипотетическая функция распределения $F(x)$ не содержит неизвестных параметров.

Разобьём генеральную совокупность, т.е. множество значений изучаемой случайной величины X на k непересекающихся подмножеств $\Delta_1, \dots, \Delta_k$.

Пусть $p_i = P(X \in \Delta_i), i = 1, \dots, k$.

Если генеральная совокупность – вся вещественная ось, то подмножества $\Delta_i = (a_{i-1}, a_i]$ – полуоткрытые промежутки ($i = 2, \dots, k-1$). Крайние промежутки будут полубесконечными: $\Delta_1 = (-\infty, a_1], \Delta_k = (a_{k-1}, +\infty)$. В этом случае $p_i = F(a_i) - F(a_{i-1})$; $a_0 = -\infty, a_k = +\infty$ ($i = 1, \dots, k$).

Пусть, далее, n_1, n_2, \dots, n_k – частоты попадания выборочных элементов в подмножества $\Delta_1, \dots, \Delta_k$ соответственно.

В случае справедливости гипотезы H_0 относительные частоты $\frac{n_i}{n}$ при большом n должны быть близки к вероятностям p_i ($i = 1, \dots, k$), поэтому за меру отклонения выборочного распределения от гипотетического с функцией $F(x)$ естественно выбрать величину

(30)

$$Z = \sum_{i=1}^n c_i \left(\frac{n_i}{n} - p_i \right)^2,$$

где c_i – какие-нибудь положительные числа (веса). К. Пирсоном в качестве весов выбраны числа $c_i = \frac{n}{p_i}$ ($i = 1, \dots, k$). Тогда получается статистика критерия хи-квадрат К. Пирсона

(31)

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{n}{p_i} \left(\frac{n_i}{n} - p_i \right)^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i},$$

Которая обозначена тем же символом, что и закон распределения хи-квадрат.

К. Пирсоном доказана теорема об асимптотическом поведении статистики χ^2 , указывающая путь её применения.

Теорема К. Пирсона. Статистика критерия χ^2 асимптотически распределена по закону χ^2 с $k-1$ степенями свободы.

Это означает, что независимо от вида проверяемого распределения, т.е. функции $F(x)$, выборочная функция распределения статистики χ^2 при $n \rightarrow \infty$ стремится к функции распределения случайной величины с плотностью вероятности

(32)

$$f_{k-1}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2^{\frac{k-1}{2}} \Gamma(\frac{k-1}{2})} x^{\frac{k-3}{2}} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \end{cases}$$

Для пояснения сущности метода χ^2 сделаем ряд замечаний.

Замечание 2.: Выбор подмножеств $\Delta_1, \dots, \Delta_k$ и их числа k в принципе ничем не регламентируется, так как $n \rightarrow \infty$. Но так как число n хотя и очень большое, но конечное, то k , должно быть с ним согласовано. Обычно его берут таким же, как и для построения гистограммы, т.е. можно руководствоваться формулой

(33)

$$k \approx 1.72 \sqrt[3]{n}$$

Или формулой Старджесса

(34)

$$k \approx 1 + 3.3 \lg n$$

При этом, если $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_k$ – промежутки, то их длины удобно сделать равными за исключением крайних – полубесконечных.

Замечание 2.(о числе степеней свободы).

Числом степеней свободы функции (по старой терминологии) называется число её независимых аргументов. Аргументами статистики χ^2 являются частоты n_1, n_2, \dots, n_k . Эти частоты связаны одним равенством $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$, а в остальном независимы в силу независимости элементов выборки. Таким образом, функция χ^2 имеет $k - 1$ независимых аргументов: число частот минус одна связь. В силу теоремы Пирсона число степеней свободы статистики χ^2 отражается на виде асимптотической плотности $f_{k-1}(x)$.

На основе общей схемы проверки статистических гипотез сформулируем следующее правило.

Правило проверки гипотезы о законе распределения по методу χ^2 .

1. Выбираем значимости α .
2. По таблице [3, с 358] находим квантиль $\chi^2_{1-\alpha}(k-1)$ распределения хи-квадрат с $k-1$ степенями свободы порядка $1 - \alpha$.
3. С помощью гипотетической функции распределения $F(x)$ вычисляем вероятности $p_i = P(X \in \Delta_i), i = 1, \dots, k$.
4. Находим частоты n_i попадания элементов выборки в подмножества $\Delta_i, i = 1, \dots, k$.
5. Вычисляем выборочное значение статистики критерия χ^2 :

$$\chi_B^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}.$$

6. Сравниваем χ_B^2 и квантиль $\chi^2_{1-\alpha}(k-1)$.
 - a. Если $\chi_B^2 < \chi^2_{1-\alpha}(k-1)$, то гипотеза H_0 на данном этапе проверки принимается.
 - b. Если $\chi_B^2 \geq \chi^2_{1-\alpha}(k-1)$, то гипотеза H_0 отвергается, выбирается одно из альтернативных распределений, и процедура проверки повторяется.

Замечание 3. Из формулы (31) видим, что веса $c_i = n/p_i$ пропорциональны n , т.е. с ростом n увеличиваются. Отсюда следует, что если выдвинутая гипотеза неверна, то относительные частоты n_i/n не будут близки к вероятностям p_i , и с ростом n величина χ_B^2 будет увеличиваться. При фиксированном уровне значимости α будет фиксированное пошаговое число – квантиль $\chi^2_{1-\alpha}(k-1)$, поэтому, увеличивая n , мы придём к неравенству $\chi_B^2 > \chi^2_{1-\alpha}(k-1)$, т.е. с увеличением объема выборки неверная гипотеза будет отвергнута.

Отсюда следует, что при сомнительной ситуации, когда $\chi_B^2 \approx \chi_{1-\alpha}^2(k-1)$, можно попытаться увеличить объем выборки (например, в 2 раза), чтобы требуемое неравенство было более чётким.

Замечание 4. Теория и практика применения критерия χ^2 указывают, что если для каких-либо подмножеств Δ_i ($i = 1, \dots, k$) условие $np_i \geq 5$ не выполняется, то следует объединить соседние подмножества (промежутки).

Это условие выдвигается требованием близости величин

$$(n_i - np_i) / \sqrt{np_i},$$

Квадраты которых являются слагаемыми χ^2 к нормальным $N(0,1)$. Тогда случайная величина в формуле (31) будет распределена по закону, близкому к хи-квадрат. Такая близость обеспечивается достаточной численностью элементов в подмножествах Δ_i .

Доверительные интервалы для параметров нормального распределения

Доверительный интервал для математического ожидания m нормального распределения. Дана выборка (x_1, x_2, \dots, x_n) объема n из нормальной генеральной совокупности. На её основе строим выборочное среднее \bar{x} и выборочное среднее квадратичное отклонение s . Параметры m и σ нормального распределения неизвестны.

Доказано, что случайная величина

(35)

$$T = \sqrt{n-1} * \frac{\bar{x} - m}{s}$$

называется статистикой Стьюдента, распределена по закону Стьюдента с $n - 1$ степенями свободы. Пусть $f_T(x)$ – плотность вероятности этого распределения. Тогда

$$\begin{aligned} P\left(-x < \sqrt{n-1} * \frac{\bar{x} - m}{s} < x\right) &= P\left(-x < \sqrt{n-1} * \frac{m - \bar{x}}{s} < x\right) = \int_{-x}^x f_T(t) dt = 2 \int_0^x f_T(t) dt \\ &= 2 \left(\int_{-\infty}^x f_T(t) dt - \frac{1}{2} \right) = 2F_T(x) - 1. \end{aligned}$$

Здесь $F_T(x)$ – функция распределения Стьюдента с $n - 1$ степенями свободы.

Полагаем $2F_T(x) - 1 = 1 - \alpha$, где α – выбранный уровень значимости. Тогда $F_T(x) = 1 - \alpha/2$. Пусть $t_{1-\alpha/2}(n-1)$ – квантиль распределения Стьюдента с $n - 1$ степенями свободы и порядка $1 - \alpha/2$. Из предыдущих равенств мы получаем

(36)

$$\begin{aligned} P\left(\bar{x} - \frac{sx}{\sqrt{n-1}} < m < \bar{x} + \frac{sx}{\sqrt{n-1}}\right) &= 2F_T(x) - 1 = 1 - \alpha \\ P\left(\bar{x} - \frac{st_{1-\alpha/2}(n-1)}{\sqrt{n-1}} < m < \bar{x} + \frac{st_{1-\alpha/2}(n-1)}{\sqrt{n-1}}\right) &= 1 - \alpha \end{aligned}$$

что и даёт доверительный интервал для m с доверительной вероятностью $\gamma = 1 - \alpha$.

Доверительный интервал для среднего квадратического отклонения σ нормального распределения

Дана выборка (x_1, x_2, \dots, x_n) объема n из нормальной генеральной совокупности. На её основе строим выборочное среднее \bar{x} и выборочную дисперсию s^2 . Параметры m и σ нормального распределения неизвестны. Доказано, что случайная величина ns^2/σ^2 распределена по закону χ^2 с $n - 1$ степенями свободы.

Задаёмся уровнем значимости α и, например, с помощью средств языка программирования python (функции `chi2.ppf` из пакета `scipy.stats`) находим квантили $\chi^2_{\alpha/2}(n - 1)$ и $\chi^2_{1-\alpha/2}(n - 1)$. Это значит, что

$$P\left(\chi^2(n - 1) < \chi^2_{\alpha/2}(n - 1)\right) = \alpha/2;$$

$$P\left(\chi^2(n - 1) < \chi^2_{1-\alpha/2}(n - 1)\right) = 1 - \alpha/2;$$

Тогда

$$P\left(\chi^2_{\alpha/2}(n - 1) < \frac{ns^2}{\sigma^2} < \chi^2_{1-\alpha/2}(n - 1)\right) = P\left(\frac{1}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n - 1)} < \frac{\sigma^2}{ns^2} < \frac{1}{\chi^2_{\alpha/2}(n - 1)}\right)$$

$$= P\left(\frac{s\sqrt{n}}{\sqrt{\chi^2_{1-\alpha/2}(n - 1)}} < \sigma < \frac{s\sqrt{n}}{\sqrt{\chi^2_{\alpha/2}(n - 1)}}\right).$$

Окончательно

(37)

$$P\left(\frac{s\sqrt{n}}{\sqrt{\chi^2_{1-\alpha/2}(n - 1)}} < \sigma < \frac{s\sqrt{n}}{\sqrt{\chi^2_{\alpha/2}(n - 1)}}\right) = 1 - \alpha$$

что и даёт доверительный интервал для σ с доверительной вероятностью $\gamma = 1 - \alpha$.

Доверительные интервалы для математического ожидания m и среднего квадратического отклонения σ произвольного распределения при большом объёме выборки. Асимптотический подход.

При большом объёме выборки для построения доверительных интервалов может быть использован асимптотический метод на основе центральной предельной теоремы.

Доверительный интервал для математического ожидания m произвольной генеральной совокупности при большом объёме выборки

Выборочное среднее $\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}$ при большом объёме выборки является суммой большого числа взаимно независимых одинаково распределённых случайных величин. Предполагаем, что исследуемое генеральное распределение имеет конечные математическое ожидание m и дисперсию σ^2 . Тогда в силу центральной предельной теоремы центрированная и нормальная случайная величина $(\bar{x} - M\bar{x})/\sqrt{D\bar{x}} = \sqrt{n}(\bar{x} - m)/\sigma$ распределена приблизительно нормально с параметрами 0 и 1. Пусть

(38)

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$$

-функция Лапласа. Тогда

$$P\left(-x < \sqrt{n} \frac{\bar{x} - m}{\sigma} < x\right) = P\left(-x < \sqrt{n} \frac{m - \bar{x}}{\sigma} < x\right) \approx \Phi(x) - \Phi(-x) = \Phi(x) - [1 - \Phi(x)] = 2\Phi(x) - 1.$$

Отсюда

(39)

$$P\left(\bar{x} - \frac{\sigma x}{\sqrt{n}} < m < \bar{x} + \frac{\sigma x}{\sqrt{n}}\right) \approx 2\Phi(x) - 1.$$

Полагаем $2\Phi(x) - 1 = \gamma = 1 - \alpha$; тогда $\Phi(x) = 1 - \alpha/2$. Пусть $u_{1-\alpha/2}$ – квантиль нормального распределения $N(0,1)$ порядка $1 - \alpha/2$. Заменяя в равенстве (39) σ на s , запишем его в виде

(40)

$$P\left(\bar{x} - \frac{su_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}} < m < \bar{x} + \frac{su_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}\right) \approx \gamma$$

что и даёт доверительный интервал для m с доверительной вероятностью $\gamma = 1 - \alpha$.

Доверительный интервал для среднего квадратического отклонения σ произвольной генеральной совокупности при большом объёме выборки

Выборочная дисперсия $s^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n}$ при большом объёме выборки является суммой большого числа практически взаимно независимых случайных величин (имеется одна связь $\sum_{i=1}^n x_i = n\bar{x}$), которой при большом n можно пренебречь). Предполагаем, что исследуемая генеральная совокупность имеет конечные первые четыре момента.

В силу центральной предельной теоремы центрированная и нормированная случайная величина $(s^2 - Ms^2)/\sqrt{Ds^2}$ при большом объёме выборки n распределена приблизительно нормально с параметрами 0 и 1. Пусть $\Phi(x)$ – функция Лапласа (38). Тогда

$$P\left(-x < \frac{s^2 - Ms^2}{\sqrt{Ds^2}} < x\right) \approx \Phi(x) - \Phi(-x) = \Phi(x) - [1 - \Phi(x)] = 2\Phi(x) - 1.$$

Положим $2\Phi(x) - 1 = \gamma - \alpha$. Тогда $\Phi(x) = 1 - \alpha/2$. Пусть $u_{1-\alpha/2}$ – корень этого уравнения – квантиль нормального распределения $N(0,1)$ порядка $1 - \alpha/2$. Известно, что $Ms^2 = \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} \approx \sigma^2$ и $Ds^2 = \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \approx \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n}$. Здесь μ_k – центральный момент k -го порядка генерального распределения; $\mu_2 = \sigma^2$; $\mu_4 = M[(x - Mx)^4]$; $o\left(\frac{1}{n}\right)$ – бесконечно малая высшего порядка, чем $1/n$, при $n \rightarrow \infty$. Итак, $Ds^2 \approx \frac{\mu_4 - \sigma^2}{n}$. Отсюда

$$Ds^2 \approx \frac{\sigma^4}{n} \left(\frac{\mu_4}{\sigma^4} - 1 \right) = \frac{\sigma^4}{n} \left(\left(\frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3 \right) + 2 \right) = \frac{\sigma^4}{n} (E + 2) \approx \frac{\sigma^4}{n} (e + 2),$$

Где $E = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$ – эксцесс генерального распределения, $e = \frac{m_4}{s^4} - 3$ – выборочный эксцесс; $m_4 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4$ – четвертый выборочный центральный момент. Далее,

$$\sqrt{Ds^2} \approx \frac{\sigma^2}{\sqrt{n}} \sqrt{e + 2}.$$

Преобразуем неравенства, стоящие под знаком вероятности в формуле

$$P \left(-x < \frac{s^2 - Ms^2}{\sqrt{Ds^2}} < x \right) = \gamma:$$

$$-\sigma^2 U < s^2 - \sigma^2 < \sigma^2 U;$$

$$-\sigma^2 U < s^2 - \sigma^2 < \sigma^2 U;$$

$$1/[\sigma^2(1 + U)] < 1/s^2 < 1/[\sigma^2(1 - U)];$$

(41)

$$s(1 + U)^{-1/2} < \sigma < s(1 - U)^{-1/2},$$

где $U = u_{1-\alpha/2} \sqrt{(e + 2)/n}$ или

$$s \left(1 + u_{1-\alpha/2} \sqrt{(e + 2)/n} \right)^{-1/2} < \sigma < s \left(1 - u_{1-\alpha/2} \sqrt{(e + 2)/n} \right)^{-1/2}.$$

Разлагая функции в биномиальный ряд и оставляя первые два члена, получим

(42)

$$s(1 - 0.5U) < \sigma < s(1 + 0.5U)$$

Или

$$s \left(1 - 0.5u_{1-\alpha/2} \sqrt{(e + 2)/n} \right) < \sigma < s \left(1 + 0.5u_{1-\alpha/2} \sqrt{(e + 2)/n} \right)$$

Формулы (41) и (42) дают доверительный интервал для σ с доверительной вероятностью $\gamma = 1 - \alpha$.

Замечание. Вычисления по формуле (41) дают более надёжный результат, так как в ней меньше грубых приближений.

Реализация

Лабораторная работа выполнена с помощью встроенных средств языка программирования Python в среде разработки PyCharm, с использованием дополнительных библиотек для отображения и расчетов. Исходный код лабораторной выложен на веб-сервисе GitHub [1].

Результаты

Выборочные коэффициенты корреляции

$\rho=0$	r	r_S	r_Q
$E(z)$	0.005	0.001	0.003

$E(z^2)$	0.05	0.04	0.05
$D(z)$	0.0527	0.0476	0.0516
$\rho=0.5$	r	r_S	r_Q
$E(z)$	0.49	0.46	0.33
$E(z^2)$	0.27	0.25	0.15
$D(z)$	0.0299	0.0313	0.0460
$\rho=0.9$	r	r_S	r_Q
$E(z)$	0.894	0.865	0.71
$E(z^2)$	0.802	0.752	0.53
$D(z)$	0.0024	0.0047	0.0247

Таблица 1 Двумерное нормальное распределение, $n = 20$

$\rho=0$	r	r_S	r_Q
$E(z)$	0.003	0.002	0.003
$E(z^2)$	0.02	0.017	0.02
$D(z)$	0.0177	0.0170	0.0175
$\rho=0.5$	r	r_S	r_Q
$E(z)$	0.5	0.48	0.34
$E(z^2)$	0.26	0.24	0.13
$D(z)$	0.0098	0.0107	0.0158
$\rho=0.9$	r	r_S	r_Q
$E(z)$	0.899	0.88	0.7
$E(z^2)$	0.81	0.78	0.52
$D(z)$	0.0007	0.0011	0.078

Таблица 2 Двумерное нормальное распределение, $n = 60$

$\rho=0$	r	r_S	r_Q
$E(z)$	0.003	-0.002	0.003
$E(z^2)$	0.01	0.01	0.01
$D(z)$	0.01	0.01	0.01
$\rho=0.5$	r	r_S	r_Q
$E(z)$	0.5	0.48	0.34
$E(z^2)$	0.26	0.24	0.12
$D(z)$	0.0059	0.007	0.0093
$\rho=0.9$	r	r_S	r_Q
$E(z)$	0.9	0.888	0.71
$E(z^2)$	0.811	0.789	0.52
$D(z)$	0.0004	0.0006	0.0050

Таблица 3 Двумерное нормальное распределение, $n = 100$

$n=20$	r	r_S	r_Q
$E(z)$	0.39	0.36	0.26
$E(z^2)$	0.19	0.17	0.12
$D(z)$	0.0401	0.0419	0.0524
$n=60$	r	r_S	r_Q

$E(z)$	0.4	0.37	0.26
$E(z^2)$	0.17	0.15	0.1
$D(z)$	0.0127	0.0132	0.0152
$n=100$	r	r_S	r_Q
$E(z)$	0.4	0.38	0.25
$E(z^2)$	0.17	0.15	0.07
$D(z)$	0.0058	0.0083	0.0100

Таблица 4 Смесь нормальных распределений

Эллипсы рассеивания




Рисунок 1 Двумерное нормальное распределение $n = 20$




Рисунок 2 Двумерное нормальное распределение $n = 60$




Рисунок 3 Двумерное нормальное распределение $n = 100$

Выборка без возмущений

- Критерий наименьших квадратов

$$\hat{a} \approx 2.17, \quad \hat{b} \approx 2.22$$

- Критерий наименьших модулей

$$\hat{a} \approx 2.50, \quad \hat{b} \approx 1.67$$




Рисунок 4 Выборка без возмущений

Выборка с возмущениями

- Критерий наименьших квадратов

$$\hat{a} \approx 2.49, \quad \hat{b} \approx 0.63$$

- Критерий наименьших модулей

$$\hat{a} \approx 2.38, \quad \hat{b} \approx 1.88$$




Рисунок 5 Выборка с возмущениями

Проверка гипотезы о законе распределения генеральной совокупности. Метод хи-квадрат

Мощность выборки = 10




Рисунок 6 График частот для выборки мощностью 10 и график теоретических значений частот на таком же разбиении

Метод максимального правдоподобия:

$$\hat{\mu} \approx -0.16 \quad \hat{\sigma} \approx 1.69$$

Критерий согласия χ^2 :

Количество промежутков $k = 7$

i	Границы Δ_i	n_i	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$-\infty, -1.41$	3	0.0790	0.79	2.21	6.18

2	-1.41, -0.91	0	0.1020	1.02	-1.02	1.02
3	-0.91, -0.41	2	0.1593	1.59	-0.41	0.10
4	-0.41, 0.09	0	0.1949	1.95	-1.95	1.95
5	0.09, 0.59	1	0.1866	1.87	-0.87	0.40
6	0.59, 1.09	2	0.1399	1.40	0.60	0.26
7	1.09, ∞	2	0.1382	1.38	0.62	0.28
Σ	-	10	1.0000	10.00	-0.00	$10.19 = \chi_B^2$

Таблица 5 Вычисление χ_B^2 при проверке гипотезы H_0 о нормальном законе распределения $N(x, \hat{\mu}, \hat{\sigma})$ для выборки мощностью 100

Мощность выборки = 100




Рисунок 7 График частот для выборки мощностью 10 и график теоретических значений частот на таком же разбиении

Метод максимального правдоподобия:

$$\hat{\mu} \approx -0.06 \quad \hat{\sigma} \approx 0.95$$

Критерий согласия χ^2 :

Количество промежутков $k = 7$

i	Границы Δ_i	n_i	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$-\infty, -1.31$	8	0.0955	9.55	-1.55	0.25
2	-1.31, -0.81	10	0.1141	11.41	-1.41	0.17
3	-0.81, -0.31	21	0.1695	16.95	4.05	0.97
4	-0.31, 0.19	23	0.1971	19.71	3.29	0.55
5	0.19, 0.69	18	0.1794	17.94	0.06	0.00
6	0.69, 1.19	10	0.1278	12.78	-2.78	0.61
7	1.19, ∞	10	0.1166	11.66	-1.66	0.24
Σ	-	100	1.0000	100.00	-0.00	$2.78 = \chi_B^2$

Таблица 6 Вычисление χ^2_B при проверке гипотезы H_0 о нормальном законе распределения $N(x, \hat{\mu}, \hat{\sigma})$ для выборки мощностью 100

Доверительные интервалы для параметров нормального распределения

$n = 20$	m	σ
	$-0.49 < m < 0.31$	$0.66 < \sigma < 1.26$
$n = 100$	m	σ
	$-0.14 < m < 0.29$	$0.95 < \sigma < 1.25$

Таблица 7 Доверительные интервалы для параметров нормального распределения

Доверительные интервалы для параметров произвольного распределения.

Асимптотический подход.

$n = 20$	m	σ
	$-0.53 < m < 0.35$	$0.69 < \sigma < 1.17$
$n = 100$	m	σ
	$-0.12 < m < 0.27$	$0.96 < \sigma < 1.23$

Таблица 8 Доверительные интервалы для параметров нормального распределения. Асимптотический подход

Обсуждения

Выборочные коэффициенты корреляции и эллипсы рассеивания

Для двумерного нормального распределения дисперсии коэффициентов корреляции упорядочены следующим образом: $r < r_S < r_Q$

Для смеси нормальных распределений дисперсии выборочных коэффициентов корреляции упорядочены следующим образом $r_Q < r_S < r$

Чтобы эллипс рассеивания соответствовал 95% доверительной области с помощью интегрирования формулы (1) был найден коэффициент (=5) на который требовалось умножить полуоси исходного эллипса. Процент попавших элементов выборки в этот эллипс примерно равен его теоретическому значению.

Оценки коэффициентов линейной регрессии

Критерий наименьших квадратов точнее оценивает коэффициенты линейной регрессии на выборке без возмущений.

Критерий наименьших модулей точнее оценивает коэффициенты линейной регрессии на выборке с возмущениями.

Критерий наименьших модулей устойчив к редким выбросам.(страница. 9)

Проверка гипотезы о законе распределения генеральной совокупности. Метод хи-квадрат.

Выборка мощностью 10

Графики реальной и теоретически рассчитанной частот довольно похожи.

Проверка гипотезы H_0 о нормальном законе распределения $N(x, \hat{\mu}, \hat{\sigma})$ на уровне значимости $\alpha = 0.05$ не согласуется, так как $\chi^2_{1-\alpha}(k-1) = \chi^2_{0.95}(6) \approx 1.6354 < 10.19 = \chi^2_B$. Подходящий уровень значимости, при котором гипотеза будет согласовываться с выборкой $\alpha = 0.8$.

Выборка мощностью 100

Графики реальной и теоретически рассчитанной частот довольно сильно различаются.

Проверка гипотезы H_0 о нормальном законе распределения $N(x, \hat{\mu}, \hat{\sigma})$ на уровне значимости $\alpha = 0.05$ не согласуется, так как $\chi^2_{1-\alpha}(k-1) = \chi^2_{0.95}(6) \approx 1.6354 < 2.78 = \chi^2_B$. Подходящий уровень значимости, при котором гипотеза будет согласовываться с выборкой $\alpha = 0.1$.

Причиной несовпадения является недостаточное число разбиений. Как видно из таблицы [3, с 358] при увеличении числа степеней свободы увеличивается допустимое χ^2_B . Так же увеличивается допустимое χ^2_B при увеличении мощности выборки, так как при малых n связь $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ перестаёт быть несущественной.

Доверительные интервалы для параметров распределения

Генеральные характеристики накрываются построенными доверительными интервалами.

Доверительные интервалы, полученные по большей выборке, являются соответственно более точными, т.е. меньшими по длине.

Асимптотический подход на большом объеме выборки даёт результат точнее.

Литература

1. Ссылка на репозиторий GitHub
<https://github.com/SelyankinFyodor/math-statistics>
2. Вероятностные разделы математики. Учебник для бакалавров технических направлений.
//Под ред. Максимова Ю.Д. – Спб.: Иван Федоров, 2001. – 592 с.Максимов Ю.Д.
Математика. Теория и практика по математической статистике. Конспект-справочник по теории вероятностей : учеб. пособие Ю.Д. Максимов; под ред. В.И. Антонова. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. — 395 с. (Математика в политехническом университете).
3. Максимов Ю.Д. Математика. Теория и практика по математической статистике. Конспект-справочник по теории вероятностей: учеб. пособие / Ю. Д. Максимов; под ред. В. И. Антонова. -СПб. : Изд-во Политехн. Ун-та, 2009. -395 с.(Математика в политехническом университете).
4. Квантили распределения хи-квадрат
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%B8-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82