


일일 섭취 권장량은 건강한 여학생이 매일 섭취해야 할 양분의 양이다.

- 5 그림은 1컵(200 mL)의 청량 음료와 무지방 우유에 들어 있는 모든 영양소를 평균적인 여학생의 일일 섭취 권장량에 대한 비율로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 탄수화물과 단백질의 일일 섭취 권장량의 비율은 4 : 1이다.)


보기

- ㄱ. 청량 음료는 뷰렛 용액에 반응하여 보라색을 나타낸다.
 ㄴ. 에너지원으로 모두 소모된다면 무지방 우유 1컵은 청량 음료 1컵보다 더 많은 열량을 낸다.
 ㄷ. 여학생은 평균적으로 무지방 우유 5컵을 마시면 하루 비타민 A 필요량을 다 섭취할 수 있다.


- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

운동을 할 때는 글리코겐과 지방이 분해되면서 에너지를 근육에 공급한다. 운동 강도가 높아질수록 글리코겐에 의해 빠른 에너지 공급이 필요하다.

- 6 그림 (가)는 운동의 강도에 따라 소비되는 영양소 소모량의 상대적인 비율을, (나)는 유산소 운동 시 운동 시간에 따라 탄수화물과 지방이 전체 에너지 생성에 기여하는 비율을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 유산소 운동 시 30~60분 구간에는 탄수화물보다 지방의 소모량(g)이 많다.
 ㄴ. 운동 강도가 높은 운동을 한 이후에는 탄수화물 섭취를 많이 해야 한다.
 ㄷ. 운동 강도가 낮은 운동이 높은 운동보다 혈액의 지방산을 에너지원으로 사용하는 비율이 높다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ